



7-717-276-05-57
www.doctorfarmer.kz



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ



СОДЕРЖАНИЕ

ФУНГИЦИДНЫЕ ПРОТРАВИТЕЛИ		
ВИЛЕМ*.....	(имазалил+тебуконазол).....	4
ВИТАЦИТ.....	(тиабендазол + флутриафол).....	6
КАРДОН.....	(карбендазим).....	8
ТУРИОН.....	(имазалил+прохлораз+тритиконазол).....	10
ИНСЕКТИЦИДНЫЕ ПРОТРАВИТЕЛИ		
ТИМАТЕРР.....	(тиаметоксам).....	12
ФУНГИЦИДЫ		
БЕНЛОКС*.....	(эпоксиконазол+пираклостробин).....	14
ЗЕНОНАЭРО.....	(тебуконазол + триадимефон).....	16
КАРДОН.....	(карбендазим).....	18
ПРОТЭБ*.....	(пропиконазол+тебуконазол).....	20
СПЕКТР ДЕЙСТВИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНГИЦИДОВ	22	
ГЕРБИЦИДЫ		
БИАТЛОН.....	(2,4-Д кислота в виде сложного 2-этилгексилового эфира + триасульфурон).....	24
ГУРОН*.....	(галоксифоп-Р-метил).....	26
КЛЕГАЛ*.....	(клетодим+галоксифоп-Р-метил).....	28
КЛОПИРАЛИД.....	(копирапид).....	30
КЛОПЭФИР.....	(2,4-Д кислота + клопирапид в виде сложных 2-этилгексиловых эфиров).....	32
МЕТУРОН.....	(метсульфурон-метил).....	34
НАВИЕТ.....	(С-металохор).....	36
РАП.....	(глифосата кислота в виде изопропиламинной соли).....	38
РАП 600.....	(глифосата кислота в виде калийной соли).....	40
РОМУЛ.....	(римсульфурон).....	42
СТАЛКЕР*.....	(трибенурон-метил).....	44
ТАЙПАН.....	(феноксапроп-Р-этан+клодинафоп-пропаргил+мефенипир-диэтил(антидот)).....	46
ФАБРИС.....	(феноксапроп-Р-этан+какоцинтосет-мексил(антидот)).....	48
ФЛОРАН.....	(флорасулам).....	50
ЭЛАМЕТ	(2,4-Д кислота в виде сложного 2-этилгексилового эфира + метсульфурон-метил).....	52
ЭЛАНТ	(2,4-Д кислота в виде сложного 2-этилгексилового эфира).....	54
ЭЛАНТ ПРЕМИУМ.....	(2,4-Д кислота и дикамбы кислота в виде сложных 2-этилгексиловых эфиров).....	56
ЭЛАНТ ЭКСТРА	(2,4-Д кислота в виде сложного 2-этилгексилового эфира) + флорасулам).....	58
ЭЛЬФ	(клопирапид в виде сложного 2-этилгексилового эфира).....	60
ЭФЕС.....	(клетодим).....	62
ЗАВОДСКИЕ БИНАРНЫЕ УПАКОВКИ ГЕРБИЦИДОВ		
КЛОПЭФИР МИКС.....	(заводская бинарная упаковка гербицидов КЛОПЭФИР + СТАЛКЕР).....	64
СТАЛМЕТ.....	(заводской комплект гербицидов СТАЛКЕР + МЕТУРОН).....	66
ТРИАТЛОН ПЛЮС	(заводская бинарная упаковка гербицидов Элант Премиум + Сталкер).....	68
ЭЛАСТЕР.....	(заводская бинарная упаковка гербицидов ЭЛАНТ + СТАЛКЕР).....	70
ЭЛАСТЕР ПЛЮС.....	(заводская бинарная упаковка гербицидов ЭЛАНТ + СТАЛКЕР).....	72
ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГЕРБИЦИДОВ	74	
ИНСЕКТИЦИДЫ		
ИМИДОК.....	(имидаクロприд).....	76
ТИМАТЕРР.....	(тиаметоксам).....	78
ЦУНАМИ.....	(альфа-циперметрин).....	80
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРЕПАРАТЫ		
КОЛОР УЛЬТРА.....	(азокраситель кошенилевый красный).....	82
ГЛАСИС.....	(ортофосфорная кислота).....	83
НЕОН 99.....	(оксиэтилированный ацилфенол на основе тримеров пропилен).....	84
ТЕСИЛ 201.....	(водная эмульсия кремнийорганических полимеров).....	85
КОМПЛЕКСНЫЕ ОРГАНО - МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ		
КОНТУР		86
КОНТУР АНТИСТРЕСС.....		88
КОНТУР АРГЕНТ.....		90
КОНТУР ПРОФИ.....		92
КОНТУР РОСТ.....		94
КОНТУР СТАРТ.....		96
КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ ЗАЩИТЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР	98	
СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	102	

С наилучшими пожеланиями,
Игизов Ильдус Асхатович
директор ООО «ТД Доктор Фармер»



Системный двухкомпонентный фунгицид для предпосевной обработки семян

Действующее вещество:

имазалил + тебуконазол

Химический класс:

имидазолы + триазолы

Концентрация: 100+60 г/л

Препартивная форма:

микроэмulsionя, МЭ

Упаковка:

канистра 5 л

Гарантийный срок хранения:

3 года

Температура хранения:

от -10°C до +30°C

Класс опасности для человека:

2 (высокоопасное вещество)

СМЕСЕВОЙ
ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ
ФУНГИЦИДНЫЙ
ПРОТРАВИТЕЛЬ ДЛЯ ЗА-
ЩИТЫ семян важнейших
культур ОТ ШИРОКОГО
СПЕКТРА
ФИТОПАТОГЕНОВ

ВИЛЕМ*

Преимущества

- Высокая биологическая эффективность против широкого спектра фитофагов.
- Формирование мощной корневой системы и поддержание стимуляции роста вегетативной массы.
- Продолжительное защитное действие от прорастания семян до фазы выхода в трубку

Механизм действия

Имазалил проявляет локально-системное действие, защищая корневую систему. Действие имазалила основано на ингибировании синтеза эргостерина, влияющего на проницаемость клеточных мембран патогена.

Тебуконазол проявляет системно-транслокационное действие, защищая проросток. Действие тебуконазола основано на процессе ингибирования биосинтеза стерина патогенными организмами, что приводит к изменению мембранны (ее проницаемости), снижению воспроизведения и, в конечном итоге, нейтрализации патогенной клетки.

Скорость воздействия

обладает быстрой начальной активностью, защищая растения с момента прорастания

Спектр действия препарата

Альтернариоз, аскохитоз, белая гниль (прикорневая форма), бурая ржавчина, гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, ризоктониозная прикорневая гниль, каменная головня, пузырчатая головня, пыльная головня, ложная пыльная головня, стеблевая головня, твердая головня, корневые гнили, мучнистая роса, пероноспороз, плесневение семян, плесневение початков, серая гниль (семенная инфекция), сетчатая пятнистость, фомопсис, фузариоз, фузариозная снежная плесень и др. Полный перечень вредных объектов можно посмотреть в регламентах применения.

Период защитного действия

Биологический эффект продолжается в течение всего периода от прорастания семян до фазы выхода в трубку зерновых культур.

Благодаря системному действию, препарат эффективен против поверхностной и внутренней семенной инфекции, а также ряда возбудителей болезней, поражающих растение в более поздний период вегетации.

Рекомендации по применению

Перед использованием необходимо хорошо размешать содержимое канистры. При протравливании пленчатых культур и при выявлении заражения пыльной головней, рекомендуется использовать максимальные нормы расхода препарата.

Формуляция ВИЛЕМ обеспечивает равномерное нанесение фунгицида на обрабатываемую зерновку (на поверхность семени) и создает на ее поверхности высококачественную, прочную пленку препарата, не осыпающуюся после высыхания и не пылящую.

Обработку семян можно проводить как заблаговременно (допустимо за 1-2 недели), так и непосредственно в день посева. Свежеубранные семена озимых культур обрабатывают не позднее, чем за 2-5 дней до посева.

При заблаговременном протравливании семян зерновых их влажность может слегка повышаться, поэтому обработанные семена нужно хранить в сухом помещении. Нельзя допускать попадания протравленных семян в пищу животных и птиц.

Факторы, влияющие на эффективность

Для протравливания рекомендуется использовать очищенные от пыли и примесей семена, что гарантирует хорошую прилипаемость и, следовательно, лучшее качество протравливания. Кроме того, пыль способна абсорбировать препарат, что ведет к значительному снижению концентрации препарата, попадающего на семена.

Не рекомендуется применять препарат на проросших, имеющих трещины и другие повреждения семенах (из-за риска возникновения фитотоксичности), а также на семенах с влажностью более 16%.

Фитотоксичность

При использовании в строгом соответствии с регламентом применения, риск возникновения фитотоксичности отсутствует. Ограничений для размещения последующих культур в севообороте нет.

Совместимость

Совместим с микроудобрениями, биологически активными веществами и стимуляторами роста, применяемыми в те же сроки. Обладает широким спектром действия, поэтому не рекомендуется к применению совместно с другими химическими протравителями.

В каждом конкретном случае необходимо проверять препараты на совместимость.

Условия хранения

При хранении избегать попадания прямых солнечных лучей и соблюдать рекомендуемые температурные интервалы. По истечении гарантийного срока хранения, препарат должен быть проверен на соответствие требованиям технических условий. При установлении соответствия, может быть использован по прямому назначению.

Регламенты применения

Культура	Вредный объект	Норма расхода, л/т	Норма расхода рабочей жидкости, л/т	Способ, время обработки
Пшеница озимая	Пыльная головня, твердая головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, ризоктониозная прикорневая гниль, мучнистая роса, плесневение семян	0,3-0,4		10
	Фузариозная снежная плесень (в районах умеренно-депрессивного развития болезни)	0,4		
Пшеница яровая	Пыльная головня, твердая головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, мучнистая роса, плесневение семян	0,3-0,4		10
	Ячмень яровой, озимый	Пыльная головня, каменная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян, сетчатая пятнистость		
Рожь озимая	Стеблевая головня, гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, бурая ржавчина, мучнистая роса, плесневение семян	0,3-0,4		Протравливание семян заблаговременно или непосредственно перед посевом.
	Фузариозная снежная плесень	0,4		
Овес	Твёрдая (покрытая) и пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, красно-бурая пятнистость	0,3-0,4		
Кукуруза (на зерно)	Пузырчатая головня, пыльная головня, фузариозные корневые и прикорневые гнили, фузариоз, плесневение семян и початков			5-10
Подсолнечник	Корневые гнили, пероноспороз, плесневение семян, альтернариоз	0,4		10
Рапс яровой и озимый	Корневые гнили, пероноспороз, плесневение семян, альтернариоз			
Соя	Фузариозная корневая гниль, аскохитоз, фузариоз, плесневение семян	0,4	5-6	
Горох	Фузариозная корневая гниль, фузариозное увядание, аскохитоз, плесневение семян			
Просо	Головня метелки	0,3-0,4	10	

*препарат находится на стадии регистрации



Doctor
Farmer



Системный двухкомпонентный фунгицид широкого спектра действия для предпосевной обработки семян зерновых, технических культур и кукурузы

Действующие вещества:
тиабендазол + флутриафол

Химический класс:
бензimidазолы + триазолы

Концентрация:

25 г/л + 25 г/л

Препартивная форма:

концентрат суспензии, КС

Упаковка: канистра, 10 л

Гарантийный срок хранения:

2 года

Температура хранения:

от -5°C до +30°C

Класс опасности для человека:

3 (умеренно опасное вещество)

**ВИТАЦИТ:
МЯГКО ВОЗДЕЙСТВУЕТ
НА КУЛЬТУРУ,
ЭФФЕКТИВНО БОРЕТСЯ**

со всеми основными
воздушителями болезней,
в том числе,

С АЛЬТЕРНАРИОЗОМ

ВИТАЦИТ

Преимущества

- Обладает широким спектром действия против большинства патогенов, включая возбудителей внутренней и поверхностной семенной инфекции, почвенных патогенов, а также заболеваний, передающихся аэробенным путем, на ранних стадиях развития культуры.
- Один из самых эффективных препаратов в борьбе с альтернариозом зерновых культур.
- Тиабендазол, входящий в состав препарата, вмешивается в метаболизм гормонов растений, положительно влияя на рост и развитие культуры, улучшает перезимовку озимых зерновых, что ведет к существенному повышению урожайности.

Механизм действия

Тиабендазол нарушает процесс синтеза ДНК, останавливает деление клеток гриба, что ведет к блокировке репродуктивной способности грибов и их гибели. Его метаболиты ингибируют транспорт электронов и блокируют процесс дыхания.

Флутриафол ингибирует биосинтез эргостерина (стерина клеточных мембран), в результате чего мембранные клеток фитопатогена утрачивают как механические, так и биологические свойства, что ведет к гибели патогена.

Скорость воздействия

Препарат проникает в семя через оболочку, при прорастании зерна (при наличии оптимальной влажности), попадает в эмбрион, а затем в проводящую систему развивающегося растения, обеспечивая гибель клеток фитопатогенов.

Благодаря высокой системности, быстро перемещается к месту локализации инфекции, искореняя заболевание и обеспечивая длительную защиту посевов.

Спектр действия и эффективность препарата

Эффективность 85-95%

Твердая головня пшеницы и ржи, твердая (каменная) головня ячменя, стеблевая головня пшеницы и ржи, пыльная головня пшеницы и ячменя, черная (ложная пыльная) головня ячменя, фузариозная корневая гниль, альтернариоз.

Эффективность 65-85%

Карликовая головня пшеницы, обыкновенная (пыльная) головня проса, пыльная головня овса, твердая (покрытая головня) овса, фузариозная снежная плесень, комплекс естественного плесневения семян.

Эффективность менее 65%

Гельминтоспориозная корневая гниль, питиозная корневая гниль, церкоспореллезная корневая гниль, охиболлезная корневая гниль, склеротиноз, тифуллезная снежная плесень, аэробные инфекции (при раннем проявлении).

Период защитного действия

Препарат обеспечивает надежную защиту от поверхностной и внутренней семенной и почвенной инфекции (включая возбудителей корневых гнилей) с момента прорастания семян до конца кущения зерновых и поздних фаз развития технических культур (при благоприятно складывающихся погодных условиях).

Рекомендации по применению

Перед использованием необходимо хорошо размешать содержимое ка-

нистры. При проправливании пленчатых культур и при проправливании озимых рекомендуется использовать максимальные нормы расхода.

Удобная препартивная форма (концентрат суспензии), благодаря оптимальному содержанию прилипателя способствует равномерному распределению и сохранению действующего вещества на поверхности семян. После высыхания обработанные семена не «пылят».

Ярко-красный краситель, входящий в состав препарата, позволяет по интенсивности окрашивания визуально контролировать качество проправления. Нельзя допускать попадания пропраленных семян в пищу животных и птиц.

Защищает от большого комплекса патогенной микрофлоры, что в свою очередь дает возможность не только увеличить эффективность защиты семян от инфекции, но и снизить риск появления резистентности у возбудителей болезней. Обладает высокой биологической эффективностью против пыльной головни.

Факторы, влияющие на эффективность

Для проправления рекомендуется использовать очищенные от пыли и примесей семена, что гарантирует хорошую прилипаемость и, следовательно, лучшее качество проправления. Кроме того, пыль способна абсорбировать препарат, что ведет к значительному снижению концентрации препарата, попадающего на семена.

Не рекомендуется применять препарат на проросших, имеющих трещины и другие повреждения семенах (из-за риска возникновения фитотоксичности), а также на се-

мах с влажностью более 16%.

Фитотоксичность

При использовании в строгом соответствии с регламентом применения, риск возникновения фитотоксичности отсутствует. Ограничений для размещения последующих культур в севообороте нет.

ВИТАЦИТ обладает положительным ростостимулирующим действием – вмешивается в метаболизм гормонов растений, положительно влияя на их рост и развитие, способствуя лучшей перезимовке озимых зерновых культур.

Совместимость

Совместим с микроудобрениями, биологически активными веществами и стимуляторами роста, применяемыми в те же сроки. Обладает широким спектром действия, поэтому не рекомендуется к применению совместно с другими химическими проправителями.


В каждом конкретном случае необходимо проверять препараты на совместимость.

Условия хранения

При хранении избегать попадания прямых солнечных лучей и соблюдать рекомендуемые температурные интервалы. По истечении гарантийного срока хранения, препарат должен быть проверен на соответствие требованиям технических условий. При установлении соответствия, может быть использован по прямому назначению.

Регламенты применения

Культура	Вредный объект	Норма расхода, л/т	Способ, время обработки
Пшеница яровая	Твердая головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, бурая ржавчина, септориоз, плесневение семян	1,5	Проправление семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости 10 л/т
	Пыльная головня	2,0	
Пшеница озимая*	Твердая головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, бурая ржавчина, септориоз, плесневение семян	1,5	Проправление семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости 10 л/т
	Фузариозная снежная плесень, пыльная головня	2,0	
Овес*	Пыльная и покрытая головня, красно-бурая пятнистость, плесневение семян	1,5-2,0	Проправление семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости 10 л/т
Ячмень яровой	Каменная головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян, пыльная головня	1,5-2,0	
Подсолнечник	Серая гниль, плесневение семян	2,0	Проправление семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости 3-5 л/т
Кукуруза (на зерно)	Пузырчатая головня, пыльная головня, фузариозная корневая и прикорневая гниль, плесневение семян	2,0	
Лен-долгунец	Антракноз, крапчатость	1,5-2,0	



Doctor
Farmer



Системный фунгицид для предпосевной обработки семян пшеницы и ячменя

Действующее вещество:

карбендазим

Химический класс:

бензимидазолы

Концентрация: 500 г/л

Препартивная форма:

концентрат супспензии, КС

Упаковка:

канюстра, 10 л

Гарантийный срок хранения:

2 года

Температура хранения:

от -10°C до +30°C

Класс опасности для человека:

2 (высокоопасное вещество)

КАРДОН

Преимущества

- Один из самых эффективных препаратов против возбудителей гельминтоспориозных корневых гнилей.
- Обладает продолжительным защитным и лечебным действием, обеспечивая надежное подавление возбудителей грибных болезней и длительную защиту всходов.
- Гибкость в сроках применения (допускается заговоренное протравливание до 1 года до посева). Протравленные препаратом семена не теряют всхожесть в течение года (при хранении в соответствующих условиях).

Механизм действия

Карбендазим связывается с макромолекулами белка тубулина, тормозя репродуктивную способность грибов. Это нарушает процессы деления клеток (митоза), ведя в конечном итоге к гибели чувствительных патогенов.

Скорость воздействия

Препарат проникает в семя через оболочку, при прорастании зерна (при наличии оптимальной влажности) и затем распространяется по проводящей системе растения по мере его роста. Основная часть нанесенного препарата переходит в растение в течение 10...29 дней после сева.

Обладает профилактическим и лечебным действием, уничтожая широкий спектр семенных и почвенных инфекций (за исключением возбудителей пыльной головни зерновых культур).

Спектр действия и эффективность препарата

Эффективность 85-95%

Твердая головня пшеницы, стеблевая головня пшеницы, твердая (каменная) головня ячменя, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль.

Эффективность 65-85%

Карликовая головня пшеницы, черная (ложная пыльная) головня ячменя, церкоспореллезная корневая гниль, охиболлезная корневая гниль, фузариозная снежная плесень, комплекс естественного плесневения.

Эффективность менее 65%

Пыльная головня пшеницы и ячменя, питиозная корневая гниль, склеротиноз, тифуллезная снежная плесень, альтернариоз, аэрогенные инфекции (при раннем проявлении).

Период защитного действия

Благодаря значительной персистентности в прикорневой зоне обработанных растений, препарат сохраняется без существенного разложения в течение полугода и более. По этой причине карбендазим – одно из самых длительно действующих и эффективных веществ против возбудителей гельминтоспориозных корневых гнилей.

Рекомендации по применению

Перед использованием необходимо хорошо размешать содержимое канюстры. Норма расхода препарата устанавливается по результатам фитоэкспертизы семян, в зависимости от того, какие болезни наносят наибольший экономический ущерб.

Удобная препартивная форма (концентрат супспензии), благодаря оптимальному содержанию прилипателя, способствует равномерному распределению и сохранению действующего вещества на поверхности семян. После высыхания обработанные семена не «пылят».

Ярко-красный краситель, входящий в состав препарата, позволяет по ин-

тенсивности окрашивания визуально контролировать качество протравливания.

Высокая эффективность достигается при применении в условиях высокой влажности и низких температур, в засушливых условиях эффективность снижается.

Обработку семян можно проводить как заговоренное (допустимо до 1 года), так и непосредственно в день посева. Оптимальные сроки протравливания семян - за 1..30 дней до посева.

Факторы, влияющие на эффективность

Для протравливания рекомендуется использовать очищенные от пыли и примесей семена, что гарантирует хорошую прилипаемость и, следовательно, лучшее качество протравливания. Кроме того, пыль способна абсорбировать препарат, что ведет к значительному фактическому снижению концентрации препарата, попадающего на семена.

Не рекомендуется применять препарат на проросших, имеющих трещины и другие повреждения семенах (из-за риска возникновения эффекта фитотоксичности), а также на семенах с влажностью более 16%.

Фитотоксичность

При использовании в строгом соответствии с регламентом применения, риск возникновения фитотоксичности отсутствует. Ограничений для размещения последующих культур в севообороте нет.

Как представитель класса бензимидазолов, КАРДОН обладает положительным ростостимулирующим действием. Вмешивается в метаболизм гормонов растений, влияя

в конечном итоге на рост и развитие растений, на скорость выхода семян из глубокого и вынужденного покоя, на активность ферментов, контролирующих накопление хлорофилла, белка и углеводов. В оптимальных условиях способен в среднем на 10% повышать всхожесть семян и увеличивать количество стеблей на 12%.

Следует помнить, что при систематическом применении одних и тех же протравителей, эффективность может снижаться вследствие образования стойких рас возбудителя. Чтобы предотвратить это явление, необходимо строго соблюдать нормы расхода препарата и чередовать применяемые фунгициды.

Совместимость

Совместим с микроудобрениями, биологически активными веществами и стимуляторами роста, применяемыми в те же сроки. Предварительно рекомендуется проверять препараты на совместимость. Обладает недостаточным действием против возбудителей пыльной головни, поэтому при ее распространении необходимо усиление действия КАРДОНа препаратами триазольной группы.

Условия хранения

При хранении избегать попадания прямых солнечных лучей и соблюдать рекомендуемые температурные интервалы. По истечении гарантийного срока хранения, препарат должен быть проверен на соответствие требованиям технических условий. При установлении соответствия, может быть использован по прямому назначению.

Регламенты применения

Культура	Вредный объект	Норма расхода рабочей жидкости, л/т	Способ, время обработки
Пшеница и ячмень* яровые	Пыльная и твердая головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян	1,0-1,5	10 Протравливание семян перед посевом или заговоренное (до 6 месяцев)

КАРДОН:
ДЛИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД ЗАЩИТЫ,
эффективно борется
с возбудителями
КОРНЕВЫХ ГНИЛЕЙ



Системный трехкомпонентный фунгицид с ростостимулирующим эффектом для предпосевной обработки семян зерновых культур

Действующие вещества:

имазалил + прохлораз
+ тритиконазол

Химический класс:

имидазолы + имидазолы
+ триазолы

Концентрация:

66 г/л + 132 г/л + 56 г/л

Препартивная форма:

концентрат эмульсии, КЭ

Упаковка: канистра, 5 л

Гарантийный срок хранения:

3 года

Температура хранения:

от -20°C до +30°C

Класс опасности:

3 (умеренно опасное вещество)

**ТУРИОН:
МАКСИМАЛЬНО
ШИРОКИЙ СПЕКТР**
действия, наивысшая
эффективность
**ПРОТИВ ОСНОВНЫХ
ВОЗБУДИТЕЛЕЙ**
семенных и почвенных
инфекций

ТУРИОН

Преимущества

- Благодаря уникальной комбинации действующих веществ, обладает повышенной эффективностью против таких семенных и почвенных инфекций, как головневые, фузариозные и гельминтоспориозные корневые гнили, альтернариоз, а также аэрогенных инфекций, возникающих в ранние фазы вегетации.
- Ростостимулирующие вещества в составе препарата оказывают мощное стимулирующее действие на начальное развитие растений и рост корневой системы.

Механизм действия

Имазалил воздействует на синтез белка тубулина у фитопатогенов, что препятствует прохождению митоза и приводит, в конечном итоге, к угнетению роста патогенов и их гибели.

Прохлораз ингибирует биосинтез стерина в мембрanaх клеток грибов, механизм его действия отличен от триазолов.

Тритиконазол ингибирует биосинтез эргостерина (стерина клеточных мембран), в результате чего мембрanae клеток фитопатогена утрачивают как механические, так и биологические (способность полупроницаемости клеточной мембраны) свойства, что ведет к гибели патогена.

Скорость действия

ТУРИОН обладает быстрой начальной активностью, защищая растения с момента прорастания. Имазалил, входящий в его состав, характеризуется локально-системным действием и, благодаря высокой системности, быстро перемещается к месту локализации инфекции, искореняя возбудителей корневых гнилей и обеспечивая длительную защиту посевов.

Прохлораз также обладает локально-системным действием. Он не только дезинфицирует почву вокруг проростков, но и способен проникать внутрь семени (до алейронового слоя).

Тритиконазол, при прорастании зерна, через оболочку проникает в семя (при наличии оптимальной влажности), попадает в эмбрион, а затем в проводящую систему развивающегося растения, уничтожая возбудителей головневых инфекций.

Гетероауксин в составе препарата запускает процессы прорастания даже у самых проблемных семян, стимулируя рост крепких и здоровых корней.

Спектр действия и эффективность препарата

Эффективность 85-95%

Твердая головня пшеницы и ржи, твердая (каменная) головня ячменя, стеблевая головня пшеницы и ржи, пыльная головня пшеницы и ячменя, черная (ложно-пыльная) головня ячменя, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, альтернариоз.

Эффективность 65-85%

Карликовая головня пшеницы, церкоспореллезная корневая гниль, огнеболезненная корневая гниль, комплекс естественного плесневения.

Эффективность менее 65%

Питиозная корневая гниль, склеротиниоз, аэрогенные инфекции (при раннем проявлении).

Период защитного действия

Защитный эффект ТУРИОНа начинается с момента прорастания зерна и длится в течение 20-40 дней (с момента появления всходов у яровых культур).

Прохлораз и тритиконазол с поверхности обработанных семян переходят в почвенный раствор, осуществляя локальную дезинфекцию почвы вокруг семени и проростка. Тритиконазол постепенно проникает в зерновку, не уг-

нетая зародыш и проросток, и подавляет возбудителей головни. Имазалил долго сохраняется на семенах и в почве и отличается исключительно высокой активностью против гельминтоспориозной и фузариозной гнилей зерновых культур, защищает растения от их прорастания до момента появления второго междуузлия.

Рекомендации по применению

Препарат имеет уникальную препаративную форму – концентрат эмульсии. После внесения он моментально проникает внутрь семени, практически не оставаясь на его поверхности, поэтому при обработке необходимо следить за тем, чтобы она была проведена как можно равномернее. Обработанные семена не «пылят».

При проправливании пленчатых культур рекомендуется использовать средние и максимальные нормы расхода.

Ярко-красный краситель, входящий в состав препарата, позволяет по интенсивности окрашивания визуально контролировать качество проправливания.

Обработку семян можно проводить как заблаговременно (допустимо до полугода), так и непосредственно в день посева. При заблаговременном проправливании семян зерновых их влажность может слегка повышаться, поэтому обработанные семена нужно хранить в сухом помещении. Нельзя допускать попадания проправленных семян в пищу животных и птиц.

Факторы, влияющие на эффективность

Для проправливания рекомендуется использовать очищенные от пыли и примесей семена, что гарантирует хорошую прилипаемость и, следовательно, лучшее качество проправливания. Кроме того, пыль способна абсорбировать препарат, что ведет к значительному фактическому снижению концентрации препарата, попадающего на семена.

Регламенты применения

Культура	Вредный объект	Норма расхода, л/т	Норма расхода рабочей жидкости, л/т	Способ, время обработки
Пшеница яровая	Фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, пыльная головня, твердая головня, плесневение семян	0,28-0,35	10	Проправление семян перед посевом или заблаговременно (до одного года).
Ячмень яровой	Фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, твердая (каменная) головня, плесневение семян, пыльная головня	0,28-0,35		

/ПРОТРАВИТЕЛИ/11
Не рекомендуется применять препарат на проросших, имеющих трещины и другие повреждения семенах (из-за риска возникновения фитотоксичности), а также на семенах с влажностью более 16%.

Фитотоксичность

При использовании в строгом соответствии с регламентом применения, риск возникновения фитотоксичности отсутствует. Ограничений для размещения последующих культур в севообороте нет.

ТУРИОН, благодаря содержанию в составе гетероауксина, обладает ростостимулирующим действием, ведущим к повышению энергии прорастания семян, улучшению роста корневой системы и надземной части растения и повышению урожайности.

Совместимость

Совместим с микроудобрениями, биологически активными веществами и стимуляторами роста, применяемыми в те же сроки. Обладает широким спектром действия, поэтому не рекомендуется к применению совместно с другими химическими проправителями.

В каждом конкретном случае необходимо проверять препараты на совместимость.

Условия хранения

При хранении избегать попадания прямых солнечных лучей и соблюдать рекомендуемые температурные интервалы. По истечении гарантийного срока хранения, препарат должен быть проверен на соответствие требованиям технических условий. При установлении соответствия, может быть использован по прямому назначению.



Системный инсектицидный проправитель для защиты сельскохозяйственных культур от вредителей всходов.

Действующие вещества:

тиаметоксам

Химический класс:

неоникотиноиды

Концентрация:

350 г/л

Препартивная форма:

концентрат суспензии, КС

Упаковка: канистра, 5 л

Гарантийный срок хранения:

2 года

Температура хранения:

от -5°C до +30°C

Класс опасности

для человека:

3 (умеренно опасное вещество)

Класс опасности для пчел:

1 (высокоопасное вещество)

ТИМАТЕРР

Преимущества

- Благодаря оптимальной растворимости тиаметоксам без потерь поглощается корневой системой растения, и обеспечивает длительную (до 45 дней) защиту, как от почвенных, так и от наземных вредителей.
- Обладает высокой скоростью воздействия на вредящие организмы.
- Благодаря клотианидину, который является метаболитом тиаметоксама, обеспечивает надежную защиту семени и отрастающей корневой системы.
- Защита не только прорастающих семян, но и вегетирующих растений, тем самым снижается кратность обработок в течение вегетационного периода.
- Высокая инсектицидная активность препарата и его перераспределение по поверхности и внутри растения обуславливает его эффективность против сосущих и грызущих насекомых.

Механизм действия

Тиаметоксам оказывает острое контактно-кишечное и системное действие. При попадании препарата в растение тиаметоксам метаболизируется до клотианидина, увеличивая скорость воздействия на насекомых.

Поглощается семенами и при набухании быстро передвигается по растению в восходящем направлении к новому образующимся частям растения. При поедании насекомыми действует на передачу нервного импульса на уровне ацетилхолинового рецептора постсинаптической мембранны, прекращается двигательная активность и насекомые погибают.

Скорость воздействия

После высева проправленных семян (при набухании зерновки) препарат проникает в растение и переносится по его проводящей системе, делая не-пригодным для питания насекомых все формирующиеся органы. Действие инсектицида на насекомых-вредителей проявляется при питании подземными и надземными частями растений. Гибель вредителей наступает в течение нескольких часов в зависимости от нормы расхода препарата, вида насекомого, а также от фазы развития растений.

Спектр действия

Проволочники, злаковые муhi, хлебные блошки, хлебные жужелицы, внутристеблевые муhi, крестоцветные блошки, проволочники, хлебная жужелица, колорадский жук и др.

Полный спектр уничтожаемых насекомых указан в регламентах о применении.

Период защитного действия

После попадания внутрь семени при прорастании происходит активное перераспределение действующего вещества во все растущие части растения. Таким образом, корни, стебли, точка роста и листья находятся под надежной защитой препарата и становятся несъедобными для вредителей в течение длительного периода.

От посева период защиты составляет до 45 дней при благоприятных погодных условиях, в зависимости от культуры, нормы расхода и вредного объекта.

Рекомендации по применению

Применение ТИМАТЕРР является не только более эффективным методом борьбы с вредителями, чем инсектицидные обработки по вегетации, так как он защищает растение в самые уязвимые фазы развития (с момента прорастания), но и более экологичным (снижается пестицидная нагрузка). Перед использованием необходимо хорошо размешать содержимое канистры. Удобная препартивная форма (концентрат суспензии) благодаря оптимальному содержанию прилипателя способствует равномерному распределению

и сохранению действующего вещества на поверхности семян.

После высыхания обработанные семена не «пылят».

Категорически запрещается использование проправленных семян в пищу животных и птиц.

Факторы, влияющие на эффективность

Для проправления рекомендуется использовать очищенные от пыли и примесей семена, что гарантирует хорошую прилипаемость и, следовательно, лучшее качество проправления. Кроме того, пыль способна абсорбировать препарат, что ведет к значительному фактическому снижению норм расхода. Эффективность препарата мало зависит от погодных условий. Он одинаково работает в засушливых условиях, при низких температурах воздуха, и в дождливую погоду (что особенно актуально в борьбе с личинками хлебной жужелицы осенью, когда дожди иной раз не позволяют обработать посевы инсектицидами по вегетации).

Обработку можно проводить как непосредственно перед посевом, так и заблаговременно (за 1-2 недели).

Фитотоксичность

При использовании в строгом соблюдении с регламентами применения риск возникновения фитотоксичности отсутствует. Препарат имеет высокую селективность и не оказывает отрицательного действия на всхожесть семян и энергию прорастания.

Рекомендуемые баковые смеси

Эффективен при самостоятельном применении, поэтому не рекомендуется к использованию в баковых смесях с другими инсектицидами. При совместном использовании с фунгицидами-проправителями на зерновых культурах (ТУРИОН, КАРДОН, АЛЬКАСАР) каждый препарат необходимо использовать в рекомендованных нормах расхода.

Препарат не содержит красителя. Для придания обработанным семенам яркой сигнальной окраски

/ПРОПРАВИТЕЛИ/13
необходимо использовать совместно с красящим концентратом КОЛОР УЛЬТРА (0,1 л/т).

Возможность возникновения резистентности

Резистентность к препарату не выявлена. Уничтожает популяции вредителей, устойчивые к пиретроидам и фосфорогоряческим инсектицидам.

Для предупреждения возникновения устойчивых распределений следует чередовать применение с препарата-ми, имеющими другие механизмы действия.

Фитотоксичность

При использовании в строгом соблюдении с регламентами применения риск возникновения фитотоксичности отсутствует. Препарат имеет высокую селективность и не оказывает отрицательного действия на всхожесть семян и энергию прорастания.

Совместимость

Для обеспечения комплексной защиты от возбудителей болезней рекомендуется к использованию совместно с фунгицидами для обработки семян. Совместим с большинством фунгицидов-проправителей для обработки семян, имеющие нейтральную реакцию, однако в каждом конкретном случае смешиваемые препараты следует проверять на совместимость. При приготовлении баковых смесей следует избегать прямого смешивания препаратов без предварительного разведения водой.

После применения, при необходимости в период вегетации, допускается использование инсектицидов.

Условия хранения

При хранении избегать попадания прямых солнечных лучей и соблюдать рекомендуемые температурные интервалы. По истечении гарантийного срока хранения, препарат должен быть проверен на соответствие требованиям технических условий. При установлении соответствия, может быть использован по прямому назначению.

Регламенты применения

Культура	Вредный объект	Норма расхода, л/га, л/т	Способ, время обработки
Пшеница яровая	Блошки, злаковые муhi	0,5-1,0	Проправливание семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года).
Подсолнечник	Комплекс вредителей всходов (почвообитающие и надземные вредители)	8,0-10,0	
Картофель	Проволочник	0,2	
Рапс	Крестоцветные блошки	8,0-10,0	

**ТИМАТЕРР:
ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ И НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА** против **ВРЕДИТЕЛЕЙ** **ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР**



Системный двухкомпонентный фунгицид для защиты зерновых культур, рапса и подсолнечника от листостеблевых инфекций.

Действующие вещества:

эпоксионазол +
пираклостробин

Химический класс:
триазолы+ стробилурины

Концентрация:
50 г/л + 133 г/л

Препартивная форма:

суспензионный концентрат, СК

Упаковка: канистра, 10 л

Гарантийный срок хранения:

2 года

Температура хранения:

от -0°C до +30°C

**Класс опасности
для человека:**

3 (умеренно опасное вещество)

для пчел:

3 (малоопасное вещество)

**ВЫСОКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРОТИВ АЭРОГЕННЫХ
ИНФЕКЦИЙ
ОБЕСПЕЧИВАЕТ
МАКСИМАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ
КУЛЬТУРЫ ОТ ШИРОКОГО
СПЕКТРА
ЗАБОЛЕВАНИЙ.**

БЕНЛОКС*

Преимущества

- Обладает эффективной защитой от комплекса аэрогенных инфекций (ржавчина (виды), септориоз, церкоспороз, фузариоз колоса и др) на широком спектре с/х культур.
- Период защитного действия до 4-х недель
- Повышает устойчивость растений к биотическим и абиотическим стрессам (засуха, недостаток влаги, воздействие низких температур) за счет замедления старения растений путем ингибирования синтеза этилена.
- Входящий в состав препарата пираклостробин усиливает работу нитратредуктазы, увеличивая тем самым, поглощение азота, что способствует повышению роста вегетативной массы растения.

Механизм действия

Эпоксионазол ингибирует биосинтез эргостерина (стерина клеточных мембран), в результате чего, мембранны клеток фитопатогена утрачивают механические и биологические (способность полупроницаемости клеточной мембраны) свойства, что приводит к гибели патогена.

Пираклостробин ингибирует митохондриальный цикл дыхания, блокирует энергоснабжение клеток гриба и, вместе с тем, жизненные процессы, связанные с этой функцией. Происходит ингибирование прорастания спор и гибель мицелия. Пираклостробин, кроме высокой фунгицидной активности, влияет на физиологические процессы в растении. Позволяет замедлить синтез этилена, значительно снижая последствия стрессовых факторов. Сниженная скорость старения листьев, пираклостробин сохраняет естественную продолжительность вегетации растений, в результате растения могут полностью реализовать потенциал продуктивности. Таким образом, хлорофилл работает более длительное время и способен синтезировать большее количество углеводов, необходимых для формирования урожая.

Скорость воздействия

Препарат проникает в растение в течение 1 часа с момента обработки. Эпоксионазол перемещается по растению системно. Пираклостробин обладает трансламинарной активностью, движется за точкой роста растения, обеспечивая защиту молодых отрастающих органов, обеспечивая длительную защиту.

Спектр действия и эффективность препарата

Эффективность 85-100%

Бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, желтая ржавчина, карликовая ржавчина, септориоз листьев и колоса

Эффективность 65-85%

Мучнистая роса, ринхоспориоз, фузариоз колоса, темно-бурая пятнистость, гельминтоспориоз, фомоз, альтернариоз, аскохитоз, фомопсис, белая и серая гнили.

Период защитного действия

В оптимальных условиях период защитного действия составляет 3-4 недели (в зависимости от погодных условий, уровня развития инфекции на момент проведения обработки, а также используемой нормы расхода фунгицида).

Рекомендации по применению

Перед использованием необходимо хорошо размешать содержимое канистры.

Обработку рекомендуется проводить в утренние или вечерние часы, при

скорости ветра до 3 м/с.. На зерновых культурах наиболее эффективно применение для защиты флагового и подфлаговых листьев стадии развития ВВСН 32-39.

При профилактическом применении в период вегетации, предотвращает заражение культуры и сдвигает появление первых признаков заболевания на более поздний срок. Если профилактическая обработка не планируется, то обработку проводят после появления первых признаков заболеваний, но не позднее, чем за 30-40 до начала уборки. В благоприятные условия для развития болезни условиях (теплая влажная погода, восприимчивый сорт, раннее проявление болезни, повышенные нормы азотных удобрений) рекомендуется применять максимальные нормы препарата. Для лучшей смачиваемости листовой поверхности обрабатываемых растений, норма расхода рабочей жидкости должна составлять не менее 200 л/га.

Факторы, влияющие на эффективность

Осадки, выпавшие через 1-2 часа после обработки, могут снизить биологическую эффективность препарата. При повышении температуры и понижении относительной влажности воздуха (менее 60%) эффективность препарата снижается, при повышенной влажности (более 90%) эффективность препарата остается высокой, независимо от температуры. Внесение препарата во время тумана или росы может привести к стеканию рабочего раствора с листовой поверхности растения и снизить эффективность действия препарата.

Регламенты применения

Культура	Вредный объект	Норма расхода рабочей жидкости, л/га	Норма расхода рабочей жидкости, л/га	Способ, время обработки,
Пшеница яровая	Мучнистая роса, бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, септориоз листьев, фузариоз колоса и колоса, гельминтоспориоз	1,0-1,25		
Ячмень яровой	Мучнистая роса, карликовая ржавчина, стеблевая ржавчина, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз		200-400	Опрыскивание в период вегетации.
Рапс	Альтернариоз, мучнистая роса, фомоз			
Подсолнечник	Белая и серая гнили, альтернариоз, фомоз, фомопсис	1,0-1,5		

Фитотоксичность

При использовании препарата в строгом соответствии с регламентами применения, риск возникновения фитотоксичности отсутствует. Быстро разлагается в объектах окружающей среды.

Совместимость

Совместим с гербицидами, другими фунгицидами, инсектицидами, стимуляторами роста и удобрениями, применяемыми в те же сроки. Перед использованием рекомендуется проверять препараты на совместимость. Для предотвращения возникновения резистентности у патогенов рекомендуется чередование с фунгицидами на основе действующих веществ из других химических классов.

Условия хранения

При хранении избегать попадания прямых солнечных лучей и соблюдать рекомендуемые температурные интервалы. По истечении гарантийного срока хранения, препарат должен быть проверен на соответствие требованиям технических условий. При установлении соответствия, может быть использован по прямому назначению.

*препарат находится на стадии государственной регистрации или ее расширения



Системный двухкомпонентный фунгицид для защиты зерновых культур и рапса от листвостеблевых инфекций

Действующие вещества:
тебуконазол + триадимефон

Химический класс:

триазолы

Концентрация:

125 г/л + 100 г/л

Препартивная форма:

концентрат эмульсии, КЭ
Упаковка: канистра, 10 л

Гарантийный срок хранения:

3 года

Температура хранения:

от -20°C до +30°C

Класс опасности для человека:

2 (высокоопасное вещество)

для пчел:

3 (малоопасное вещество)

**ЗЕНОН АЭРО:
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТУ
в течение 1 МЕСЯЦА, ОТ
возбудителей МУЧНИСТОЙ
РОСЫ И РЖАВЧИНЫ**

ЗЕНОН АЭРО

Преимущества

- Универсальный системный фунгицид, обладающий профилактическим (предотвращает заражение), лечащим (подавляет развивающееся заражение, еще не причинившее видимого вреда) и искореняющим действием (подавляет развившееся заражение).
- Подавляет все основные болезни зерновых культур и рапса в период вегетации, обладает длительным периодом защитного действия.
- Может применяться независимо от фазы развития культуры.

Механизм действия

Тебуконазол и триадимефон ингибируют биосинтез эргостерина (стерина клеточных мембран), в результате чего мембранны клеток фитопатогена утрачивают как механические, так и биологические (способность полупроницаемости клеточной мембраны) свойства, что приводит к гибели патогена.

Триадимефон в грибах превращается в смесь диастереомеров триадименона, фунгицидные свойства которых гораздо выше исходного продукта.

Скорость воздействия

Сорбируется растениями через листья очень быстро (в течение 2-4 часов после применения), перемещается в восходящем направлении. Благодаря высокой скорости продвижения в растении, действие препарата наступает в первые сутки после применения.

При использовании через 3-5 дней после заражения, обладает лечебным действием, поэтому первая обработка может быть проведена спустя некоторое время после обнаружения первых симптомов болезни.

Спектр действия и эффективность препарата

Эффективность 85-95%

Мучнистая роса, желтая ржавчина, бурая и карликовая ржавчина, корончатая ржавчина, септориоз листьев и колоса.

Эффективность 65-85%

Ринхоспориозная пятнистость, фузариоз стебля и колоса, оливковая плесень.

Эффективность менее 65%

Пиренофороз, гельминтоспориозная пятнистость.

Период защитного действия

В оптимальных условиях период защитного действия составляет от 3 недель и может длиться до конца вегетации (при обработке растений в фазу «флаговый лист»).

Рекомендации по применению

Перед использованием необходимо хорошо размешать содержимое канистры.

Обработку рекомендуется проводить в утренние или вечерние часы, при температуре: от +15°C до +25°C и скорости ветра до 3 м/с. Интервал между выпадением осадков и опрыскиванием должен составлять не менее 6 часов.

Обычно опрыскивание проводят при первых признаках проявления болезни. Для лучшей смачиваемости листовой поверхности обрабатываемых растений, норма расхода рабочей жидкости должна составлять не менее 200 л/га.

Обладает высокой эффективностью против ржавчинных и мучнисторосистых грибов. Для профилактических обработок ЗЕНОН АЭРО нужно применять, начиная с фазы кущения культуры, что позволяет сдвинуть проявление

первых симптомов заболеваний на более поздний срок. При этом, даже после проявления симптомов, обеспечивается эффективное и длительное сдерживание развития заболеваний. ЗЕНОН АЭРО обладает так же и лечебными свойствами, так как может остановить произошедшее заражение в критический период роста культуры.

Факторы, влияющие на эффективность

Дождь, прошедший через 1-2 часа после обработки, может снизить биологическую эффективность препарата.

В связи с особенностями механизма действия, не поддается полностью прорастание конидий и уредоспор ржавчины.

Фитотоксичность

При использовании препарата в рекомендуемых нормах и сроках опрыскивания, признаков угнетения культуры не обнаруживается.

Совместимость

Регламенты применения

Культура	Вредный объект	Норма расхода, л/га	Норма расхода рабочей жидкости, л/га	Способ, время обработки
Пшеница яровая	Мучнистая роса, бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, желтая ржавчина	0,75	300	Опрыскивание в период вегетации в фазе появления флаг-листа – начала колошения
	Септориоз листьев и колоса	1,0		
Ячмень яровой	Карликовая ржавчина, мучнистая роса, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость	0,75-1,0		Опрыскивание в период вегетации в фазе 2-х узлов – выдвижения колоса
Рапс яровой* (для технических целей)	Альтернариоз, фомоз	1,0		Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезней (в фазе вытягивания стеблей – начала образования стручков на нижнем ярусе)



**Doctor
Farmer**



Системный фунгицид для защиты посевов зерновых культур и сахарной свеклы от листостеблевых инфекций

Действующее вещество:

карбендиназим

Химический класс:

бензимидазолы

Концентрация: 500г/л

Препартивная форма:

концентрат супспензии, КС

Упаковка: канистра, 10 л

Гарантийный срок хранения:

2 года

Температура хранения:

от -10°C до +30°C

Класс опасности

для человека:

2 (высокоопасное вещество)

для пчел:

3 (малоопасное вещество)

КАРДОН:

ВЫСОКАЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

в борьбе с

гельминтоспориозными

пятнистостями в

посевах зерновых и

церкоспорозом

на свекле

КАРДОН

Преимущества

- Один из самых эффективных препаратов против возбудителей гельминтоспориозных пятнистостей зерновых и церкоспороза свеклы.
- Применяется как профилактически (для предотвращения поражения растений возбудителями), так и с лечебной целью. Приостанавливает развитие тех возбудителей, которые уже проникли в растение.
- Благодаря системному защитному действию, обеспечивает формирование полного колоса, исключает пустозерность, повышает морозоустойчивость, предотвращает полегание зерновых культур.

Механизм действия

Карбендазим связывается с макромолекулами тубулина, тормозя репродуктивную способность грибов. Это нарушает процессы деления клеток (митоза), ведя в конечном итоге к гибели чувствительных патогенов.

Скорость воздействия

Препарат проникает в растение в течение 2...4 часов с момента обработки. Перемещается по растению в восходящем направлении, что дает возможность остановить раннюю инфекцию в растении и защитить его в дальнейшем.

Спектр действия и эффективность препарата

Эффективность 85-95%

Мучнистая роса, желтая ржавчина, бурая и карликовая ржавчина, церкоспореллез, рамуляриоз.

Эффективность 65-85%

Пиренофороз, гельминтоспориозная пятнистость, фузариоз стебля и колоса, оливковая плесень.

Период защитного действия

Обеспечивает защитное действие культуры в течение 3-4 недель, в зависимости от складывающихся погодных условий и степени инфицированности растений.

В случае сильной зараженности посевов, рекомендуется повторная обработка через 10-15 дней после первой.

Рекомендации по применению

Перед использованием необходимо хорошо размешать содержимое канистры.

Обработку рекомендуется проводить в утренние или вечерние часы при температуре от +15°C до +25°C и скорости ветра до 3 м/с. Интервал между выпадением осадков и опрыскиванием должен составлять не менее 6 часов.

Наиболее эффективен в борьбе с мучнисторосными грибами.

Оптимальная температура для опрыскивания - от +15 до +25°C. При осеннем внесении допускается температура от +5 до +25°C.

Обычно опрыскивание проводят при первых признаках проявления болезни. Для лучшей смачиваемости листовой поверхности обрабатываемых растений, норма расхода рабочей жидкости должна составлять не менее 200 л/га.

Оптимальный срок применения – от начала кущения до появления второго междуузлия. Обработку растений препаратом целесообразно начинать, если ожидается распространение болезней, или при степени поражения растений, значение которой выше экономического порога вредоносности.

При профилактическом применении в период вегетации, КАРДОН предотвращает заражение культуры и сдвигает появление первых признаков

заболевания на более поздний срок. Даже после проявления симптомов обеспечивается эффективное и длительное сдерживание развития заболевания.

Опрыскивания посевов сахарной свеклы проводят профилактически или при появлении первых признаков болезни растения. При этом объем рабочей жидкости должен составлять 300-400 л/га.

Факторы, влияющие на эффективность

Осадки выпавшие через 1-2 часа после обработки, могут снизить биологическую эффективность препарата.

Фитотоксичность

При использовании препарата в строгом соответствии с регламентом применения, риск возникновения фитотоксичности отсутствует. Быстро разлагается в объектах окружающей среды.

Как представитель класса бензимидазолов, КАРДОН обладает положительным ростостимулирующим действием – вмешивается в метаболизм гормонов растений, влияя в конечном итоге на рост и развитие растений, на

активность ферментов, контролирующих накопление хлорофилла, белка и углеводов. В оптимальных условиях способен предотвращать полегание зерновых культур.

Совместимость

Совместим с другими гербицидами, фунгицидами, инсектицидами, стимуляторами роста и удобрениями, применяемыми в те же сроки. Перед применением рекомендуется проверять препараты на совместимость.

Для предотвращения возникновения резистентности у патогенов рекомендуется чередование с фунгицидами на основе действующих веществ из других химических классов.

Условия хранения

При хранении избегать попадания прямых солнечных лучей и соблюдать рекомендуемые температурные интервалы. По истечении гарантийного срока хранения, препарат должен быть проверен на соответствие требованиям технических условий. При установлении соответствия, может быть использован по прямому назначению.

Регламенты применения

Культура	Вредный объект	Норма расхода, л/га	Норма расхода рабочей жидкости, л/га	Способ, время обработки
Пшеница яровая	Мучнистая роса, гельминтоспориоз, корневые и прикорневые гнили, предотвращение полегания	0,3-0,6	300	Опрыскивание в период вегетации
Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса	0,6-0,8		



Двухкомпонентный системный фунгицид для эффективной защиты комплекса важнейших сельскохозяйственных культур от основных фитопатогенов

Действующее вещество:
пропиконазол + тебуконазол

Химический класс:
триазолы

Концентрация: 300+200г/л
Препартивная форма:
концентрат микроэмulsionи,
КМЭ

Упаковка: канистра, 10 л
Гарантийный срок хранения:
2 года

Температура хранения:
от -20°C до +25°C

Класс опасности для человека:
2 (высокоопасное вещество)
для пчел:
3 (малоопасное вещество)

**Комбинированная системная
ЗАЩИТА
важнейших сельскохозяйственных
культур от
основных
ФИТОПАТОГЕНОВ**

ПРОТЭБ*

Преимущества

- Широкий спектр подавляемых фитопатогенов.
- Мощные системные свойства – единство лечебного и искореняющего действия.
- Высокая проникающая способность за счет особенностей препартивной формы.

Механизм действия

Действующие вещества продукта ПРОТЭБ пропиконазол и тебуконазол относятся к одному химическому классу. Принцип действия заключается в разрушении стенок клеток возбудителей, рост мицелия прекращается, и он погибает. Перемещаются акропетально (снизу вверх), быстро абсорбируются вегетативными частями растений.

Тебуконазол обладает профилактическим и лечащим системными свойствами, наиболее эффективен в борьбе с возбудителем ржавчины, альтернариоза, фузариоза. Пропиконазол - профилактическим, сильным лечащим и искореняющим системным действием подавляет спорообразование у патогенов, снижает развитие патогенов мучнистой росы.

Скорость воздействия

Проникает в растение через листья и стебли в течение 2-4 часов после опрыскивания

Спектр действия препарата

Виды ржавчины (бурая, стеблевая, желтая; карликовая), мучнистая роса, септориоз, пиренофороз, ринхоспориоз, сетчатая и темно-бурая пятнистости.

Период защитного действия

Обеспечивает защитное действие культуры в течение 4-5 недель, в зависимости от складывающихся погодных условий и степени инфицированности растений.

Рекомендации по применению

Обычно опрыскивание проводят при первых признаках проявления болезни.

Обработку рекомендуется проводить в утренние или вечерние часы при температуре от +15°C до +25°C и скорости ветра до 3 м/с. Интервал между выпадением осадков и опрыскиванием должен составлять не менее 6 часов.

Факторы, влияющие на эффективность

Осадки, выпавшие в течении 1-2 часов после обработки, могут снизить биологическую эффективность препарата.

Фитотоксичность

При использовании препарата в строгом соответствии с регламентом применения, риск возникновения фитотоксичности отсутствует.

Условия хранения

При хранении избегать попадания прямых солнечных лучей и соблюдать рекомендуемые температурные интервалы. По истечении гарантийного срока хранения, препарат должен быть проверен на соответствие требованиям технических условий. При установлении соответствия, может быть использован по прямому назначению.

Регламенты применения

Культура	Вредный объект	Норма расхода, л/га	Норма расхода рабочей жидкости, л/га	Способ, время обработки
Пшеница озимая, яровая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, ржавчина стеблевая и ржавчина желтая, септориоз, пиренофороз, фузариоз колоса	0,3-0,4	300	Опрыскивание в период вегетации
Ячмень озимый, яровой	Мучнистая роса, ржавчина карликовая, сетчатая пятнистость и темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз, септориоз			
Рожь	Мучнистая роса, бурая пятнистость, септориоз, ринхоспориоз		200-400	
Овес	Красно-бурая пятнистость			
Просо	Гельминтоспориоз, септориоз		200-300	
Рапс яровой и озимый	Альтернариоз, мучнистая роса, фомоз	0,4-0,6	200-400	Опрыскивание в период вегетации при появлениях первых признаков одной из болезней в фазы вытягивание стеблей – начало образования стручков в нижнем ярусе.
Соя	Церкоспороз, септориоз, аскохитоз, альтернариоз, антракноз			Опрыскивание в период вегетации.
Горох	Аскохитоз, антракноз, мучнистая роса, ржавчина			Опрыскивание в период вегетации с интервалом 2-3 недели.
Горох овощной	Аскохитоз, антракноз, мучнистая роса, ржавчина			Опрыскивание в период вегетации с интервалом 2-3 недели
Нут	Аскохитоз	0,4-0,6	200-300	Опрыскивание в период вегетации при появлениях первых признаков болезни, последующее – с интервалом 10-14 дней.
Подсолнечник	Альтернариоз, белая гниль, серая гниль, фомоз, ржавчина, фомопсис, сухая ризопусчная гниль корзинки, септориоз		200-400	Опрыскивание в период вегетации при появлениях первых признаков одной из болезней в фазе начала бутонизации, последующее – с интервалом 10-14 дней.
Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз	0,4-0,6	300	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлениях первых признаков одного из заболеваний, второе – через 10-14 дней (при необходимости).
Лен-долгунец, лен масличный	Антракноз, пасмо, фузариоз	0,3-0,4	100-300	Опрыскивание посевов при появлениях первых признаков болезни начиная от фазы «елочки» до фазы бутонизации.

*препарат находится на стадии государственной регистрации или ее расширения

СПЕКТР ДЕЙСТВИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНГИЦИДОВ

ПРОТРАВИТЕЛИ СЕМЯН

ЗАБОЛЕВАНИЕ	НАЗВАНИЕ ПРЕПАРАТА		
	ВИТАЦИТ	КАРДОН	ТУРИОН
твёрдая головня пшеницы и ржи	■	■	■
твёрдая (каменная) головня ячменя	■	■	■
стеблевая головня пшеницы и ржи	■	■	■
карликовая головня пшеницы	■	■	■
пыльная головня пшеницы и ржи	■	■	■
обыкновенная (пыльная) головня просо	■	■	■
Черная (ложнопыльная) головня ячменя	■	■	■
пыльная головня овса	■	■	■
твёрдая (покрытая) головня овса	■	■	■
фузариозная корневая гниль	■	■	■
гельминтоспориозная корневая гниль	■	■	■
питиозная корневая гниль	■	■	■
церкоспореллезная корневая гниль	■	■	■
офиоболезная корневая гниль	■	■	■
фузариозная снежная плесень	■	■	■
склеротиниоз	■	■	■
тифулезная снежная плесень	■	■	■
альтернариоз	■		
мучнистая роса (при раннем проявлении)	■	■	■
виды ржавчины (при раннем проявлении)	■	■	■
другие пятнистости (при раннем проявлении)	■	■	■
комплекс естественного плесневения	■	■	■

ФУНГИЦИДЫ ПО ВЕГЕТАЦИИ



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ



ТИМАТЕРР

Системный инсектицидный протравитель
для защиты сельскохозяйственных культур
от вредителей всходов



ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ДЛИТЕЛЬНУЮ
(ДО 45 ДНЕЙ) ЗАЩИТУ,
как от почвенных,
так и от наземных вредителей

Обладает высокой
скоростью воздействия
на вредящие организмы

Защищает не только прорастающие семена,
но и вегетирующие растения

ВЫСОКАЯ ИНСЕКТИЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ
против сосущих и грызущих насекомых

doctorfarmer.kz





◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Системный послевсходовый гербицид избирательного действия против широкого спектра двудольных сорняков в посевах зерновых культур

Компоненты:

2,4-Д кислота в виде сложного 2-этилгексилового эфира + триасульфурон

Химический класс:

арилоксиалканкарбоновые кислоты + сульфонилмочевины

Концентрация:

850 г/л (по эфиру 2,4-Д) + 750 г/кг

Препартивная форма:

концентрат эмульсии, КЭ + водно-диспергируемые гранулы, ВДГ

Упаковка: бинарная канистра 4,5 л + 0,045 кг

Гарантийный срок хранения: 3 года

Температура хранения: от -10°C до +25°C

Класс опасности для человека:

2 (высокоопасное вещество для пчел:

3 (малоопасное вещество)

БИАТЛОН:

эффективно подавляет сорняки из семейства

КРЕСТОЦВЕТНЫЕ И СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ,

создает в почве

ЗАЩИТНЫЙ «ЭКРАН»,

сдерживающий вторую «волну» сорняков

БИАТЛОН

Преимущества:

- Благодаря ярко выраженному эффекту синергизма между компонентами, обладает высокой эффективностью против всех наиболее распространённых однолетних и многолетних двудольных сорняков растений в посевах зерновых культур.
- Создает длительный экранирующий эффект, позволяющий подавлять вторую «волну» сорняков, в случае ее появления.
- Глубоко проникает в корневую систему многолетних корнеотпрысковых сорняков, эффективно подавляет даже переросшие и трудноискоренимые виды (например, полынь, виды осотов, подмаренник цепкий, молочай и др.).

Механизм действия

2,4-Д кислота обладает гормональной активностью, действуя как ингибитор роста. Проникая через листья, стебли и корни, она активно влияет на процессы фотосинтеза и деление клеток в меристеме сорняков, вызывая деформацию листьев, стеблей и, как следствие, отмирание растения.

Триасульфурон блокирует синтез фермента ацетолактатсинтазы, участвующей в синтезе незаменимых аминокислот валина, лейцина и изолейцина. Подавление данного фермента блокирует деление клеток, приводит к быстрой остановке роста сорняков, пожелтению, а затем к их гибели.

Симптомы воздействия

Основными симптомами действия являются: неравномерный рост надземных органов, разного рода деформации, обесцвечивание листьев, сокращение длины междуузлий, покраснение жилок, хлороз листьев, отмирание точек роста, некроз тканей.

Скорость воздействия

Компоненты БИАТЛОНа быстро поступают в сорное растение через листья и частично через корни, активно в нем перемещаются, накапливаясь в точках роста. Рост чувствительных сорных растений и конкуренция с культурой прекращаются в течение нескольких часов после обработки.

Гибель чувствительных сорных растений происходит обычно через 3...7 дней, полная гибель наступает через 2-3 недели.

Спектр действия и эффективность препарата

Чувствительные сорняки: аистник цикутный, амброзия полыннолистная, бифора листистая, бодяк полевой, болиголов крапчатый, вика сорнолистовая, воробейник полевой, воронья лапка, галинсога (виды), герань (виды), горец (виды), гибискус тройчатый, горчица полевая, гулявник (виды), дурман обыкновенный, звездчатка средняя, клевер (виды), конопля сорная, лебеда раскидистая, льнянка обыкновенная, лопушник (виды), лютик полевой, люцерна (виды), мак – самосейка, манжетка полевая, марь (виды), мелколепестник канадский, незабудка полевая, пастушья сумка, подсолнечник сорный, полынь горькая, рапс, редька дикая, сурепка обыкновенная, фиалка полевая, ярутка полевая.

Среднечувствительные сорняки: дрема, осот полевой, паслен черный, хвощ полевой, чистец (виды).

Полный список чувствительных сорняков представлен в «Таблице эффективности...».

Период защитного действия

В почве создается защитный экран, предотвращающий появление второй «волны» сорняков. При соблюдении рекомендаций, достаточно одной обработки для эффективного подавления двудольных сорняков до конца вегета-

ции, при условии оптимального развития культуры.

Рекомендации по применению

Одна упаковка рассчитана на обработку 10 га, при норме расхода 0,45 л/га.

Наиболее эффективно применение препарата по активно вегетирующему сорнякам в интервале температур: от +8°C до +25°C.

Большинство однолетних сорняков наиболее уязвимы к действию препарата в фазу от 2 до 8 листьев или розетки. Высота многолетних корнеотпрысковых сорняков в момент обработки не должна превышать 10-15 см (для осотов фаза розетки - начала стеблевания). Фаза развития подмаренника не должна превышать 4-х мутовок.

Выонок полевой наиболее восприимчив до фазы бутонизации, при длине плетей 25-40 см.

Оптимальная фаза развития культуры для обработки гербицидом – фаза кущения зерновых.

Факторы, влияющие на эффективность

Проводить обработку посевов следует при благоприятных погодных условиях: в ясную, теплую, безветренную погоду, при достаточной увлажненности почвы.

Рекомендации по применению в неблагоприятных условиях

Не рекомендуется применять препарат при скорости ветра более 5 м/с. Во время обработки необходимо следить, чтобы не было сноса препарата на соседние чувствительные культуры.

Не рекомендуется проводить обработку в дни, когда прогнозируются ночные заморозки, из-за возможности снижения эффективности препарата. Осадки, выпавшие через 2-3 часа после опрыскивания, не снижают гербицидного действия препарата.

Рекомендуемые баковые смеси

Эффективно подавляет двудольные сорняки при самостоятельном применении, поэтому не рекомендуется к совместному использованию с другими гербицидами. Для одновременного уничтожения двудольных и злаковых сорняков, рекомендуется использовать в баковой смеси с

Регламенты применения

Культура	Вредный объект	Норма расхода, г/га, л/га	Норма расхода рабочей жидкости, л/га	Способ, время обработки
Пшеница яровая и ячмень яровой	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	4-5 г/га (триасульфурон, 750 г/кг + 0,4-0,5 л/га (2,4-Д кислота в виде сложного 2-этилгексилового эфира, 564 г/л)	150-200	Опрыскивание посевов яровых зерновых в фазе кущения до выхода в трубку, озимых – в фазе кущения весной

граминицидами ФАБРИС (ТАЙПАН в рекомендуемых нормах расхода).

Возможность возникновения резистентности

Совместное применение веществ с разным механизмом действия предотвращает появление и накопление резистентных форм сорняков, поэтому препарат рекомендуется к применению в антирезистентных программах.

Ограничения по севообороту

При применении в условиях достаточного увлажнения, на почвах с pH не выше 7,5, полностью деградирует в почве и не оказывает влияния на последующие культуры севооборота. В противном случае, рекомендуется проводить глубокую вспашку.

При необходимости пересева, в год применения можно высевать только озимую и яровую пшеницу.

Фитотоксичность

При соблюдении рекомендаций по срокам и нормам внесения препарата, случаев проявления фитотоксичности по отношению к обрабатываемым культурам не выявлено

Совместимость

Для расширения спектра действия, БИАТЛОН можно применять в баковых смесях с граминицидами, а также с различными фунгицидами, инсектицидами, минеральными удобрениями, микроэлементами и регуляторами роста, стимуляторами роста и удобрениями, применяемыми в те же сроки.

Перед применением рекомендуется проверить компоненты баковой смеси на совместимость.

Условия хранения

При хранении избегать попадания прямых солнечных лучей и соблюдать рекомендуемые температурные интервалы. По истечении гарантийного срока хранения, препарат должен быть проверен на соответствие требованиям технических условий. При установлении соответствия, может быть использован по прямому назначению.



◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Системный послевсходовый гербицид избирательного действия против однолетних и многолетних злаковых сорняков в посевах сахарной свеклы*, подсолнечника, сои, рапса, картофеля, нута, льна-долгунца, льна-кудряша.

Действующие вещества:

галаксифоп-Р-метил

Химический класс:

арилоксифенокси-пропионовые кислоты

Концентрация: 104 г/л

Препартивная форма:

концентрат эмульсии, КЭ

Упаковка: канистра, 10 л

Гарантийный срок хранения:

3 года

Температура хранения:

от -20°C до +30°C

Класс опасности

для человека:

3 (умеренно опасное вещество)

для пчел:

3 (малоопасное вещество)

ГУРОН *

Преимущества:

- ◆ Обладает системным действием, быстро поглощается листьями сорных растений и переносится к точкам роста, корням и корневищам.
- ◆ Благодаря выраженным системным свойствам, поражает корневую систему многолетних сорняков и устраниет возможность их вторичного отрастания из корневищ в текущем и следующем сезоне.
- ◆ Благодаря улучшенной рецептуре, не фитотоксичен для двудольных культур, даже в повышенных нормах расхода.

Механизм действия

Галаксифоп-Р-метил быстро поглощается листьями и переносится к корням и корневищам, вызывая обширное поражение точек роста у чувствительных злаков.

Ингибитирует синтез ацетил-СоА-карбоксилазы и биосинтез жирных кислот, нарушает фотосинтез. В результате, приостанавливается рост надземной массы и корневой системы сорных растений, появляется хлороз. Чувствительные растения вянут, ткани высыхают, зачастую приобретая красноватую антоциановую окраску.

Симптомы воздействия

Первые видимые симптомы действия препарата (хлоротизация, появление антоциановой окраски) становятся заметны на 5-7 день после опрыскивания.

Скорость воздействия

Препарат после обработки быстро проникает в листья сорных растений, по сосудистой системе перемещается ко всем органам (включая корни и корневища), вызывая массовое поражение точек роста у чувствительных злаков. Поглощение гербицида с поверхности листьев сорных растений происходит в течение одного часа. Полное отмирание сорных злаков происходит через 10...15 дней и позднее в зависимости от погодных условий.

Спектр действия и эффективность препарата

Чувствительные сорняки: гумай, костер ржаной, костер безостый, метлица обыкновенная, овсянка обыкновенная, плевел (виды), просо куриное, пырей ползучий, свинорой пальчатый, щетинник (виды).

Полный список чувствительных сорняков представлен в «Таблице эффективности...».

Период защитного действия

Действует только на сорняки, имеющиеся в посевах на момент обработки. Однократное применение обеспечивает эффективную защиту посевов в течение всего вегетационного периода (при отсутствии второй «волны» сорняков).

Рекомендации по применению

ГУРОН оказывает наибольшее действие в период активного роста молодых сорных растений, в интервале температур: от +10°C до +25°C. Однолетние злаковые сорняки наиболее чувствительны в фазе от 2-6 листьев до кущения. Оптимальное время применения для многолетних злаковых сорняков - когда растения имеют хорошо развитые листья в достаточном количестве, для более полного и быстрого поглощения препарата (высота 10-20 см). Для борьбы с овсянкой в фазе 2...3-х листьев рекомендуется применять ГУРОН в норме расхода - 0,5 л/га, в фазе кущения-выхода в трубку - 0,8 л/га.

Сроки обработки не зависят от стадии развития культуры, однако, культурные растения не должны закрывать собой сорняки, мешая равномерному внесению.

Факторы, влияющие на эффективность

Пониженные (меньше +10°C) или повышенные (больше +25°C) температуры воздуха, засуха, заморозки и другие стрессовые факторы в период внесения препарата могут существенно замедлить действие препарата на сорняки (признаки действия гербицида появляются на 3-5 дней позже), а также снизить его эффективность.

Для получения максимального эффекта при борьбе с многолетними злаками, следует исключить культивацию междуурядий в течение двух недель после обработки, до момента, когда процесс отмирания корневищ станет необратимым.

Рекомендации по применению в неблагоприятных условиях

Не рекомендуется применять препарат при скорости ветра более 5 м/с. Во время обработки необходимо следить, чтобы не было сноса препарата на соседние чувствительные культуры.

Не следует проводить обработку при обильной росе или если в ближайший час после применения ожидается выпадение осадков.

При высокой засоренности посевов и в случае наличия переросших сорняков обработку следует проводить максимальной рекомендованной для культуры нормой препарата.

Возможность возникновения резистентности

Резистентность к препарату не выявлена. Для преду-

преждения возникновения устойчивых видов, следует чередовать применение с препаратами, имеющими другие механизмы действия.

Ограничения по севообороту

Может использоваться во всех типах севооборотов без ограничений. В полевых условиях период полного распада действующего вещества в почве составляет 1...3 дня.

Фитотоксичность

При использовании ГУРОНа в соответствии с регламентом применения, не создается риска возникновения фитотоксичности для двудольных культур, так как препарат селективен ко всем широколистным (двудольным) культурам.

Совместимость

Совместим с другими гербицидами, фунгицидами, инсектицидами, регуляторами роста и удобрениями, применяемыми в те же сроки. Перед применением рекомендуется проверить компоненты баковой смеси на совместимость.

Условия хранения

При хранении избегать попадания прямых солнечных лучей и соблюдать рекомендуемые температурные интервалы. По истечении гарантийного срока хранения, препарат должен быть проверен на соответствие требованиям технических условий. При установлении соответствия, может быть использован по прямому назначению.

Регламенты применения

Культура	Вредный объект	Норма расхода рабочей жидкости, л/га	Способ, время обработки
Свёкла сахарная*, подсолнечник, рапс яровой	Однолетние просовидные (просо куриное, просо сорнополевое, виды щетинника) сорняки	0,5	Опрыскивание сорняков в период их активного роста (в фазе от 2-6 листьев до кущения)
Лён-долгунец и лен-кудряш	Многолетние злаковые сорняки		Опрыскивание посевов при высоте льна 3-10 см и пырея 10-20 см
Свёкла сахарная*, подсолнечник, рапс яровой	Многолетние злаковые (пырей ползучий) сорняки	1,0 200-300	Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-15 см
Соя, картофель, нут	Однолетние просовидные (просо куриное, просо сорнополевое, виды щетинника) и некоторые многолетние злаковые сорняки	0,5-1,0	Опрыскивание сорняков в период их активного роста (в фазе от 2-6 листьев до кущения)

ГУРОН:
ИННОВАЦИОННАЯ
РЕЦЕПТУРА, повышенная
ЭФФЕКТИВНОСТЬ В
БОРЬБЕ С ОДНОЛЕТНИМИ
И МНОГОЛЕТНИМИ
ЗЛАКОВЫМИ
сорняками

*препарат находится на стадии государственной регистрации или ее расширения



Комбинированный системный граминицид для борьбы с однолетними и многолетними злаковыми сорняками в посевах широколиственных культур

Действующее вещество:
Клетодим + галоксифоп-Р-метил

Химический класс:
Арилоксиалканкарбоновые кислоты + циклогександионы

Концентрация: 130 + 80 г/л

Препартивная форма:
масляный концентрат эмульсии, МКЭ

Упаковка: канистра 5, 10 и 20 л

Гарантийный срок хранения:
3 года

Температура хранения:
от -5°C до +25°C

Класс опасности

для человека:
2 (высокоопасное вещество)

для пчел:
3 (малоопасное вещество)

**Эффективное средство
УНИЧТОЖЕНИЯ
однолетних и многолетних
ЗЛАКОВЫХ СОРНЯКОВ**
(надземной части и корневой системы)

КЛЕГАЛ *

Преимущества

- Эффективное средство для уничтожения однолетних и многолетних злаковых сорняков;
- Уничтожение надземной части и корневой системы сорняков;
- Высокая скорость действия;
- Продолжительное действие против многолетних сорняков - в течение всего периода вегетации;
- Применяется в любые фазы развития культуры;
- Устойчив к осадкам - уже через час после обработки они не оказывают отрицательного влияния на эффективность гербицида

Механизм действия

Клегал является селективным системным гербицидом. Оба действующих вещества подавляют биосинтез жирных кислот в результате ингибирования ацетил-СоА-карбоксилазы. Галоксифоп-Р-метил поступает в растение через листья и корни и гидролизуется до галоксифопа-Р, который перемещается в меристемные ткани и подавляет их рост. Клетодим быстро адсорбируется и перемещается из обработанных листьев в корневую систему и точки роста сорных растений.

Скорость и симптомы воздействия

Симптомы гербицидного воздействия проявляются в течение 1-3 дней после обработки, гибель сорняков наступает в течение 1-2 недель, в зависимости от вида сорного растения, фазы его развития и погодных условий.

Спектр действия препарата

Однолетние и многолетние злаковые (в том числе пырей ползучий), сорные растения

Период защитного действия

Препарат проникает в растения через надземные органы и перемещается к корневой системе, поэтому действие препарата отмечено на сорняки, встречающиеся в посеве в период обработки препаратом. Гербицид не проникает через почву и не оказывает действия на сорняки, появившиеся после опрыскивания. Эффективность препарата сохраняется, как правило, в течение всего вегетационного периода.

Рекомендации по применению

Перед приготовлением рабочего раствора препарат следует тщательно перемешать в заводской упаковке. Отмеряют количество препарата, требуемое на одну заправку опрыскивателя. Далее рабочий раствор готовят следующим образом: бак опрыскивателя наполняют примерно наполовину водой, вливают в него необходимое количество гербицида, доливают водой до полного объема при постоянном перемешивании раствора гидравлическими мешалками. При этом смывают несколько раз водой емкость, в которой хранился гербицид.

Факторы, влияющие на эффективность

Пониженные (меньше +10°C) или повышенные (больше +25°C) температуры воздуха, засуха, заморозки и другие стрессовые факторы в период внесения препарата могут существенно замедлить действие препарата на сорняки (признаки действия гербицида появляются на 3-5 дней позже), а также снизить его эффективность.

Для получения максимального эффекта при борьбе с многолетними злаками, следует исключить культивацию междуурядий в течение двух недель после обработки, до момента, когда процесс отмирания корневищ станет необратимым.

Рекомендации по применению в неблагоприятных условиях

Не рекомендуется применять препарат при скорости ветра более 5 м/с. Во время обработки необходимо следить, чтобы не было сноса препарата на соседние чувствительные культуры.

Не следует проводить опрыскивание в периоды, когда листья сорняков и культурных растений увлажнены.

При высокой засоренности посевов и в случае наличия переросших сорняков обработку следует проводить максимальной рекомендованной для культуры нормой препарата.

Фитотоксичность

Не фитотоксичен для большинства двудольных культур, но уничтожает однолетние злаковые сорняки и пырей ползучий.

Рекомендуемые баковые смеси

Совместим с гербицидами на основе десмедифама, фенмедифама и этофумезата, гербицидами на основе клопирагида, производных сульфонилмочевины и ряда других действующих веществ. Также совместим со многими инсектицидами и фунгицидами. Не совместим с пестицидами, имеющими щелочную реакцию (рН более 8,5).

Регламенты применения

Культура	Вредный объект	Норма расхода, л/га	Норма расхода рабочей жидкости, л/га	Способ, время обработки
Лен-долгунец	Однолетние злаковые сорные растения	0,4		Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев сорных растений независимо от фазы развития культуры
	Многолетние злаковые, в том числе пырей ползучий, сорные растения	0,8		Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см, независимо от фазы развития культуры
	Однолетние злаковые сорные растения	0,4		Опрыскивание посевов в фазе 2-4-х листьев у сорных растений (в фазе «елочки» культуры)
	Многолетние злаковые, в том числе пырей ползучий, сорные растения	0,8		Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см (в фазе «елочки» культуры)
	Однолетние злаковые сорные растения	0,4		Опрыскивание посевов в фазе 2-4-х листьев у сорных растений (в фазе «елочки» культуры)
	Многолетние злаковые, в том числе пырей ползучий, сорные растения	0,8		Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см (в фазе «елочки» культуры)
Лен масличный	Однолетние злаковые сорные растения	0,4		Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см (в фазе «елочки» культуры)
	Многолетние злаковые, в том числе пырей ползучий, сорные растения	0,8		Опрыскивание посадок в фазе 2-6 листьев сорных растений независимо от фазы развития культуры
Картофель	Однолетние злаковые сорные растения	0,4		Опрыскивание посадок при высоте пырея ползучего 10-20 см, независимо от фазы развития культуры
	Многолетние злаковые, в том числе пырей ползучий, сорные растения	0,8		Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев сорных растений независимо от фазы развития культуры
Рапс озимый, горох, гречиха, люпин, люцерна, Чечевица	Однолетние злаковые сорные растения	0,4		Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев сорных растений независимо от фазы развития культуры
	Многолетние злаковые, в том числе пырей ползучий, сорные растения	0,8		Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см, независимо от фазы развития культуры

Если Клегал применяется в баковой смеси с другими пестицидами, смешивать препараты в воде бака опрыскивателя надо в следующем порядке:

Каждый последующий компонент добавляется после полного растворения (диспергирования) предыдущего. Перед применением необходимо проверить физическую совместимость компонентов баковой смеси.

Возможность возникновения резистентности

Случаев возникновения резистентности для препарата не выявлено. Во избежание появления устойчивости злаковых сорняков к препаратуре желательно чередовать применение препарата с гербицидами других химических групп.

Условия хранения

При хранении избегать попадания прямых солнечных лучей и соблюдать рекомендуемые температурные интервалы. По истечении гарантийного срока хранения, препарат должен быть проверен на соответствие требованиям технических условий. При установлении соответствия, может быть использован по прямому назначению.



Системный послевсходовый гербицид избирательного действия против многолетних двудольных сорняков в посевах технических культур

Действующее вещество:

клопирагид

Химический класс:
пиридинкарбоновые кислоты

Концентрация: 750 г/кг

Препартивная форма:
водно-диспергируемые
гранулы, ВДГ

Упаковка: флакон 0,5 кг

Гарантийный срок хранения:
3 года

Температура хранения:
от -20°C до +30°C

Класс опасности для человека:
3 (умеренно опасное вещество)
для пчел:
3 (малоопасное вещество)

КЛОПИРАЛИД:
эффективно
УНИЧТОЖАЕТ ВИДЫ
ОСОТА, РОМАШКИ,
ГОРЦА И БОДЯКА
ПОЛЕВОГО

КЛОПИРАЛИД

Преимущества:

- Высокоэффективен против малолетних и многолетних двудольных сорняков, особенно против таких злостных и трудноискоренимых, как виды осотов, горцев и ромашки.
- Уничтожает не только надземные части, но и корневую систему сорняков, включая почки возобновления и корневые отпрыски, тем самым полностью исключая их отрастание и вегетативное размножение.
- Идеальный компонент для использования в баковых смесях с другими гербицидами (за счет выраженного эффекта синергизма).

Механизм действия

Препарат поступает в сорняки через листья и корни и легко перемещается по всему растению в восходящем и нисходящем направлении.

Клопирагид является синтетической формой натурального растительного гормона, замещает натуральные гормоны растения, нарушает процессы дыхания клеток и блокирует точки роста, что приводит к значительным нарушениям ростовых процессов в растениях и их гибели.

Симптомы воздействия

Основными симптомами действия являются: неравномерный рост надземных органов, разного рода деформации, обесцвечивание листьев, сокращение длины междуузлий, покраснение жилок, хлороз листьев, отмирание точек роста, некроз тканей.

Скорость воздействия

Рост чувствительных сорных растений и конкуренция с культурой прекращаются в течение нескольких часов после обработки. Гибель чувствительных сорных растений происходит обычно через 3-7 дней, полная гибель наступает через 2-3 недели.

Спектр действия

Чувствительные сорняки: амброзия полыннолистная, бодяк полевой, болиголов крапчатый, василек синий, вика сорнополевая, воронья лапка, горец (виды), гулявник высокий, дурнишник обыкновенный, дурман обыкновенный, конопля сорная, крапива жгучая, крапива двудомная, курай, лопушник (виды), льнянка обыкновенная, мак-самосейка, манжетка полевая, мать-и-мачеха обыкновенная, мелколепестник канадский, молокан татарский, молочай лозный, одуванчик лекарственный, осот полевой, очный цвет полевой, паслен черный, подсолнечник сорный, пупавка (виды), ромашка непахучая, щавель конский, ярутка полевая, яснотка (виды).

Среднечувствительные: воробейник полевой, выюнок полевой, герань (виды), гречишко татарская, двурядка (виды), донник лекарственный, дымянка аптечная, желтушник левкойный, звездчатка средняя, клевер (виды), клоповник мусорный, коммелина, липучка (виды), лютик полевой, люцерна (виды), незабудка полевая, марь (виды), пастушья сумка, пикульник (виды), подмаренник цепкий, подорожник (виды), полынь горькая, смолевка белая, чина (виды).

Полный список чувствительных сорняков представлен в «Таблице эффективности...».

Период защитного действия

Не обладает почвенным действием, воздействует только на сорняки, которые присутствовали на момент обработки. При соблюдении рекомендаций, а также при условии оптимального развития культуры, достаточно одной обработки для эффективного подавления двудольных сорняков до конца вегетации.

Рекомендации по применению

Препарат наиболее эффективен при опрыскивании по активно вегетирующими сорнякам в интервале температур: от +10°C до +25°C.

Максимальная эффективность действия препарата наблюдается при применении его на начальных этапах роста и развития сорняков: фаза 2-6 листьев однолетних двудольных сорняков и фаза розетки многолетних двудольных сорняков.

Факторы, влияющие на эффективность

Проводить обработку посевов следует при благоприятных погодных условиях: в ясную, теплую, безветренную погоду, при достаточной увлажненности почвы.

Не рекомендуется проводить механическую обработку почвы на протяжении 2-х недель после применения препарата, поскольку это может нарушить защитный почвенный экран и проводящую систему сорняков, что снизит эффективность их уничтожения.

Прохладные погодные условия (среднесуточная температура менее +12°C) замедляют проявление визуальных признаков гербицидного действия и могут снизить эффективность действия препарата на сорняки.

Внесение препарата, при нахождении культуры в условиях стресса, вызванного засухой, заморозками, повреждениями вредителями и болезнями, может повысить риск возникновения фитотоксичности.

Рекомендации по применению в неблагоприятных условиях

Не рекомендуется применять препарат при скорости ветра более 5 м/с. Во время обработки необходимо следить, чтобы не было сноса препарата на соседние чувствительные культуры.

Наличие капельной влаги на растениях, а также осадки, выпавшие в течение 6 часов после внесения препара-

та, существенно снижают эффективность его воздействия на сорняки.

Для получения высокой биологической эффективности препарата необходимо проводить обработку в наиболее чувствительные фазы развития сорных растений.

Ограничения по севообороту

КЛОПИРАЛИД подвергается быстрому микробиологическому разложению в почве (в полевых условиях период полураспада длится 8-66 дней), поэтому, на следующий год после применения препарата в полной норме расхода, на том же поле можно выращивать любые культуры, кроме картофеля.

Фитотоксичность

При соблюдении рекомендаций по срокам и нормам внесения препарата, случаев проявления фитотоксичности по отношению к обрабатываемым культурам не выявлено.

Совместимость

Совместим с другими гербицидами, фунгицидами, инсектицидами, стимуляторами роста и удобрениями, применяемыми в те же сроки, за исключением сильнощелочных.

Перед применением рекомендуется проверить компоненты баковой смеси на совместимость.

Условия хранения

При хранении избегать попадания прямых солнечных лучей и соблюдать рекомендуемые температурные интервалы. По истечении гарантийного срока хранения, препарат должен быть проверен на соответствие требованиям технических условий. При установлении соответствия, может быть использован по прямому назначению.

Культура	Вредный объект	Норма расхода, кг/га	Норма расхода рабочей жидкости, л/га	Способ, время обработки
Рапс яровой	Однолетние двудольные (виды ромашки, горца) и некоторые многолетние (осот, бодяк) сорняки	0,12	200-300	Опрыскивание посевов в фазе 3-4 настоящих листьев культуры
Лен-масличный				Опрыскивание посевов в фазе «елочки» культуры, и фазе розетки многолетних корнеотпрысковых сорняков



Doctor
Farmer



Системный послевсходовый гербицид избирательного действия против однолетних и некоторых многолетних двудольных сорняков в посевах зерновых культур и кукурузы

Действующие вещества:
2,4-Д кислота в виде сложного
2-этилгексилового эфира
+ клопирапалид в виде сложного
2-этилгексилового эфира

Химический класс:
арилоксиалканкарбоновые +
пиридинкарбоновые кислоты

Концентрация:
619 г/л (по эфиру 2,4-Д) + 58 г/л
(по эфиру клопирапалида)

Препартивная форма:
концентрат эмульсии, КЭ

Упаковка: канистра, 10 л

Гарантийный срок хранения:

3 года

Температура хранения:
от -10°C до +25°C

**Класс опасности
для человека:**
2 (высокоопасное вещество)
для пчел:

3 (малоопасное вещество)

**КЛОПЭФИР:
НЕЗАМЕНИМЫЙ
ГЕРБИЦИД** в борьбе
**С МОЛОЧАЕМ
ЛОЗНЫМ** и другими
трудноискоренимыми
сорняками

КЛОПЭФИР

Преимущества:

- Незаменимый гербицид в борьбе с трудноискоренимыми многолетними двудольными сорняками, включая молочай лозный.
- Уничтожает не только надземную часть, но и корневую систему сорных растений, обеспечивая защитное действие в течение всего вегетационного периода.
- Благодаря эфирной форме, быстро проникает в ткани сорных растений, поэтому выпадение осадков через 1-1,5 часа после обработки не оказывает влияния на биологическую эффективность.

Механизм действия

Эфирные формы 2,4-Д кислоты и клопирапалида являются синтетическими аналогами растительных гормонов роста. Попав в растение, они быстро перераспределяются (по ксилеме и флоэме) и замещают натуральные гормоны растений, блокируя, таким образом, их функции. При этом происходит перенасыщение синтетическими гормонами, что приводит к нарушениям процессов фотосинтеза и деления клеток, вызывая аномальную деформацию листьев, значительное нарушение роста сорняков и последующую их гибель.

Симптомы воздействия

Основными симптомами действия являются: неравномерный рост надземных органов, разного рода деформации, обесцвечивание листьев, сокращение длины междуузлий, покраснение жилок, хлороз листьев, отмирание точек роста, некроз тканей.

Скорость воздействия

Первые признаки гербицидного действия, при благоприятных погодных условиях, проявляются на чувствительных сорняках в виде искривлений и хлорозов, на 1-2 день после внесения препарата.

Активный рост сорняков прекращается уже в течение первых суток после опрыскивания. Полная гибель сорняков происходит на протяжении 14...20 дней после применения.

Спектр действия

Чувствительные сорняки: аистник цикутный, амброзия полыннолистная, бифора лучистая, бодяк полевой, болиголов крапчатый, василек синий, вика сорнополевая, воробейник полевой, воронья лапка, горец (виды), горчица полевая, гречишко татарская, дурнишник обыкновенный, дурман обыкновенный, звездчатка средняя, конопля сорная, крапива двудомная, крапива жгучая, крестовник обыкновенный, кудрявый, липучка (виды), лопушник (виды), льнянка обыкновенная, молочай лозный, сурепка обыкновенная.

Среднечувствительные: верonica, выночник полевой, галинсога (виды), герань нежная, герань рассеченная, гибискус тройчатый, горох посевной, горошек мышиный, гулявник высокий, двурядка (виды), донник лекарственный, дрема, дымянка аптечная, желтушник левкойный, клоповник мусорный, коммелина, куколь обыкновенный, лебеда раскидистая, лютик полевой, паслен черный, пикульник (виды), подорожник (виды), полынь горькая, смолевка белая, фиалка полевая.

Полный список чувствительных сорняков представлен в «Таблице эффективности...».

Период защитного действия

Не обладает почвенным действием, воздействует только на сорняки, которые присутствовали на момент обработки. При соблюдении рекомендаций достаточно одной обработки для эффективного подавления двудольных

сорняков до конца вегетации, при условии оптимального развития культуры.

Рекомендации по применению

Наиболее эффективно применение препарата по активно вегетирующему сорнякам в интервале температур: от +8°C до +25°C.

Большинство однолетних сорняков наиболее уязвимы к действию препарата при обработке в фазу от 2 до 8 листьев или розетки. Высота многолетних корнеотпрысковых в момент обработки не должна превышать 10-15 см (для осотов фаза розетки - начала стеблевания). Фаза развития подмаренника не должна превышать 4-х мутовок.

Выночник полевой наиболее восприимчив до фазы бутонизации, при длине плетей 25-40 см.

Оптимальные фазы развития культуры для обработки гербицидом – зерновые - фаза кущения, кукуруза - фаза 3-4 листьев.

При низком и среднем уровне засоренности многолетними двудольными сорняками в фазах розетки - начала роста стебля, норма расхода препарата составляет 0,6-0,7 л/га, при высоте до 15-20 см – 0,8 л/га.

Факторы, влияющие на эффективность

Проводить обработку посевов следует при благоприятных погодных условиях: в ясную, теплую, безветренную погоду, при достаточной увлажненности почвы.

Рекомендации по применению в неблагоприятных условиях

Не рекомендуется применять препарат при скорости ветра более 5 м/с. Во время обработки необходимо следить, чтобы не было сноса препарата на соседние чувствительные культуры.

Не рекомендуется проводить обработку в те дни, когда прогнозируютсяочные заморозки и после них, из-за возможности снижения эффективности препарата. Осадки, выпавшие через 2-3 часа после опрыскивания, не снижают гербицидного действия.

Рекомендуемые баковые смеси

Для повышения эффективности, против ряда сорняков (подмаренник цепкий и др.) рекомендуется баковая смесь с гербицидом СТАЛКЕР в следующем соотношении: 0,4-0,5 л/га КЛОПЭФИР + 12-15 г/га СТАЛКЕР. Для одновре-

Регламенты применения

Культура	Вредный объект	Норма расхода рабочей жидкости, л/га	Способ, время обработки
Пшеница яровая и ячмень	Однолетние и некоторые многолетние (в т.ч. бодяк полевой) двудольные сорняки	0,6-0,8	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и в ранние фазы роста сорняков.
		200-300	Опрыскивание посевов в фазе 3-4 листьев культуры и в ранние фазы роста сорняков
		0,7-0,9	

менного уничтожения двудольных и злаковых сорняков в посевах зерновых рекомендуется использовать в баковой смеси с граминицидами ФАБРИС, ТАЙПАН (в рекомендуемых нормах расхода).

При составлении баковых смесей с глифосатодержащими препаратами, для усиления эффекта в борьбе с молочаем лозным, рекомендуется придерживаться соотношения РАП (3,0-4,0 л/га) + КЛОПЭФИР (0,4-0,5 л/га).

Возможность возникновения резистентности

Резистентность к препарату не выявлена. Для предупреждения возникновения устойчивых видов следует чередовать применение с препаратами, имеющими другие механизмы действия.

Ограничения по севообороту

В связи с быстрым периодом распада в почве (в течение 10-20 дней), препарат не обладает последействием и может использоваться во всех типах севооборотов без ограничений.

Фитотоксичность

При соблюдении рекомендаций по срокам и нормам внесения препарата, случаев проявления фитотоксичности по отношению к обрабатываемым культурам не выявлено.

Совместимость

Для расширения спектра действия КЛОПЭФИР можно применять в баковых смесях с граминицидами, а также с различными фунгицидами, инсектицидами, минеральными удобрениями, микроэлементами и регуляторами роста, стимуляторами роста (КОНТУР) и удобрениями, применяемыми в те же сроки, на соответствующих культурах.

Перед применением рекомендуется проверить компоненты баковой смеси на совместимость.

Условия хранения

При хранении избегать попадания прямых солнечных лучей и соблюдать рекомендуемые температурные интервалы. По истечении гарантийного срока хранения, препарат должен быть проверен на соответствие требованиям технических условий. При установлении соответствия, может быть использован по прямому назначению.



Системный послевсходовый гербицид избирательного действия против однолетних и некоторых многолетних двудольных сорняков в посевах зерновых культур

Действующее вещество:

метсульфурон-метил

Химический класс:
сульфонилмочевины

Концентрация: 600 г/кг

Препартивная форма:
водно-диспергируемые
гранулы, ВДГ

Упаковка: флакон 0,5 кг

Гарантийный срок хранения:
3 года

Температура хранения:
от -20°C до +30°C

Класс опасности для человека:
3 (умеренноопасное вещество)

для пчел:
3 (малоопасное вещество)

МЕТУРОН:
уничтожает
БОЛЬШИНСТВО
ДВУДОЛЬНЫХ
СОРНИКОВ, включая
устойчивые к 2,4-Д и
МЦПА, а также
ПРЕПЯТСТВУЕТ
ПОЯВЛЕНИЮ ВТОРОЙ
«ВОЛНЫ»
СОРНИКОВ

МЕТУРОН

Преимущества:

- Высокоэффективен против широкого спектра сорняков, включая однолетние двудольные, устойчивые к 2,4-Д и МЦПА и некоторые многолетние корнеотпрысковые.
- Один из самых эффективных сульфонилмочевинных препаратов для борьбы с юнком полевым.
- Имеет широкий интервал применения – от фазы 2...3 листьев культуры у зерновых.
- Создает «защитный экран» в почве, предотвращающий появление второй «волны» сорняков.

Механизм действия

Метсульфурон-метил проникает в растение через листья и частично через корневую систему, блокирует в нем синтез фермента ацетолактатсигнатазы, участвующей в синтезе незаменимых аминокислот валина, лейцина и изолейцина. Подавление данного фермента блокирует деление клеток, приводит к быстрой остановке роста сорняков, пожелтению, а затем к их гибели.

Симптомы воздействия

Появление симптомов зависит от вида сорняков, стадии роста и погодных условий. Первые видимые симптомы воздействия гербицида (хлороэзы, некрозы, изменения окраски) проявляются спустя 3-7 дней после опрыскивания.

Скорость воздействия

Активный рост сорных растений прекращается через несколько часов после обработки, снижается потребление ими питательных веществ и воды. Полная гибель сорных растений происходит через 2-4 недели после опрыскивания.

Менее чувствительные (юнок полевой), или сорняки, находящиеся в более поздней фазе развития, могут сохраняться в посевах, но их рост приостанавливается, и они не могут конкурировать с культурой в потреблении питательных веществ и воды. Неблагоприятные для развития растений погодные условия снижают скорость проникновения препарата и замедляют срок появления визуальных признаков действия гербицида на сорняки. В теплую и влажную погоду действие гербицида усиливается.

Спектр действия

Чувствительные сорняки: аистник цикутный, амброзия полыннолистная, бифора лущистая, бородавник обыкновенный, вика сорнополевая, воробейник полевой, воронья лапка, галиногса (виды), герань рассеченная, горох посевной, горчица полевая, донник лекарственный, дурман обыкновенный, дымянка аптечная, желтушник левкойный, звездчатка средняя, крапива жгучая, крестовник обыкновенный, куколь обыкновенный, курай, липучка (виды), лопушник (виды), льянка обыкновенная, лютик полевой, мак-самосейка, манжетка полевая, одуванчик лекарственный, пастушья сумка, пикульник (виды), подсолнечник сорный, пупавка (виды), ромашка непахучая, сурепка обыкновенная, фиалка полевая, чина (виды), щирица запрокинутая, ярутка полевая.

Среднечувствительные: верonica, герань нежная, гибискус тройчатый, горец почечуйный, горец юнковый, гречишко татарская, дрема, крапива двудомная, марь многосемянная, марь фиголистная, мать-и-мачеха обыкновенная, мелколепестник канадский, молокан татарский, молочай лозный, осот полевой, подорожник (виды), смоловка белая, яснотка (виды).

Полный список чувствительных сорняков представлен в «Таблице эффективности...».

Период защитного действия

Действует не только на сорняки, имеющиеся в посевах на момент обработки, но и создает в почве «защитный экран», препятствующий появлению второй «волны» сорняков. Однократное применение обеспечивает эффективную защиту посевов в течение всего вегетационного периода, при усло-

вии оптимальной конкуренции культуры.

Рекомендации по применению

Наиболее эффективно применение по активно вегетирующим сорнякам в интервале температур; от +10°C до +25°C. Обладает исключительной избирательностью действия в отношении зерновых культур, оказывая наиболее сильное действие в период активного роста молодых сорных растений.

Препарат высокоэффективен против однолетних и некоторых многолетних (в т. ч. устойчивых к 2,4-Д) двудольных сорняков в посевах зерновых. Оптимальные сроки его применения - от фазы 3-х листьев до конца кущения культуры. Норма расхода рабочей жидкости должна быть достаточной для полного смачивания листовой поверхности сорняков.

Однолетние сорняки эффективно подавляются при обработке в фазу 2-4 листьев, многолетние - в фазу розетки.

Факторы, влияющие на эффективность

Проводить обработку посевов следует при благоприятных погодных условиях: в ясную, теплую, погоду, при достаточной увлажненности почвы.

Осадки, выпавшие в течение 4 часов после внесения препарата, могут снизить эффективность его действия.

Рекомендации по применению в неблагоприятных условиях

Применять препарат нужно при скорости ветра не более 5 м/с. Во время обработки необходимо следить, чтобы не было сноса препарата на соседние чувствительные культуры.

Низкие температуры, засуха замедляют действие препарата и проявление визуальных признаков гербицидного действия.

Рекомендуемые баковые смеси

Для усиления эффективности, в первую очередь против многолетних корнеотпрысковых сорняков (виды осота, юнок полевой), рекомендуется использовать МЕТУРОН в комбинации с гербицидами из других химических классов. Особо следует отметить баковые смеси с препаратами, содержащими эфиры 2,4-Д кислоты: МЕТУРОН (5...6 г/га)+ЭЛАНТ (0,5 л/га), МЕТУРОН (5 г/га)+ЭЛАНТ ПРЕМИ-

УМ (0,4 л/га).

Возможность возникновения резистентности

Резистентность к препарату не выявлена. Для предупреждения возникновения устойчивых видов следует чередовать применение с препаратами, имеющими другие механизмы действия.

Ограничения по севообороту

При составлении севооборотов необходимо учитывать устойчивость последующих культур к метсульфурон-метилу. При необходимости пересева обработанной площади можно высевать только яровые зерновые. На следующий год, после применения в полной норме расхода (а также на почвах с pH выше 7,5 и при продолжительной почвенной засухе), не рекомендуется высевать свеклу, овощи, гречиху и подсолнечник. При необходимости - только после глубокой вспашки.

Фитотоксичность

При соблюдении рекомендаций по срокам и нормам внесения препарата, случаев проявления фитотоксичности по отношению к обрабатываемым культурам не выявлено.

Однако, при проведении обработок, когда культура находится в угнетенном состоянии, по причине неблагоприятных условий (засуха, избыток влаги, недостаток питания, болезни, повреждения вредителями), может наблюдаться отставание в росте и/или пожелтение листьев.

Совместимость

Препарат можно использовать в баковых смесях с большинством гербицидов, инсектицидов и фунгицидов, применяемых в те же сроки.

Перед применением рекомендуется проверить компоненты баковой смеси на совместимость.

Условия хранения

При хранении избегать попадания прямых солнечных лучей и соблюдать рекомендуемые температурные интервалы. По истечении гарантийного срока хранения, препарат должен быть проверен на соответствие требованиям технических условий. При установлении соответствия, может быть использован по прямому назначению.

Регламенты применения

Культура	Вредный объект	Норма расхода рабочей жидкости, л/га	Способ, время обработки
Пшеница яровая и озимая*	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	8-10 200-300	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев - до второго междоузлия культуры. На следующий год можно высевать только зерновые колосовые культуры
Лен-долгунец*	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	8-10	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» при высоте культуры 3-10 см



Системный довсходовый гербицид для борьбы с однолетними злаковыми и некоторыми двудольными сорняками в посевах подсолнечника, кукурузы, сои, рапса и сахарной свеклы.

Действующее вещество:

С-металохлор

Химический класс:

хлорацетамиды

Концентрация: 960 г/кг

Препартивная форма: концентрат эмульсии, КЭ

Упаковка: канистра 10 л

Гарантийный срок хранения:

2 года

Температура хранения:

от -15°C до +30°C

Класс опасности для человека:

3 (умеренно опасное вещество)

для пчел:

3 (малоопасное вещество)

**НАДЕЖНАЯ
ЗАЩИТА
В НАИБОЛЕЕ
КРИТИЧЕСКИЙ
ПЕРИОД РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ
ОТ ЗЛАКОВЫХ
И ДВУДОЛЬНЫХ
СОРНЯКОВ**

НАВИЕТ

Преимущества:

- Высокоэффективен против однолетних злаковых и двудольных сорняков.
- Создает длительный «защитный экран», сдерживая повторное отрастание многих видов сорняков.
- Обеспечивает надежную защиту культур, в наиболее критический период развития, исключая конкуренцию со стороны сорной растительности.
- Обладает высокой избирательностью на широком спектре применяемых культур.
- В течение сезона действующее вещество полностью разлагается в почве, исключая влияние на последующие культуры в севообороте.

Механизм действия

С-металохлор поглощается преимущественно гипокотилями и побегами, ингибируя деление клеток путем подавления активности биосинтеза липидов и жирных кислот, флавоноидов и протеина, нарушая развитие сорняков в момент их прорастания.

Симптомы воздействия

Проявление симптомов зависит от вида сорняков, наблюдается непрорастание семян, уродство и задержка в развитии побегов.

Скорость воздействия

Сорняки отмирают после прорастания (в зависимости от вида), влажная почва заметно усиливает эффект. Препарат оказывает воздействие на сорные растения через колеоптиль и гипокотиль, предотвращая их прорастание и появление на поверхности почвы.

Спектр действия

Чувствительные сорняки: куриное просо, щетинник (виды), росичка (виды), гумай (проростки), горчица полевая, щирица (виды), звездчатка средняя, овсянка, пастушья сумка, портулак огородный, ромашка (виды), галиногса (виды), яснотка (виды).

Среднечувствительные: марь белая, дурман, горец (виды), паслен черный, дурнишник.

Полный список чувствительных сорняков представлен в «Таблице эффективности...».

Период защитного действия

При применении в почве создается «защитный экран» поэтому не возникает проблем со второй волной сорняков. Период защитного действия препарата, в зависимости от погодных условий, длится до 10-12 недель.

Рекомендации по применению

Наиболее эффективно применение в интервале температур: от +15°C до +20°C. Опрыскивание проводится в утренние или вечерние часы в безветренную погоду.

Препарата применяют до посева или после посева до появления сорняков. Наиболее эффективно будет применение до посева (даже за несколько недель) на подготовленную для посева почву.

Норма расхода препарата зависит от механического состава почвы и потенциальной засоренности. На легких почвах следует применять в минимальных нормах расхода, на тяжелых (высокогумусных) почвах - увеличивать норму расхода до максимальной. При достаточной увлажненности почвы, после внесения препарата можно не заделывать его в почву. В засушливых условиях нужно заделать в почву на 2-3 см, что обеспечит более надежный

контроль сорняков и дополнительные преимущества: не теряются запасы накопленной влаги в почве, не разрушается структура поверхностного слоя почвы. На почвах со слабой поглотительной способностью (песчаные, супесчаные) или очень низким содержанием гумуса использовать препарат не рекомендуется. В зависимости от культуры, содержания гумуса в почве, подготовки почвы, погодных условий норма расхода гербицида колеблется от 1,3 л/га до 2,0 л/га.

Факторы, влияющие на эффективность

Не следует проводить междуурядные культивации после применения препарата, так как механическая обработка почвы (междуурядий) во время вегетации снижает концентрацию препарата в почве, нарушает целостность «защитного экрана» и, как следствие, уменьшает гербицидное действие.

Рекомендации по применению в неблагоприятных условиях

Применять препарат нужно при скорости ветра не более 5 м/с. Во время внесения необходимо следить, чтобы не было сноса препарата на соседние чувствительные культуры.

Рекомендуемые баковые смеси

Эффективно подавляет сорняки при самостоятельном применении, поэтому не рекомендуется к одновременному использованию с другими гербицидами. В некоторых случаях для расширения спектра действия возможно совместное применение с препаратами на основе прометрина.

Возможность возникновения резистентности

Резистентность к препаратору не выявлена. Для предупреждения возникновения устойчивых видов следует чередовать применение с препаратами, имеющими другие механизмы действия.

Ограничения по севообороту

В связи с быстрым периодом распада действующего вещества в почве (30 дней), препарат не обладает последействием и может использоваться во всех типах севооборотов без ограничений.

Фитотоксичность

При использовании гербицида в соответствии с регламентом применения, не создается риска возникновения фитотоксичности на применяемых культурах. Но при высокой влажности почвы может проявиться фитотоксичность на применяемых культурах за счет промывания препарата в почву к корням культурных растений.

Совместимость

Препарат не используется в баковых смесях, так как сроки применения других пестицидов обычно не совпадают с обработкой данным гербицидом.

Условия хранения

При хранении избегать попадания прямых солнечных лучей и соблюдать рекомендуемые температурные интервалы. По истечении гарантийного срока хранения, препарат должен быть проверен на соответствие требованиям технических условий. При установлении соответствия, может быть использован по прямому назначению.

Регламенты применения				
Культура	Вредный объект	Норма расхода, л/га	Норма расхода рабочей жидкости, л/га	Способ, время обработки
Подсолнечник	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	1,3-1,6	200-400	Опрыскивание почвы до посева или до всходов культуры. В засушливых условиях рекомендуется мелкая заделка препарата (на глубину не более 5 см).
Свекла сахарная				
Рапс яровой				
Соя				



◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Системный гербицид сплошного действия для борьбы с сорной растительностью в сельском, лесном и коммунальном хозяйствах

Действующее вещество:
глифосата кислота (в виде изопропиламинной соли)

Химический класс:
фосфоновые кислоты

Концентрация:

360 г/л (по кислоте)

Препартивная форма:
водный раствор, ВР

Упаковка: канистра, 10 л

Гарантийный срок хранения:
5 лет

Температура хранения:
от -20°C до +30°C

Класс опасности для человека:

3 (умеренно опасное вещество)
для пчел:

3 (малоопасное вещество)

РАП:

гербицид сплошного действия, **НЕЗАМЕНИМ**
при возделывании культур
ПО МИНИМАЛЬНЫМ И НУЛЕВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

РАП

Преимущества:

- Быстро проникает в сосудистую систему сорняков и движется по ксилеме и флюэму, уничтожая как надземные органы, так и корневую систему.
- Эффективен для предуборочной десикации зерновых культур, льна-долгунца и подсолнечника.
- Безопасен для последующих культур севооборота, может применяться в нулевых и минимальных технологиях в качестве довсходового гербицида, так как не обладает почвенной активностью и не оказывает влияния на прорастающие семена.

Механизм действия

Препарат проникает в сорные растения через листья и другие зеленые части и переносится по всем органам сорняков, достигая их корневой системы. Ингибитирует 5-энолпирувилкинмат-3-fosфат-синтазу, которая участвует в синтезе многих ароматических аминокислот - триптофана, тирозина и фенилаланина и др.

Данные аминокислоты выполняют важную роль в клеточном метаболизме. Они входят в состав белков и служат исходным соединением для образования пигментов и полимера клеточных стенок лигнина. Нарушение их синтеза приводит к разрушению хлоропластов, пожелтению или обесцвечиванию листьев (хлороз), их деформации и отмиранию. Угнетаются дыхание растений и фотосинтез, замедляется рост, что ведет к полному отмиранию надземных и подземных органов.

Симптомы воздействия

Визуальные симптомы поражения однолетних сорняков проявляются через 5-7 дней, многолетних - через 7-10 дней, древесно-кустарниковой растительности - через 20-30 дней. Они выражаются: в виде появления антоциановой окраски, обесцвечивания и пожелтения, затем усыхания листьев и побурения растений.

Скорость воздействия

РАП проникает в листья и побеги, не покрытые одревесневшей корой, через устьица и поры в кутикуле. Скорость поглощения зависит от количества устьиц, а также от плотности воскового слоя, толщины кутикулы и степени опущенности листа. Полная гибель сорняков наступает примерно - через 3..4 недели после обработки, а древесно-кустарниковой растительности - через 1..2 месяца.

Спектр действия

Не обладает избирательностью, поэтому эффективен против всех видов сорняков, а так же древесно-кустарниковой растительности.

Период защитного действия

Препарат действует только на сорняки, которые взошли на момент внесения. Защитное действие длится 6-8 недель, в зависимости от типа засоренности, погодных условий и агротехники, принятой в хозяйстве. Многолетние сорняки подавляются в течение всего вегетационного периода, однолетние в течение 20-60 дней и более (до момента повторного появления из семян).

Рекомендации по применению

В момент обработки сорные растения должны активно вегетировать (теплая погода, достаточное содержание влаги в почве), так как РАП попадает в них через листья и другие фотосинтезирующие органы.

Оптимальная температура воздуха для применения РАПа составляет: от +15°C до +25°C, но допускается также температура +10°C. При этом первые признаки гербицидного воздействия проявляются позже. РАП можно применять за 1..2 недели до наступления первых заморозков. После заморозков гербицидное действие продолжается медленно. Если к моменту опрыскивания побурение вегетативной массы сорняков, вследствие холода, составляет не более 25 % эффективность действия гербицида не снижается.

Факторы, влияющие на эффективность

Проводить обработку посевов следует при благоприятных погодных условиях: в ясную, теплую, безветренную погоду, при достаточной увлажненности почвы.

Не рекомендуется проводить механическую обработку почвы на протяже-

нии 2-х недель после применения препарата, поскольку это может нарушить проводящую систему сорняков, что снижает эффективность их уничтожения.

Экстремальные условия (засуха, холодная и дождливая погода), следующие за обработкой, могут замедлить действие препарата.

Рекомендации по применению в неблагоприятных условиях

Не рекомендуется применять препарат при скорости ветра более 5 м/с. Во время обработки необходимо следить, чтобы не было сноса препарата на соседние чувствительные культуры.

Нежелательно проводить обработку в дни, когда прогнозируются ночные заморозки, и после них, из-за возможного снижения эффективности препарата.

Препарат поглощается листовым аппаратом сорняков в течение 6 часов, поэтому осадки выпавшие в течение 4-6 часов после обработки, могут существенно снизить эффективность действия препарата.

Рекомендуемые баковые смеси

Для снижения нормы расхода препарата, без риска снижения общей биологической эффективности (при отсутствии засорения многолетними злаковыми сорняками), можно рекомендовать следующие баковые смеси: РАП (2,5-4,0 л/га) + ЭЛАНТ (0,3-0,5 л/га) или РАП (2,0-4,0 л/га) + МЕТУРОН (10 г/га); при использовании последнего следует помнить о возможном последействии на чувствительные культуры севооборота.

Возможность возникновения резистентности

Резистентность к препаратуре не выявлена. Для пред-

упреждения возникновения устойчивых видов следует чередовать применение с препаратами, имеющими другие механизмы действия.

Ограничения по севообороту

Не обладает почвенным действием, поэтому не оказывает влияния на последующие культуры севооборота. После внесения РАП, практически сразу можно высевать любые сельскохозяйственные культуры. Возможно применение препарата до появления всходов культуры.

Фитотоксичность

Не обладает избирательностью, так как является препаратом сплошного действия.

Совместимость

Для расширения спектра действия, снижения нормы расхода и увеличения биологической эффективности, может применяться в баковых смесях с препаратами на основе эфиров 2,4-Д и дикамбы (ЭЛАНТ, ЭЛАНТ ПРЕМИУМ), сульфонилмочевин и клопирадида.

Перед применением рекомендуется проверить компоненты баковой смеси на совместимость.

Условия хранения

При хранении избегать попадания прямых солнечных лучей и соблюдать рекомендуемые температурные интервалы. По истечении гарантийного срока хранения, препарат должен быть проверен на соответствие требованиям технических условий. При установлении соответствия, может быть использован по прямому назначению.

Регламенты применения

Культура	Вредный объект	Норма расхода, л/га	Норма расхода рабочей жидкости, л/га	Способ, время обработки
Зерновые		3,0	100-200	Опрыскивание посевов за 2 недели до уборки (при влажности зерна не более 30%) для подсушки зерна и частичного подавления сорняков
Лен-долгунец				Опрыскивание сорняков за 28 дней до уборки для подсушки зерна и частичного подавления сорняков
Лён-долгунец (товарные посевы)	Десикация	2,0-3,0	300	Опрыскивание через 10 дней после конца цветения при засорённости однолетними сорняками
Подсолнечник		2,0-3,0	100-200	Опрыскивание посевов за 10 дней до уборки (при влажности зерна не более 30%) для подсушки зерна и частичного подавления сорняков
Пары	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	2,0-4,0	100-200	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста
	Горчак розовый	6,0		
Яблоня, виноградники	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	2,0-4,0		
Яблони	Многолетние злаковые и двудольные сорняки	4,0-8,0	100-200	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры)
Виноградники		4,0-6,0		
Поля предназначенные под посев различных культур (гречиха)		2,0-4,0		
Поля предназначенные под посев различных культур (пшеница яровая)	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	3,0	100-200	Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеворотный период



Системный гербицид сплошного спектра действия с увеличенной концентрацией действующего вещества для борьбы с сорной расти- тельностью

Действующее вещество:

глифосата кислота
(в виде калийной соли)

Химический класс:
фосфоновые кислоты

Концентрация:
600 г/л (по кислоте)

Препартивная форма:
водный раствор, ВР

Упаковка: канистра 10 л

Гарантийный срок хранения:
5 лет

Температура хранения:
от -20°C до +30°C

**Класс опасности
для человека:**
3 (умеренно опасное вещество)

для пчел:
3 (малоопасное вещество)

**РАП 600:
МАКСИМАЛЬНАЯ
КОНЦЕНТРАЦИЯ
ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ВЕЩЕСТВА** для данной
препартивной формы,
**ОБЛАДАЕТ
ПОВЫШЕННОЙ
ГЕРБИЦИДНОЙ
АКТИВНОСТЬЮ**

РАП 600

Преимущества:

- Увеличенная концентрация действующего вещества позволяет применять препарат в более низких нормах расхода.
- Калийная соль обладает большей биологической эффективностью, в сравнении с изопропиламинной. Она мягче воздействует на проводящую систему сорных растений, что обеспечивает более полное поглощение и распределение действующего вещества, и более глубокое его проникновение в корневую систему.
- Прогрессивная препартивная форма, содержащая повышенное количество поверхностно-активных веществ, обеспечивает максимальную биологическую эффективность в борьбе со злостными многолетними сорняками (осотом, пыреем, выонком и др.).
- Безопасен для последующих культур севооборота, может применяться в нулевых и минимальных технологиях в качестве до-всходового гербицида, так как не обладает почвенной активностью и не оказывает влияния на прорастающие семена.

Механизм действия

Препарат проникает в сорные растения через листья и другие зеленые части и переносится по всем органам сорняков, достигая корневой системы. Ингибитирует 5-энолпирвилшикимат-3-фосфат-синтазу, которая участвует в синтезе многих ароматических аминокислот - триптофана, тирозина и фенилаланина и др.

Данные аминокислоты выполняют важную роль в клеточном метаболизме. Они входят в состав белков и служат исходными соединениями для образования пигментов и полимера клеточных стенок лигнина. Нарушение их синтеза приводит к разрушению хлоропластов, пожелтению или обесцвечиванию листьев (хлороз), их деформации и отмиранию. Угнетаются дыхание растений и фотосинтез, замедляется рост, что ведет к полному отмиранию надземных и подземных органов.

Симптомы воздействия

Визуальные симптомы поражения однолетних сорняков проявляются через 5-7 дней, многолетних - через 7-10 дней, древесно-кустарниковой растительности - через 20-30 дней. Они выражаются в виде появления антоциановой окраски, обесцвечивания и пожелтения, усыхания листьев и побурения растений.

Скорость воздействия

РАП 600 проникает в листья и побеги, не покрытые одревесневшей корой, через устьица и поры в кутикуле. Скорость поглощения зависит от количества устьиц, а также от плотности воскового слоя, толщины кутикулы и степени опущенности листа.

Полная гибель сорняков наступает примерно через 3-4 недели после обработки, а древесно-кустарниковой растительности - через 1-2 месяца.

Спектр действия

Не обладает избирательностью, поэтому эффективен против всех видов сорняков, а так же древесно-кустарниковой растительности.

Период защитного действия

Препарат действует только на сорняки, которые взошли на момент внесения. Защитное действие длится 6-8 недель, в зависимости от типа засоренности, погодных условий и агротехники, принятой в хозяйстве. При соблюдении рекомендаций, одной обработки достаточно для эффективного подавления сорняков до конца вегетации, при отсутствии второй «волны».

Рекомендации по применению

Оптимальная температура воздуха для применения РАПа 600 составляет: от +15°C до +25°C, но применение возможно и при температуре +10°C. При этом первые признаки гербицидного воздействия проявляются позже.

Сорные растения должны активно вегетировать, так как глифосат попадает в растения только через листья и другие зеленые органы. Не поглощается корнями и частями растений, не содержащими хлорофилла. Для

устойчивого гербицидного эффекта, пырей в момент обработки должен иметь 3-5 активно ассимилирующих листа (10-20 см), осоты розетку диаметром 5-10 см. Оптимальные нормы расхода (при использовании в чистом виде) против пырея ползучего 2,2-3,5 л/га, видов полыни - 3,0 и осотов 2,2...3,5 л/га.

Хороший результат достигается на фоне быстрого подъема температуры почвы и воздуха весной, при применении в норме 0,8-1,2 л/га.

Факторы, влияющие на эффективность

Проводить обработку посевов следует при благоприятных погодных условиях: в ясную, теплую, безветренную погоду, при достаточной увлажненности почвы.

Не рекомендуется проводить механическую обработку почвы на протяжении 2-х недель после применения препарата, поскольку это может нарушить проводящую систему сорняков, что соответственно, снизит эффективность их уничтожения.

РАП 600 достаточно медленно передвигается по корневой системе сорняков, поэтому полная гибель (хлоротизация, засыхание) происходит в течение 14-21 дней. В связи с этим, обработка почвы после опрыскивания возможна в теплую влажную погоду через 7-8 дней, но лучше через 15-21 день (при обычной погоде), после полного отмирания сорняков.

Рекомендации по применению в неблагоприятных условиях

Не рекомендуется применять препарат при скорости ветра более 5 м/с. Во время обработки необходимо следить, чтобы не было сноса препарата на соседние чувствительные культуры.

При неблагоприятных погодных условиях (холод, засуха, осадки) действие препарата может быть замедленным.

Рекомендуемые баковые смеси

Для уничтожения многолетних двудольных сорняков норму расхода РАП 600 можно снизить до 1,2-1,8 л/га, при использовании его в баковой смеси с 0,3-0,5 л/га ЭЛАНТ, КЭ, сульфонилмочевинами (МЕТУРОН - 8-10 г/га) или ЭЛАНТ ПРЕМИУМ 0,3-0,5 л/га

Такие смеси позволяют достичь высокой эффективности против всего комплекса двудольных сорняков с меньшими затратами, так как для аналогичного эффекта потребовалось бы порядка 3,5 л/га РАП 600 (для выонка

полевого) при самостоятельном его применении.

Не следует добавлять в баковые смеси с РАП 600 большое количество 2,4-Д (ЭЛАНТ), дикамбы (ДИКАМБЕР*) и других (ЭЛАНТ-ПРЕМИУМ) в связи с тем, что данные препараты обладают разными механизмами и скоростью действия. ЭЛАНТ начинает действовать уже через несколько часов после применения, уничтожая проводящую систему сорняков. Для полноценного всасывания и проведения по проводящей системе глифосата требуется больше времени.

Оптимальная норма ЭЛАНТА (ЭЛАНТ-ПРЕМИУМа) для смесей с РАП 600 - 0,3-0,5 л/га. Положительный эффект достигается за счет того, что эфиры 2,4-Д кислоты и дикамбы помогают глифосату проникать через восковой налет, образующийся на листьях сорных растений в жаркую погоду.

Также хороший результат достигается при добавлении в баковую смесь МЕТУРОНа (метсульфурон-метил, 600 г/кг) в норме 8-10 г/га, особенно при большой засоренности гречишными и малолетними двудольными сорняками. Кроме того, в данном варианте наблюдается более высокий процент подавления просовидных сорняков. За счет экранирующего эффекта метсульфурон-метила, подавляется вторая «волна» однолетних двудольных сорняков, появляющихся, как правило, после выпадения осадков. При всех своих достоинствах, данная смесь абсолютно неэффективна против молочая лозного, для борьбы с которым нужно применять эфиры 2,4-Д кислоты.

При использовании в некоторых баковых смесях МЕТУРОНа, нужно помнить о последействии метсульфурон-метила на чувствительные широколистные культуры (подсолнечник, гречиху, бобовые, свеклу). На следующий год необходимо высевать только зерновые культуры.

При наличии многолетних злаковых сорняков, норма расхода глифосата для их подавления должна быть не менее 2,2-2,4 л/га.

Ограничения по севообороту

Не обладает почвенным действием, поэтому не оказывает влияния на последующие культуры севооборота. После внесения РАП 600, практически сразу можно высевать любые сельскохозяйственные культуры. Возможно и до-всходовое применение препарата непосредственно после посева культур.

Регламенты применения

Культура	Вредный объект	Норма расхода рабочей жидкости, л/га	Способ, время обработки
Поля, предназначенные под посев (посадку) различных культур (яровые, зерновые, овощные, картофель, бобовые, технические (в том числе лен), масличные, бахчевые, цветочные, декоративные и газонные)	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	1,25-2,5	100-200
Поля, предназначенные под посев яровых культур по минимальным и нулевым технологиям			Обработка вегетирующих сорняков до посева или до всходов культуры.
Пары	Горчак розовый	3,5	Опрыскивание сорняков в период их активного роста.



◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Системный послевсходовый гербицид избирательного действия против однолетних и некоторых многолетних двудольных и однолетних злаковых сорняков в посевах кукурузы и посадках картофеля

Действующее вещество:

римсульфурон

Химический класс:

сульфонилмочевины

Концентрация: 250 г/кг

Препартивная форма:

водно-диспергируемые гранулы, ВДГ

Упаковка: флакон 0,5 кг

Гарантийный срок хранения:

3 года

Температура хранения:

от -30°C до +30°C

Класс опасности для человека:

3 (умеренно опасное вещество для пчел:

3 (малоопасное вещество)

РОМУЛ:
эффективен против
ШИРОКОГО СПЕКТРА
ЗЛАКОВЫХ И
ДВУДОЛЬНЫХ
сорняков в посевах
кукурузы и посадках
картофеля

РОМУЛ

Преимущества:

- Эффективен против широкого спектра основных двудольных и злаковых сорняков в посевах кукурузы и посадках картофеля.
- Благодаря выраженным системным свойствам, поражает корневую систему многолетних сорняков и устраняет возможность их вторичного отрастания.
- Внесение препарата полностью заменяет довсходовую и предпосевную обработку гербицидами.
- Быстро разлагается в почве и не имеет ограничений для последующих культур севооборота.

Механизм действия

Римсульфурон проникает в растение через листья и частично через корневую систему, блокирует в нем синтез фермента ацетолактатсинтазы, участвующей в синтезе незаменимых аминокислот валина, лейцина и изолейцина. Подавление данного фермента блокирует деление клеток, приводит к быстрой остановке роста сорняков, пожелтению, а затем к их гибели.

Симптомы воздействия

Появление симптомов зависит от вида сорняков, стадии роста и погодных условий. Первые видимые симптомы воздействия гербицида (хлорозы, некрозы, изменения окраски) проявляются спустя 3-7 дней после опрыскивания.

Скорость воздействия

Рост сорных растений прекращается через несколько часов после обработки, снижается потребление ими питательных веществ и воды. Полная гибель сорных растений происходит через 2-4 недели после опрыскивания.

Менее чувствительные (вьюнок полевой) или находящиеся в более поздней фазе развития сорняки могут сохраняться в посевах, но их рост приостанавливается, и они не могут конкурировать с культурой в потреблении питательных веществ и воды. В теплую и влажную погоду действие гербицида ускоряется, а в прохладную и сухую замедляется.

Спектр действия

Чувствительные сорняки: бодяк полевой, вика сорнополевая, галинсога (виды), гибискус тройчатый, горчица полевая, гречишко татарская, гумай, двурядка (виды), дрема, дурнишник обыкновенный, звездчатка средняя, костер ржаной, кострец безостый, крестовник обыкновенный, лебеда раскидистая, лопушник (виды), мак-самосейка, мятылк-однолетний, овсянник обыкновенный, осот полевой, пастушья сумка, плевел (виды), подмаренник цепкий, подсолнечник сорный, просо куриное, пырей ползучий, редька дикая, росичка (виды), чистец (виды), щетинник сизый, щирица запрокинутая, ярутка полевая, яснотка (виды).

Среднечувствительные: амброзия полыннолистная, бородавник обыкновенный, вьюнок полевой, гумай, лютик полевой, манжетка полевая, марь белая, марь многосемянная, марь фиголистная, мать-и-мачеха, молокан татарский, молочай лозный, мятта полевая, ромашка непахучая.

Полный список чувствительных сорняков представлен в «Таблице эффективности...».

Период защитного действия

Не обладает почвенным действием, воздействует только на сорняки, которые присутствовали на момент обработки. При соблюдении рекомендаций достаточно одной обработки для эффективного подавления двудольных сорняков до конца вегетации, при условии оптимального развития культуры.

Рекомендации по применению

Наиболее высокая биологическая эффективность РОМУла достигается при применении его в благоприятных погодных условиях - оптимальной влажности воздуха и температуре: от +15°C до +25°C.

Препарат следует вносить в фазе 2...6 листьев кукурузы, в норме 50 г/га

в смеси с 200 мл/га ПАВ (НЕОН 99) против однолетних и многолетних злаковых сорняков. При этом однолетние злаковые сорняки должны находиться в стадии 1-4 листьев, многолетние должны иметь высоту от 15 см, однолетние двудольные от 2 до 4-х листьев, а многолетние в фазе розетки.

При отсутствии переросших однолетних и многолетних сорняков, РОМУЛ можно использовать в норме расхода: 40 г/га в смеси с ПАВ (НЕОН 99) 0,2 л/га. На посадках картофеля опрыскивание против многолетних и однолетних злаковых, и некоторых двудольных сорняков проводят после окучивания, в ранние фазы развития (однолетние - 1-4 листа, многолетние – при высоте 10-15 см). Норма расхода препарата при этом должна составлять 50 г/га в смеси с 0,2 л/га ПАВ (НЕОН 99).

Дробное внесение препарата предполагает две обработки. Первое опрыскивание проводится по первой волне сорняков в норме: 30 г/га в смеси с 0,2 л/га ПАВ (НЕОН 99), а повторная обработка – при необходимости, с нормой 20 г/га в смеси с 0,2 л/га (НЕОН 99).

Факторы, влияющие на эффективность

Проводить обработку посевов следует при благоприятных погодных условиях: в ясную, теплую погоду, при достаточной увлажненности почвы. Низкие температуры, засуха замедляют действие препарата и проявление визуальных признаков гербицидного действия. Осадки, выпавшие в течение 3 часов после внесения препарата, могут существенно снизить эффективность его действия против сорняков.

Рекомендации по применению в неблагоприятных условиях

Не рекомендуется применять препарат при скорости ветра более 5 м/с. Во время обработки необходимо следить, чтобы не было сноса препарата на соседние чувствительные культуры.

Не следует проводить обработку при обильной росе, или если в ближайшие часы после применения ожидается выпадение осадков.

Рекомендуемые баковые смеси

Для расширения спектра действия на многолетние двудольные сорняки (вьюнок полевой), при обработке кукурузы препарат можно применять совместно с 2,4-Д

Регламенты применения

Культура	Вредный объект	Норма расхода, г/га	Норма расхода рабочей жидкости, л/га	Способ, время обработки
Кукуруза	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	40	200-300	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков, в смеси с ПАВ «НЕОН 99»
	Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки	50		Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры, при высоте злаковых сорняков 10-15 см и в фазе розетки осотов, в смеси с ПАВ «НЕОН 99»
Картофель	Многолетние (пырей), однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	50		Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры, Двухкратное дробное опрыскивание по первой и второй волне сорняков (интервал 10-20 дней), в смеси с ПАВ «НЕОН 99»
		30+20		Опрыскивание посадок после окучивания, в ранние фазы развития (1-4 листа) однолетних сорняков и при высоте пырея 10-15 см, в смеси с ПАВ «НЕОН 99»
				Опрыскивание посадок после окучивания, по первой волне, и повторно по второй волне сорняков и при высоте пырея 10-15 см, в смеси с ПАВ «НЕОН 99»

содержащими препаратами, например РОМУЛ (40...50 г/га) + ЭЛАНТ (0,5...0,07 л/га), РОМУЛ (40...50 г/га) + ЭЛАНТ ПРЕМИУМ (0,5...0,6 л/га). Добавление ПАВ в этом случае не нужно. Также допускается смешивание с препаратами на основе дикамбы, инсектицидами, стимуляторами роста, применяемыми в эти же сроки на соответствующих культурах.

Возможность возникновения резистентности

Резистентность к препарату не выявлена. Для предупреждения возникновения устойчивых видов следует чередовать применение с препаратами, имеющими другие механизмы действия.

Ограничения по севообороту

Полностью разлагается в почве за вегетационный период (в полевых условиях период распада длится до 40 дней), поэтому не создает угрозы для последующих культур севооборота. В случае гибели обработанных посевов, их следует пересевать только зерновыми культурами.

Фитотоксичность

При соблюдении рекомендаций по срокам и нормам внесения препарата случаев проявления фитотоксичности по отношению к обрабатываемым культурам не выявлено.

РОМУЛ высокоизбирателен ко всем сортам картофеля. В некоторых случаях может отмечаться временное пожелтение или мраморность молодых листьев. Эти симптомы исчезают через некоторое время и не влияют на состояние культуры, урожай и его качество.

Совместимость

Препарат можно использовать в баковых смесях с большинством гербицидов, инсектицидов и фунгицидов, применяемых в те же сроки.

Перед применением рекомендуется проверить компоненты баковой смеси на совместимость.

Условия хранения

При хранении избегать попадания прямых солнечных лучей и соблюдать рекомендуемые температурные интервалы. По истечении гарантийного срока хранения, препарат должен быть проверен на соответствие требованиям технических условий. При установлении соответствия, может быть использован по прямому назначению.



Системный послевсходовый гербицид избирательного действия против однолетних и некоторых многолетних двудольных сорняков в посевах зерновых культур

Действующее вещество:

трибенурон-метил

Химический класс:

сульфонилмочевины

Концентрация:

750 г/кг

Препартивная форма:

водно-диспергируемые

гранулы, ВДГ

Упаковка: флакон 0,5 кг

Гарантийный срок хранения:

3 года

Температура хранения:

от -30°C до +30°C

Класс опасности

для человека:

3 (умеренно опасное вещество)

для пчел:

3 (малоопасное вещество)

СТАЛКЕР:
эффективно
УНИЧТОЖАЕТ
ГРЕЧИШКУ
ТАТАРСКУЮ И ВИДЫ
ОСОТОВ

СТАЛКЕР*

Преимущества:

- Имеет широкий интервал сроков применения, эффективен уже при температуре воздуха +5°C
- Высокоэффективен против широкого спектра однолетних и некоторых многолетних двудольных сорняков, в том числе устойчивых к 2,4-Д и 2М-4Х.
- Быстро разлагается в почве, поэтому не обладает последействием в отношении последующих культур.

Механизм действия

Трибенурон-метил проникает через листья и частично через корневую систему в растение, блокирует в нем синтез фермента ацетолактатсина, участвующий в синтезе незаменимых аминокислот валина, лейцина и изолейцина. Подавление данного фермента блокирует деление клеток, приводит к быстрой остановке роста сорняков, пожелтению, а затем к их гибели.

Симптомы воздействия

Появление симптомов зависит от вида сорняков, стадии роста и погодных условий. Первые видимые симптомы воздействия гербицида (хлороозы, некрозы, изменения окраски) проявляются спустя 3-7 дней после опрыскивания.

Скорость воздействия

Рост сорных растений прекращается через несколько часов после обработки, снижается потребление ими питательных веществ и воды. Полная гибель сорных растений происходит через 2-4 недели после опрыскивания.

Менее чувствительные (выонок полевой) или находящиеся в более поздней фазе развития сорняки могут сохраняться в посевах, но их рост приостанавливается, и они не могут конкурировать с культурой в потреблении питательных веществ и воды. В теплую и влажную погоду действие гербицида ускоряется, а в прохладную и сухую замедляется.

Спектр действия и эффективность препарата

Чувствительные сорняки: аистник цикутный, бифора л�истая, бодяк полевой, болиголов крапчатый, воробейник полевой, воронья лака, герань нежная, герань рассеченная, гибискус тройчатый, горец выонковый, горец почечуйный, горох посевной, горошек мышиный, горчица полевая, гречишница татарская, гулявник высокий, двурядка (виды), донник лекарственный, дурнишник обыкновенный, желтушник левкойный, звездчатка средняя, клевер (виды), крестовник обыкновенный, куколь обыкновенный, льнянка обыкновенная, лютик полевой, люцерна (виды), мак-самосейка, марь белая, марь многосемянная, очный цвет полевой, пастушья сумка, пикульник (виды), подмаренник цепкий, подсолнечник сорный, пупавка (виды), рапс, редька дикая, ромашка непахучая, сурепка обыкновенная, фиалка полевая, щирица запрокинутая, ярутка полевая, ясколка полевая, яснотка (виды).

Среднечувствительные: амброзия полыннолистная, василек синий, вика сорнополевая, дурман обыкновенный, дымянка аптечная, клоповник мусорный, кудрявый, лебеда раскидистая, липучка (виды), марь фиголистная, мать-и-мачеха обыкновенная, мелколепестник канадский, молокан татарский, молочай лозный, одуванчик лекарственный, осот полевой, смолевка белая, чина (виды).

Полный список чувствительных сорняков представлен в «Таблице эффективности...».

Период защитного действия

Не обладает почвенным действием, воздействует только на сорняки, которые присутствовали на момент обработки. При соблюдении рекомендаций достаточно одной обработки для эффективного подавления двудольных сорняков до конца вегетации, при условии оптимального развития культуры.

Рекомендации по применению

Наиболее эффективно применение по активно вегетирующим сорнякам в интервале температур: от +10°C до +25°C. Обладает исключительной избирательностью действия в отношении зерновых культур, оказывая наиболее сильное действие в период активного роста молодых сорных растений.

Однолетние сорняки эффективно подавляются при обработке их в фазе 2-4 листьев, многолетние - в фазе розетки. Следовательно, при выборе срока внесения препарата, предпочтительнее ориентироваться на развитие сорных растений, а не культуры. Для борьбы с поздно взошедшими сорняками СТАЛКЕР может применяться в фазе выхода культуры в трубку.

При использовании препарата в малых нормах (до 15 г/га), СТАЛКЕР, для повышения эффективности, необходимо применять совместно с ПАВ (поверхностно-активное вещество), например, с НЕОН 99.

Также рекомендуется использовать ПАВ и при внесении гербицида в неблагоприятных погодных условиях (низкие температуры, засуха) и в борьбе со среднечувствительными сорняками.

Факторы, влияющие на эффективность

Проводить обработку посевов следует при благоприятных погодных условиях: в ясную, теплую, безветренную погоду, при достаточной увлажненности почвы.

Низкие температуры, засуха замедляют действие препарата. Осадки, выпавшие в течение 3-4 часов после внесения препарата могут существенно снизить эффективность его действия против сорняков.

Рекомендации по применению в неблагоприятных условиях

Не рекомендуется применять препарат при скорости ветра более 5 м/с. Во время обработки необходимо следить, чтобы не было сноса препарата на соседние чувствительные культуры.

Не следует проводить обработку при обильной росе, или если в ближайшие часы после применения ожидаются осадки.

Рекомендуемые баковые смеси

Для расширения спектра действия, повышения эффективности...

тивности подавления таких злостных сорняков, как выонок полевой и подмаренник цепкий, а также снижения риска возникновения резистентности. СТАЛКЕР может применяться в баковых смесях с препаратами, содержащими 2,4-Д, например ЭЛАНТ (0,45 л/га) + СТАЛКЕР (12 г/га).

При отсутствии выонка полевого, возможно применение смеси ЭЛАНТ (0,3 л/га) + СТАЛКЕР (10...15 г/га). При этом необходимо учитывать сроки применения гербицидов на основе 2,4-Д и применять данные смеси не позже конца кущения культуры.

Возможность возникновения резистентности

Резистентность к препарату не выявлена. Для предупреждения возникновения устойчивых видов следует чередовать применение с препаратами, имеющими другие механизмы действия.

Ограничения по севообороту

Полностью разлагается в почве за вегетационный период (в полевых условиях период полураспада длится до 6 дней), поэтому не создает угрозы для последующих культур севооборота. В случае гибели обработанных посевов, следует пересевать только зерновыми культурами.

Фитотоксичность

При соблюдении рекомендаций по срокам и нормам внесения препарата, случаев проявления фитотоксичности по отношению к обрабатываемым культурам не выявлено.

СТАЛКЕР можно без опасений вносить холодной весной, поскольку, в отличие от гормональных гербицидов, он не вызывает фитотоксичности даже в таких погодных условиях.

Совместимость

Препарат можно использовать в баковых смесях с большинством гербицидов, инсектицидов и фунгицидов, применяемых в те же сроки. Не рекомендуется применять в смеси с фосфорорганическими инсектицидами.

Перед применением рекомендуется проверить компоненты баковой смеси на совместимость.

Условия хранения

При хранении избегать попадания прямых солнечных лучей и соблюдать рекомендуемые температурные интервалы. По истечении гарантийного срока хранения, препарат должен быть проверен на соответствие требованиям технических условий. При установлении соответствия, может быть использован по прямому назначению.

Регламенты применения

Культура	Вредный объект	Норма расхода, г/га	Норма расхода рабочей жидкости, л/га	Способ, время обработки
Пшеница и ячмень* яровые, овес*	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х	15-20	200-300	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков.

*препарат находится на стадии государственной регистрации или ее расширения



**Системный послевсходовый
гравиницид избирательного
действия против однолетних
злаковых сорняков в посевах
пшеницы**

Действующие вещества:

феноксапроп-П-этил +
клодинафоп-пропаргил +
мефенпир-диэтил (антиот)

Химический класс:
арилоксиfenоксипропионовые
кислоты + арилоксиfenоксипро-
пионовые кислоты + антиот

Концентрация:

90 г/л + 90 г/л + 40 г/л

Препартивная форма:
концентрат эмульсии, КЭ

Упаковка: канистра 5 л

Гарантийный срок хранения:

3 года

Температура хранения:
от -15°C до +30°C

Класс опасности

для человека:

3 (умеренно опасное вещество)

для пчел:

3 (малоопасное вещество)

Период защитного действия

ТАЙПАН оказывает гербицидное действие на чувствительные злаки имеющиеся в посевах на момент опрыскивания, и не действует на появившиеся позднее после обработки (вторая волна сорняков). Поэтому важно выбрать сроки применения препарата, когда появится основная масса однолетних злаковых сорняков. При соблюдении рекомендаций достаточно одной обработки для эффективного подавления сорняков до конца вегетации, при условии оптимального развития культуры.

Рекомендации по применению

Наиболее эффективно применение ТАЙПАН в интервале температур от +15°C до +25°C.

Обработки рекомендуется проводить в ранние фазы развития сорных

Преимущества:

- Обладает исключительной эффективностью против овсюка.
- Два действующих вещества обладают выраженным эффектом синергизма, уничтожая широкий спектр сорняков - овсюк, виды щетинника, просо куриное, просо сорно-полевое, метлица полевую.
- Прогрессивная препартивная форма обеспечивает быстрое и полное проникновение действующих веществ в сорное растение.
- Благодаря наличию в составе антиота мефенпир-диэтила обладает повышенной селективностью для обрабатываемых культур.
- Имеет широкий интервал сроков применения - независимо от фазы развития культуры (обработки рекомендуется проводить в восприимчивую фазу злаковых сорняков).

Механизм действия

Феноксапроп-П-этил и клодинафоп-пропаргил в растении гидролизуются до свободных кислот, которые подавляют синтез фермента, отвечающего за биосинтез липидов в меристематических тканях. В результате у злаковых сорняков в точках роста останавливается синтез клеточных мембран. Отмирание точек роста ведет к прекращению роста и гибели сорных растений.

Антиот мефенпир-диэтил способствует быстрому преобразованию действующих веществ в тканях культурных растений в нейтральные продукты распада, которые не оказывают негативного влияния на развитие культуры.

Симптомы воздействия

Симптомы гербицидного действия проявляются в виде хлороза молодых листьев, угнетения точек роста сорняков. У некоторых видов злаковых сорняков возможно появление антоциановой окраски.

Скорость воздействия

Проникает в листья сорных растений в течение 4-6 часов. Рост сорняков прекращается в первые сутки после обработки. Уже на следующий день в значительной степени устраняется конкуренция сорных растений для культуры. Видимые симптомы воздействия проявляются через 7-10 дней. Полная гибель сорных злаков происходит в течение 2-3 недель после опрыскивания, в зависимости от складывающихся погодных условий.

Спектр действия

Чувствительные сорняки: овсюк обыкновенный, плевел (виды), просо куриное, просо сорно-полевое, метлица обыкновенная, щетинник (виды).

Среднечувствительные: росичка (виды), гумай, мятылик однолетний, свинорой пальчатый.

Полный список чувствительных сорняков представлен в «Таблице эффективности...».

**ТАЙПАН:
ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ПОЛНУЮ ГИБЕЛЬ
ОВСЮГА
В ПОСЕВАХ
ПШЕНИЦЫ**

ТАЙПАН

растений (фаза 2-3 листьев – до конца кущения), так как они в это время наиболее восприимчивы к гербициду.

В минимальных нормах расхода (0,25-0,3 л/га) ТАЙПАН применяется в ранние фазы (2-3 листа) развития сорных растений, а также для борьбы с овсюком. Максимальные нормы расхода препарата (0,3-0,35 л/га) следует применять при обработке переросших сорняков (фаза кущения).

При обработке сорняков в фазе конца кущения - начала выхода в трубку эффективность значительно снижается.

Факторы, влияющие на эффективность

Проводить обработку посевов следует при благоприятных погодных условиях: в ясную теплую погоду, при достаточной увлажненности почвы.

После образования у сорняков первого междуузлия эффективность препарата резко снижается.

В условиях засухи процесс деления клеток у сорняков резко замедляется, поэтому эффективность препарата заметно снижается (действие направлено на активно делящиеся клетки меристем).

Не рекомендуется смешивать с препаратами, содержащими 2,4-Д аминную соль, в связи с уменьшением биологической эффективности против злаковых сорняков.

Рекомендации по применению в неблагоприятных условиях

Не рекомендуется применять препарат при скорости ветра более 5 м/с. Во время внесения необходимо следить, чтобы не было сноса препарата на соседние чувствительные культуры (овес, ячмень).

Выпадение осадков в течение 2-4 часов после обработки может снизить эффективность препарата. В период повышенной увлажненности необходимо применять максимальные нормы расхода препарата, так как интенсивное движение питательных веществ в сорном растении снижает возможность перемещения гербицида к клеткам меристем.

Рекомендуемые баковые смеси

Эффективен против злаковых сорняков при самостоятельном применении, поэтому не рекомендуется к применению совместно с другими гравиницидами.

Для расширения спектра действия против двудольных сорняков ТАЙПАН можно использовать в баковой

смеси с гербицидами на основе сульфонилмочевин, дикамбы, эфиров 2,4-Д, клопирапида, применяемыми в те же сроки. Например, с гербицидами ЭЛАНТ, ЭЛАНТ ПРЕМИУМ, ЭЛАНТ ЭКСТРА, ЭЛАМЕТ, БИАТЛОН, ТРИАТЛОН ПЛЮС, КЛОПЭФИР МИКС, МЕТУРОН и другими.

Баковые смеси ТАЙПАН с гербицидами против двудольных сорняков рекомендуется применять не позднее конца кущения культуры.

Возможность возникновения резистентности

Препарат содержит два действующих вещества, различающихся механизмами действия, поэтому возможность возникновения резистентности к препаратору у злаковых сорняков крайне маловероятна.

Ограничения по севообороту

Не обладает последействием на последующие культуры севооборота, так как быстро распадается в почве. В полевых условиях период полного распада составляет 1-3 дня.

Фитотоксичность

При использовании гравиницида в соответствии с регламентом применения не создается риска возникновения фитотоксичности для пшеницы. Благодаря антиоту препаратор обладает максимальной селективностью к культуре.

Не селективен для ячменя и овса. При обработке ячменя может вызвать частичную гибель посевов.

Совместимость

Препарат можно использовать в баковых смесях с большинством гербицидов, инсектицидов, фунгицидов, регуляторов роста и удобрений, применяемых в те же сроки. Перед применением рекомендуется проверить компоненты баковой смеси на совместимость. При подготовлении баковых смесей избегать прямого смешивания препаратов без предварительного разведения водой.

Условия транспортирования и хранения

При хранении избегать попадания прямых солнечных лучей. По истечении срока хранения препарат должен быть проверен на соответствие требованиям технических условий и, при установлении соответствия, препарат может быть использован по прямому назначению.

Регламенты применения

Культура	Вредный объект	Норма расхода, л/га	Норма расхода рабочей жидкости, л/га	Способ, время обработки
Пшеница яровая	Просо, виды щетинника	0,30		Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорняков независимо от фазы развития культуры.
	Однолетние злаковые (овсюк, виды щетинника, просо куриное, просо сорно-полевое, метлица полевая и др.) сорняки	0,3-0,35	200-300	Опрыскивание посевов по вегетирующему сорнякам, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры).



**Системный послевсходовый
гравиницид избирательного
действия против однолетних
злаковых сорняков в посевах
пшеницы и ячменя**

Действующее вещество:
феноксапроп-П-этил + клоквин-
тосет-мексил (антидот)
Химический класс:

арилоксифеноксипропионовые
кислоты

Концентрация:
69 г/л + 34,5 г/л

Препартивная форма:
эмulsionia масляно-водная, ЭМВ
Упаковка: канистра 10 л
Гарантийный срок хранения:
2 года

Температура хранения:
от -15°C до +30°C

**Класс опасности
для человека:**

3 (умеренно опасное вещество)

для пчел:

3 (малоопасное вещество)

ФАБРИС:
эффективен ПРОТИВ
ЗЛАКОВЫХ СОРНЯКОВ,
ОВСЮГА и проса
сорнopolевого **НА**
ПШЕНИЦЕ И ЯЧМЕНЕ

ФАБРИС

Преимущества:

- Эффективен против широкого спектра злаковых сорняков, включая овсянку и просо сорнopolевое.
- Имеет широкий интервал сроков применения независимо от фазы развития культуры (обработки рекомендуется проводить на ранних стадиях развития сорных растений, так как они в это время наиболее восприимчивы к гербицидам).
- Высокая селективность для обрабатываемых культур.

Механизм действия

Препарат поглощается наземными органами растения в течение 1...3 часов после применения и накапливается в точках роста. На биохимическом уровне ингибирует биосинтез жирных кислот в меристемных тканях злаковых сорняков, препятствуя образованию клеточных мембран в точках роста, что ведет к гибели сорных растений.

Антидот способствует преобразованию действующего вещества в тканях культурных растений в нейтральные продукты распада, которые не оказывают негативного влияния на развитие культуры.

Симптомы воздействия

Симптомы гербицидного действия проявляются в виде хлороза молодых листьев, угнетения точек роста сорняков. У некоторых видов злаковых сорняков возможно появление антоциановой окраски.

Скорость воздействия

После внесения, гербицид ФАБРИС проникает в листья в течение 2-4 часов, быстро устраняя конкуренцию сорных растений для культуры.

Полная гибель сорных злаков, в зависимости от складывающихся погодных условий, происходит в течение 1-3 недель после опрыскивания.

Спектр действия

Чувствительные сорняки: овсянка обыкновенная, плевел (виды), просо куриное, просо сорнopolевое, щетинник (виды).

Среднечувствительные сорняки: росичка (виды).

Полный список чувствительных сорняков представлен в «Таблице эффективности...».

Период защитного действия

Не обладает почвенным действием, действует только на сорняки, которые присутствовали на момент обработки. При соблюдении рекомендаций достаточно одной обработки для эффективного подавления сорняков до конца вегетации, при условии оптимального развития культуры.

Рекомендации по применению

Наиболее эффективно применение ФАБРИСа в интервале температур: от +15°C до +25°C.

Обработку рекомендуется проводить в ранние фазы развития сорных растений, так как они в это время наиболее восприимчивы к гербициду.

ФАБРИС оказывает гербицидное действие на чувствительные злаки, имеющиеся в посевах на момент опрыскивания, и не действует на вторую « волну» сорняков. Поэтому важно правильно выбрать сроки применения препарата, когда появится основная масса однолетних злаковых сорняков.

В минимальных нормах расхода ФАБРИС применяется на ранних фазах (2...3 листа) развития сорных растений. Максимальные нормы расхода препарата следует применять при обработке переросших сорняков (более 4-х листьев).

При обработке сорняков в фазе конца кущения - начала выхода в трубку эффективность препарата минимальная. Максимально быстрый гербицидный эффект достигается при обработке на ранних стадиях развития сорных злаков (в фазе 2-3 листьев) и при благоприятных условиях роста (оптимальной влажности и температуре).

В период повышенной увлажненности необходимо применять максимальные нормы расхода препарата, так как интенсивное движение питательных веществ в сорном растении снижает возможность перемещения гербицида в узел кущения.

Баковые смеси с противодувольными гербицидами рекомендуется применять не позднее конца кущения культуры.

Факторы, влияющие на эффективность

Проводить обработку посевов следует при благоприятных погодных условиях: в ясную, теплую, безветренную погоду, при достаточной увлажненности почвы.

После образования у сорняков первого междуузлия эффективность препарата резко снижается. Так как действие препарата направлено на активно делящиеся клетки меристем, а в условиях засухи процесс деления клеток резко замедляется, эффективность препарата снижается.

Не рекомендуется смешивать с препаратами, содержащими 2,4-Д аминную соль, в связи с уменьшением биологической эффективности против злаковых сорняков.

Применять препарат нужно при скорости ветра не более 5 м/с. Во время внесения необходимо следить, чтобы не было сноса препарата на соседние чувствительные культуры (овес).

Не следует проводить обработку при обильной росе или если в ближайшие часы ожидается выпадение осадков.

Рекомендации по применению в неблагоприятных условиях

Не рекомендуется применять препарат при скорости ветра более 5 м/с. Во время обработки необходимо следить, чтобы не было сноса препарата на соседние чувствительные культуры.

При высокой засоренности посевов и в случае наличия переросших сорняков, обработку следует проводить максимальной рекомендованной для культуры дозой препарата.

Рекомендуемые баковые смеси

Для расширения спектра действия против двудольных сорняков ФАБРИС можно использовать в баковой

смеси с гербицидами на основе сульфонилмочевин, дикамбы, эфиров 2,4-Д, клопирапида, применяемыми в те же сроки. Например, с гербицидами ЭЛАНТ, ЭЛАНТ ПРЕМИУМ, ЭЛАНТ ЭКСТРА, ЭЛАМЕТ, БИАТЛОН, ТРИАТЛОН ПЛЮС, МЕТУРОН, СТАЛКЕР, а также с инсектицидами и фунгицидами.

Баковые смеси ФАБРИСа с гербицидами против двудольных сорняков рекомендуется применять не позднее конца кущения культуры.

Возможность возникновения резистентности

Резистентность к препарату не выявлена. Для предупреждения возникновения устойчивых видов следует чередовать применение с препаратами, имеющими другие механизмы действия.

Ограничения по севообороту

В связи с быстрым периодом распада действующего вещества в почве (в течение 1-3 дней), препарат не обладает последействием и может использоваться во всех типах севооборотов без ограничений.

Фитотоксичность

При использовании гравиницида в соответствии с регламентом применения, не создается риска возникновения фитотоксичности для пшеницы и ячменя. В некоторых случаях возможно визуально фиксируемое проявление фитотоксичности у некоторых сортов ячменя (в виде слабого хлороза или обесцвечивания).

Препарат не предназначен для обработки посевов овса!

Совместимость

Препарат можно использовать в баковых смесях с большинством гербицидов, инсектицидов и фунгицидов, применяемых в те же сроки.

Перед применением рекомендуется проверить компоненты баковой смеси на совместимость. При приготовлении баковых смесей избегать прямого смешивания препаратов без предварительного разведения водой.

Условия хранения

При хранении избегать попадания прямых солнечных лучей и соблюдать рекомендуемые температурные интервалы. По истечении гарантийного срока хранения, препарат должен быть проверен на соответствие требованиям технических условий. При установлении соответствия, может быть использован по прямому назначению.

Регламенты применения

Культура	Вредный объект	Норма расхода рабочей жидкости, л/га	Способ, время обработки
Пшеница яровая, ячмень	Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника, просо куриное, просо сорнopolевое, овсянка, метлица полевая)	0,8-1,0	150-200

Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорняков, независимо от фазы развития культуры (с учетом чувствительности сортов).



◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Системный послевсходовый гербицид избирательного действия для борьбы с подмаренником цепким и другими однолетними двудольными сорняками в посевах зерновых культур и кукурузы

Действующее вещество:

флорасулам

Химический класс:
триазолопиримидины

Концентрация:
150 г/л

Препартивная форма:
концентрат супспензии, КС

Упаковка: канистра, 1 л

Гарантийный срок хранения:

3 года

Температура хранения:
от -5°C до +30°C

**Класс опасности
для человека:**

3 (умеренно опасное вещество)

для пчел:

3 (малоопасное вещество)

ЛУЧШИЙ ГЕРБИЦИД
в борьбе
с переросшим
подмаренником
цепким, максимально
широкой интервал
применения –
до флагового
листа

ФЛОРАН

Преимущества:

- Лучший препарат для уничтожения переросшего подмаренника цепкого (до 6-8 мутовок).
- Максимально широкие сроки применения: до появления флагового листа у зерновых культур, что существенно облегчает планирование гербицидных обработок.
- Может применяться во всех типах севооборотов без ограничений, так как быстро разлагается в почве в течение вегетационного периода.

Механизм действия

Флорасулам ингибитирует синтез фермента ацетолактатсинтазы – ключевого фермента в синтезе незаменимых растительных аминокислот валина, лейцина и изолейцина. Подавление данного фермента блокирует деление клеток, и приводит к быстрой остановке роста сорняков, пожелтению, а затем к гибели.

Симптомы воздействия

Появление симптомов гербицидного действия на сорняках зависит от нормы внесения препарата, погодных условий, видовой чувствительности и фазы сорняков. У чувствительных видов после обработки происходит остановка роста, обесцвечивание точки роста (иногда проявления антоциановой окраски) с последующим отмиранием точки роста и всего растения. Малочувствительные и переросшие сорняки могут не погибнуть, однако их рост и дальнейшее развитие значительно замедляются.

Скорость воздействия

Попадает в сорные растения через листья и частично через корни. Первые признаки гербицидного действия в виде хлоротизации точки роста и остановки ростовых процессов появляются спустя 3-5 дней после обработки. В зависимости от видовой принадлежности растений и складывающихся погодных условий полная гибель сорняков наступает через 2-3 недели.

Спектр действия

Чувствительные сорняки: аистник цикутный, воронья лапка, горец выянковый, горец почечуйный, горчица полевая, гречишко татарская, двуядра (виды), дурнишник обыкновенный, звездчатка средняя, клевер (виды), льнянка обыкновенная, лютик полевой, люцерна (виды), мак-самосейка, марь белая, марь многосемянная, пастушья сумка, пикульник (виды), подмаренник цепкий, редька дикая, ромашка непахучая, сурепка обыкновенная, щирица запрокинутая, ярутка полевая, ясколка полевая, яснотка (виды).

Среднечувствительные: амброзия полыннолистная, бодяк полевой, василек синий, вика сорнополевая, дымянка аптечная, клоповник мусорный, курай, лебеда раскидистая, марь фиголистная, мать-и-мачеха обыкновенная, мелколепестник канадский, молокан татарский, молочай лозный, одуванчик лекарственный, осот полевой, смоловка белая.

Полный список чувствительности сорняков представлен в «Таблице эффективности».

Период защитного действия

Обладает частичным почвенным действием, но в основном воздействует только на сорняки, которые присутствовали на момент обработки. При соблюдении рекомендаций по внесению обеспечивает защитное действие в течение сезона вегетации, при условии оптимального развития культуры.

Рекомендации по применению

Обработку гербицидом следует проводить в утренние или вечерние часы при температуре воздуха от +10°C до +25°C.

Большинство однолетних сорняков наиболее уязвимы к действию препарата при обработке в фазе от 2 до 6 листьев или розетки.

Максимальная эффективность уничтожения подмаренника цепкого достигается при обработке в фазу 6-8 мутовок.

Многолетние корнеотпрысковые сорняки должны находиться в фазе розетки (до начала стеблевания).

Препарат имеет максимально широкий интервал применения на зерновых культурах – от фазы 3-х листьев до появления флагового листа. Кукурузу рекомендуется опрыскивать в фазе 3-5 листьев (допустимо до 6 листьев).

Факторы, влияющие на эффективность

Проводить обработку посевов следует при благоприятных погодных условиях: в ясную, теплую, безветренную погоду, при достаточной увлажненности почвы. Осадки, выпавшие через 3-4 часа после опрыскивания, могут снизить эффективность гербицидного действия.

Рекомендации по применению в неблагоприятных погодных условиях

Не рекомендуется применять при скорости ветра более 5 м/с. Во время обработки необходимо следить, чтобы не было сноса рабочей жидкости на соседние чувствительные культуры.

Не рекомендуется проводить обработку в дни, когда прогнозируются ночные заморозки, из-за возможности снижения эффективности препарата.

В связи с тем, что Флагман обладает повышенной вязкостью, его часть может оставаться на стенках канистры. Поэтому необходимо промыть канистру чистой водой, которую затем добавить в бак опрыскивателя.

Рекомендуемые баковые смеси

Для расширения спектра действия ФЛОРАНа против многолетних двудольных сорняков на соответствующих культурах рекомендуется совместно применять с препаратами на основе 2,4-Д кислоты, дикамбы кислоты и клопирида (ЭЛАНТ, ЭЛАНТ ПРЕМИУМ, КЛОПЭФИР), сульфонилмочевин (СТАЛКЕР).

Для одновременного уничтожения двудольных и злаковых сорняков в посевах зерновых культур можно ис-

пользовать в баковой смеси с граминицидами ФАБРИС, ТАЙПАН (в рекомендуемых нормах расхода).

Возможность возникновения резистентности

Резистентность при применении препарата не выявлена.

Для предупреждения возникновения устойчивых видов следует чередовать применение с препаратами, имеющими другие механизмы действия.

Ограничения по севообороту

В связи с быстрым периодом распада в почве не обладает последействием на последующие чувствительные культуры и может использоваться во всех типах севооборотов без ограничений.

Фитотоксичность

При соблюдении рекомендаций по срокам внесения и нормам расхода случаев проявления фитотоксичности по отношению к обрабатываемым культурам не выявлено. Устойчивость к препарату проявляют просо и сорго. Не селективен для двудольных культур.

Совместимость

Совместим в баковых смесях гербицидами, граминицидами, а также с различными фунгицидами, инсектицидами, минеральными удобрениями, микроэлементами и регуляторами роста, стимуляторами роста, гуминовыми препаратами (КОНТУР РОСТ, КОНТУР ПРОФИ) применяемыми в те же сроки.

Перед обработкой рекомендуется проверить компоненты баковой смеси на совместимость.

Условия хранения

При хранении избегать попадания прямых солнечных лучей и соблюдать рекомендуемые температурные интервалы. По истечении гарантийного срока хранения, препарат должен быть проверен на соответствие требованиям технических условий. При установлении соответствия, препарат может быть использован по прямому назначению.

Регламенты применения

Культура	Вредный объект	Норма расхода рабочей жидкости, л/га	Способ, время обработки
Пшеница яровая	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. подмаренник цепкий и некоторые многолетние двудольные сорняки	0,033-0,040	200-300
Ячмень яровой			Опрыскивание посевов с фазы 3-х листьев культуры до появления флагового листа в ранние фазы развития сорняков (2-6 листьев у однолетних, фаза 6-8 мутовок у подмаренника цепкого).

*препарат находится на стадии государственной регистрации или ее расширения



Системный послевсходовый гербицид избирательного действия против широкого спектра двудольных сорняков в посевах зерновых культур

Компоненты:
2,4-Д кислота в виде сложного 2-этилгексилового эфира + метсульфурон-метил

Химический класс:
арилоксиалканкарбоновые кислоты + сульфонилмочевины

Концентрация: 850 г/л (по эфиру 2,4-Д) + 600 г/кг

Препартивная форма:
концентрат эмульсии, КЭ + вода-диспергируемые гранулы, ВДГ

Упаковка: бинарная канистра 4,5 л + 0,05 кг

Гарантийный срок хранения:
3 года

Температура хранения:
от -10°C до +25°C

Класс опасности для человека:
2 (высокоопасное вещество)

для пчел:
3 (малоопасное вещество)

ЭЛАМЕТ:
универсальный гербицид,
уничтожает

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ СОРНЯКОВ в посевах зерновых, в том числе **ПОЛЫНЬ ОБЫКНОВЕННУЮ**

ЭЛАМЕТ

Преимущества:

- Благодаря ярко выраженному эффекту синергизма между компонентами обладает высокой эффективностью против наиболее распространённых однолетних и многолетних двудольных сорняков растений в посевах зерновых культур.
- Действующие вещества, благодаря системным свойствам, активно передвигаются по сосудистой системе сорняков, поэтому препарат обладает высокой эффективностью против корневищных многолетних сорняков.
- Создает длительный «экранирующий» эффект, позволяющий подавлять вторую «волну» сорняков в случае ее появления.

Механизм действия

2,4-Д кислота обладает гормональной активностью, действуя, как ингибитор роста. Проникая через листья, стебли и корни, она активно влияет на процессы фотосинтеза и деление клеток в меристеме сорняков, вызывая деформацию листьев, стеблей и, как следствие, отмирание растения.

Метсульфурон-метил блокирует синтез фермента ацетолактатсинтазы, участвующей в синтезе незаменимых аминокислот валина, лейцина и изолейцина. Подавление данного фермента блокирует деление клеток, приводит к быстрой остановке роста сорняков, пожелтению, а затем к их гибели.

Симптомы воздействия

Основными симптомами действия являются: неравномерный рост надземных органов, разного рода деформации, обесцвечивание листьев, сокращение длины междуузлий, покраснение жилок, хлороз листьев, отмирание точек роста, некроз тканей.

Скорость воздействия

Компоненты ЭЛАМЕТ быстро поступают в сорное растение через листья и частично через корни, активно в нем перемещаются, накапливаясь в точках роста. Рост чувствительных сорных растений и конкуренция с культурой прекращаются через нескольких часов после обработки.

Гибель чувствительных сорных растений происходит обычно через 3-7 дней, полная гибель наступает через 2-3 недели.

Спектр действия

Чувствительные сорняки: аистник цикутный, бифора лучистая, бодяк полевой, болиголов крапчатый, василек синий, вероника, галиногор, герань (виды), горец (виды), горчица полевая, гречишница татарская, гулявник высокий, звездчатка средняя, липучка (виды), льнянка, обыкновенная, лютик полевой, марь (виды), незабудка полевая, подсолнечник сорный, рапс, редька дикая, ромашка непахучая, фиалка полевая.

Среднечувствительные сорняки: выонок полевой, гибискус тройчатый, донник лекарственный, коммелина, конопля сорная, молокан татарский, осот полевой, плевел (виды), паслен черный, полынь горькая, смолевка белая, сурепка обыкновенная, хвош полевой.

Полный список чувствительных сорняков представлен в «Таблице эффективности...».

Период защитного действия

Создает в почве «защитный экран», предотвращающий появление второй «волны» сорняков. При соблюдении рекомендаций достаточно одной обработки для эффективного подавления двудольных сорняков до конца вегетации, при условии оптимального развития культуры.

Рекомендации по применению

Одна упаковка рассчитана на обработку 10-12 га.

В бинарной упаковке содержится два действующих вещества из разных химических классов. В этой комбинации совмещаются положительные свойства каждого из препаратов. За счет наличия метсульфурон-метила можно продлить период гербицидного действия и достаточно эффективно подавить вторую «волну» сорняков в случае ее появления.

Наиболее эффективно применение препарата по активно вегетирующему сорнякам в интервале температур: от +8°C до +25°C.

Большинство однолетних сорняков наиболее уязвимы к действию препарата при обработке в фазе от 2 до 8 листьев или розетки. Высота многолетних корнеотпрысковых в момент обработки не должна превышать 10-15 см (для осотов фаза розетки - начала стеблевания). Фаза развития подмаренника не должна превышать 4-х мутовок.

Выонок полевой наиболее восприимчив до фазы бутонизации, при длине плетей 25-40 см.

Оптимальная фаза развития культуры для обработки гербицидом – фаза кущения зерновых.

Факторы, влияющие на эффективность

Проводить обработку посевов следует при благоприятных погодных условиях: в ясную, теплую, безветренную погоду при достаточной увлажненности почвы.

Рекомендации по применению в неблагоприятных условиях

Не рекомендуется применять препарат при скорости ветра более 5 м/с. Во время обработки необходимо следить, чтобы не было сноса препарата на соседние чувствительные культуры.

Не рекомендуется проводить обработку в те дни, когда прогнозируются ночные заморозки, и после них, из-за возможности снижения эффективности препарата. Осадки, выпавшие через 2-3 часа после опрыскивания, не снижают гербицидного действия препарата.

Рекомендуемые баковые смеси

Эффективно подавляет двудольные сорняки при самостоятельном применении, поэтому не рекомендуется к совместному использованию с другими гербицидами. Для

одновременного уничтожения двудольных и злаковых сорняков рекомендуется использовать в баковой смеси с граминицидом ФАБРИС, ТАЙПАН.

Возможность возникновения резистентности

Совместное применение веществ с разным механизмом действия предотвращает появление и накопление резистентных форм сорняков, поэтому препарат рекомендуется к применению в антирезистентных программах.

Ограничения по севообороту

При применении в условиях достаточного увлажнения, на почвах с pH не выше 7,5, полностью разлагается и не оказывает влияния на последующие культуры севооборота. В противном случае до посева двудольных культур, рекомендуется проводить глубокую вспашку.

При необходимости пересева, в год применения можно высевать только озимую и яровую пшеницу.

Фитотоксичность

При соблюдении рекомендаций по срокам и нормам внесения препарата, случаев проявления фитотоксичности по отношению к обрабатываемым культурам не выявлено.

Совместимость

Для расширения спектра действия, ЭЛАМЕТ можно применять в баковых смесях с граминицидами, а также с различными фунгицидами, инсектицидами, минеральными удобрениями, микроэлементами, регуляторами роста, стимуляторами роста, применяемыми в те же сроки.

Перед применением рекомендуется проверить компоненты баковой смеси на совместимость.

Условия хранения

При хранении избегать попадания прямых солнечных лучей и соблюдать рекомендуемые температурные интервалы. По истечении гарантийного срока хранения, препарат должен быть проверен на соответствие требованиям технических условий. При установлении соответствия, может быть использован по прямому назначению.

Регламенты применения

Культура	Вредный объект	Норма расхода, л/га, г/га	Норма расхода рабочей жидкости, л/га	Способ, время обработки
Пшеница озимая* и яровая, ячмень яровой	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	0,375-0,45 л/га (564 г/л 2,4-Д кислоты в виде сложного 2-этангексилового эфира) + 4,16-5,0 г/га (600 г/кг метсульфурон-метила)	200-300	Опрыскивание посевов яровых зерновых в фазе кущения до выхода в трубку

*препарат находится на стадии государственной регистрации или ее расширения



Системный послевсходовый гербицид избирательного действия против однолетних и многолетних двудольных сорняков (в т.ч. видов осотов) в посевах зерновых культур и кукурузы

Действующее вещество:
2,4-Д кислота в виде сложного 2-этилгексилового эфира

Химический класс:
арилоксиалканкарбоновые кислоты

Концентрация:
850 г/л (по эфиру 2,4-Д)

Препартивная форма:
концентрат эмульсии, КЭ

Упаковка: канистра 10 л
Гарантийный срок хранения:

3 года

Температура хранения:
от -10°C до +25°C

Класс опасности для человека:
2 (высокоопасное вещество)
для пчел:

3 (малоопасное вещество)

ЭЛАНТ:
обладает **ВЫСОКОЙ**
гербицидной
АКТИВНОСТЬЮ ПРОТИВ
многолетних сорняков
(ОСОТЫ, БОДЯК, ВИДЫ
МОЛОЧАЯ, ВЬЮНОК
ПОЛЕВОЙ), не снижает
эффективность
В ЛЮБЫХ
ПОГОДНЫХ
УСЛОВИЯХ

ЭЛАНТ

Преимущества:

- Подавляет широкий спектр однолетних и многолетних двудольных сорняков, в т.ч. трудноискоренимых (осоты, бодяк, виды молочая, вьюнок полевой).
- Эфирная форма 2,4-Д кислоты позволяет действующему веществу в течение часа проникнуть в сорное растение.
- Благодаря биологической активности и подвижности, быстро перемещается от листьев к точкам роста побегов и корней, останавливая рост сорняков и устраняя конкуренцию с культурными растениями.
- Обладает высокой эффективностью даже в неблагоприятных условиях окружающей среды.

Механизм действия

Эфирная форма 2,4-Д кислоты является синтетическим аналогом растительных гормонов роста. Попав в растение, она быстро перераспределяется (как по ксилеме, так и по флоэме) и замещает натуральные гормоны растений, блокируя, таким образом, их функции. При этом происходит перенасыщение синтетическими гормонами, что приводит к нарушению процесса фотосинтеза и деления клеток в меристеме, вызывая деформацию листьев и стеблей, значительное нарушение роста сорняков и последующую их гибель.

Симптомы воздействия

Основными симптомами действия являются: неравномерный рост надземных органов, разного рода деформации, обесцвечивание листьев, сокращение длины междуузлий, покраснение жилок, хлороз листьев, отмирание точек роста, некроз тканей.

Скорость воздействия

Эфирная форма способствует тому, что 2,4-Д кислота в течение одного часа после обработки проникает через кутикулу листьев и по флоэме и ксилеме переносится по растению в восходящем (к точкам роста надземных органов) и нисходящем (к корневой системе) направлениях.

Первые признаки гербицидного действия, при благоприятных погодных условиях, проявляются на чувствительных сорняках в виде искривлений и хлорозов на 1-2 день после внесения препарата.

Активный рост сорняков прекращается уже в первые сутки после опрыскивания. Полная гибель сорняков происходит в течение 14-20 дней после применения.

Спектр действия

Чувствительные сорняки: вика сорнолюбивая, воронья лапка, горчица полевая, дурман обыкновенный, звездчатка средняя, льнянка обыкновенная, марь (виды), пикульник (виды), редька дикая, рапс, сурепка обыкновенная, ясколка полевая, яснотка (виды).

Среднечувствительные сорняки: аистник цикутный, бодяк полевой, вьюнок полевой, горец (виды), гречишница татарская, горчица полевая, конофля сорная, липучка (виды), лютик полевой, молочай лозный, осот полевой, пастушья сумка, подсолнечник сорный, ромашка непахучая, ярутка полевая.

Полный список чувствительных сорняков представлен в «Таблице эффективности...».

Период защитного действия

Не обладает почвенным действием, воздействует только на сорняки, которые присутствовали на момент обработки. При соблюдении рекомендаций достаточно одной обработки для эффективного подавления двудольных сорняков до конца вегетации, при условии оптимального развития культуры.

Рекомендации по применению

Наиболее эффективно применение препарата по активно вегетирующему сорнякам в интервале температур: от +8°C до +25°C.

Большинство однолетних сорняков наиболее уязвимы к действию препарата при обработке в фазе от 2 до 8 листьев или розетки. Высота многолетних корнеотпрысковых в момент обработки не должна превышать 10-15 см (для осотов - фаза розетки - начала стеблевания). Фаза развития подмаренника не должна превышать 4-х мутовок.

Вьюнок полевой наиболее восприимчив до фазы бутонизации, при длине плетей 25-40 см.

Оптимальная фаза развития культуры для обработки гербицидом – фаза кущения зерновых, однако, допустимо применение и в более широкие сроки: от 2-3 листа до начала выхода в трубку (в смеси с сульфонилмочевинными гербицидами).

При низком и среднем уровне засоренности зерновых многолетними двудольными сорняками в фазах розетки и начала роста стебля норма расхода препарата составляет 0,6-0,7 л/га, если же они имеют высоту до 15-20 см – 0,8 л/га.

Факторы, влияющие на эффективность

Проводить обработку посевов следует при благоприятных погодных условиях: в ясную, теплую безветренную погоду, при достаточной увлажненности почвы.

Рекомендации по применению в неблагоприятных условиях

Не рекомендуется применять препарат при скорости ветра более 5 м/с. Во время обработки необходимо следить, чтобы не было сноса препарата на соседние чувствительные культуры.

Не рекомендуется проводить обработку в дни, когда прогнозируютсяочные заморозки, и после них, из-за возможности снижения эффективности препарата. Осадки, выпавшие через 2-3 часа после опрыскивания, не снижают гербицидного действия препарата.

Так как действие препарата направлено на активно делящиеся клетки меристем, а в условиях засухи этот процесс резко редуцируется, то в засушливых условиях наблюдается снижение биологической эффективности.

Рекомендуемые баковые смеси

Эффективен при самостоятельном применении, однако, для расширения спектра действия против ряда сорняков (виды пикульника и др.) рекомендуется баковая смесь с гербицидом МЕТУРОН в следующем соотношении: 0,4-0,5 л/га ЭЛАНТ + 4-6 г/га МЕТУРОН. Для одновременного уничтожения двудольных и злаковых сорняков в посевах

зерновых рекомендуется использовать в баковой смеси с граминицидом ФАБРИС или ТАЙПАН.

При составлении баковых смесей с глифосатсодержащими препаратами, для усиления эффекта в борьбе с молочаем лозным рекомендуется придерживаться соотношения РАП (3,0-4,0 л/га) + ЭЛАНТ (0,4-0,5 л/га).

Возможность возникновения резистентности

Устойчивость к препарату может возникать у сорняков семейства яснотковых (виды пикульника) и гречишных (виды гречишника). Для предупреждения возникновения устойчивых видов следует чередовать применение с препаратами, имеющими другие механизмы действия.

Ограничения по севообороту

В связи с быстрым периодом распада в почве (в течение 10-20 дней), препарат не обладает последействием и может использоваться во всех типах севооборотов без ограничений.

ЭЛАНТ может проникать в растение через корневую систему, поэтому не рекомендуется к применению в качестве довсходового гербицида на широколистных культурах, в полных нормах расхода.

Фитотоксичность

При соблюдении рекомендаций по срокам и нормам внесения препарата, случаев проявления фитотоксичности по отношению к обрабатываемым культурам не выявлено.

При применении, на посевах гибридной кукурузы возможно кратковременное полегание отдельных растений. Это связано с тем, что некоторые гибриды чувствительны к действию 2,4-Д.

Совместимость

Для расширения спектра действия, ЭЛАНТ можно применять в баковых смесях с граминицидами, а также с различными фунгицидами, инсектицидами, минеральными удобрениями, микроэлементами, регуляторами роста, стимуляторами роста (КОНТУР) и удобрениями, применяемыми в те же сроки на соответствующих культурах.


Перед применением рекомендуется проверить компоненты баковой смеси на совместимость.

Условия хранения

При хранении избегать попадания прямых солнечных лучей и соблюдать рекомендуемые температурные интервалы. По истечении гарантийного срока хранения, препарат должен быть проверен на соответствие требованиям технических условий. При установлении соответствия, может быть использован по прямому назначению.

Регламенты применения			
Культура	Вредный объект	Норма расхода рабочей жидкости, л/га	Способ, время обработки
Пшеница яровая	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	0,6-0,8	200-300
Ячмень яровой		0,7-0,8	
Кукуруза (кроме кукурузы на масло)		0,8-1,2	
			Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры
			Опрыскивание посевов в фазе 3-4 листьев культуры

*препарат находится на стадии государственной регистрации или ее расширения



Doctor
Farmer



Системный послевсходовый гербицид избирательного действия против однолетних и многолетних двудольных сорняков (в т.ч. выонка полевого) в посевах зерновых культур и кукурузы

Действующие вещества:

2,4-Д кислота и дикамбы кислота в виде сложных 2-этилгексиловых эфиров

Химический класс:
арилоксиалканкарбоновые кислоты + производные бензойной кислоты

Концентрация:
634 г/л (по эфиру 2,4-Д) + 90 г/л (эфира дикамбы)

Препартивная форма:
концентрат эмульсии, КЭ

Упаковка: канистра 10 л
Гарантийный срок хранения:

3 года

Температура хранения:
от -10°C до +25°C

Класс опасности для человека:
2 (высокоопасное вещество)
для пчел:

3 (малоопасное вещество)

ЭЛАНТ ПРЕМИУМ:
УНИЧТОЖАЕТ даже ПЕРЕОСШИЕ ТРУДНОИСКОРЕННЫЕ СОРНЯКИ:
ВЫОНКА ПОЛЕВОЙ, ВИДЫ ОСОТОВ, БОДЯК ПОЛЕВОЙ

ЭЛАНТ ПРЕМИУМ

Преимущества:

- За счет синергического эффекта двух действующих веществ имеет широкий спектр действия и высокую гербицидную активность, в том числе против сорняков, устойчивых к 2,4-Д, МЦПА и некоторым сульфонилмочевинам.
- Благодаря современной препаративной форме, быстро проникает в ткани сорных растений. Выпадение осадков через 1 час после обработки не влияет на биологическую эффективность (препарат не смывается дождем).
- Эфирные формы действующих веществ обеспечивают более чем двукратное снижение гербицидной нагрузки на почву (по 2,4-Д кислоте и дикамбе), в сравнении с препаратами на основе солей этих веществ.

Механизм действия

Эфирные формы 2,4-Д кислоты и дикамбы являются синтетическими аналогами растительных гормонов роста. Попав в растение, быстро перемещаются (по ксилеме и флоэме) и замещают натуральные гормоны растений, блокируя, таким образом, их функции. При этом происходит перенасыщение синтетическими гормонами, что приводит к нарушению процесса фотосинтеза и деления клеток в меристеме, вызывая деформацию листьев, значительное нарушение роста сорняков и последующую их гибель.

Симптомы воздействия

Основными симптомами действия являются: неравномерный рост надземных органов, разного рода деформации, обесцвечивание листьев, сокращение длины междуузлий, покраснение жилок, хлороз листьев, отмирание точек роста, некроз тканей.

Скорость воздействия

Первые признаки гербицидного действия, при благоприятных погодных условиях, проявляются на чувствительных сорняках в виде искривлений и хлорозов, на 1-2 день после внесения препарата. Скорость воздействия может снижаться в жаркую погоду, так как препарат действует по принципу регулятора роста и воздействует на активно делящиеся клетки меристемы, в жаркую же погоду все ростовые процессы в растениях замедляются.

Активный рост сорняков прекращается уже в первые сутки после опрыскивания. Полная гибель сорняков происходит на протяжении 14-20 дней после применения.

Спектр действия

Чувствительные сорняки: аистник цикутный, бодяк полевой, выонок полевой, горец (виды), гречишко татарская, конопля сорная, марь (виды), молочай лозный, пастушья сумка, пикульники (виды), полынь горькая, редька дикая, ромашка непахучая, сурепка обыкновенная, хвощ полевой, ярутка полевая, яснотка (виды).

Среднечувствительные сорняки: бифора листистая, василек синий, вероника, галиногса (виды), герань (виды), дымянка аптечная, желтушник леккий, крапива жгучая, лютик полевой, осот полевой, подмаренник цепкий, смолевка белая, чина (виды).

Полный список чувствительных сорняков представлен в «Таблице эффективности...».

Период защитного действия

Не обладает почвенным действием, воздействует только на сорняки, ко-

торые присутствовали на момент обработки. При соблюдении рекомендаций достаточно одной обработки для эффективного подавления двудольных сорняков до конца вегетации, при условии оптимального развития культуры.

Рекомендации по применению

Наиболее эффективно применение препарата по активно вегетирующему сорнякам в интервале температур: от +8°C до +25°C.

Большинство однолетних сорняков наиболее уязвимы к действию препарата при обработке в фазе от 2 до 8 листьев или розетки. Высота многолетних корнеотпрысковых в момент обработки не должна превышать 10-15 см (для осотов - фаза розетки - начала стеблевания). Фаза развития подмаренника не должна превышать 4-х мутовок.

Выонок полевой наиболее восприимчив до фазы бутонизации, при длине плетей 25-40 см.

Оптимальным временем для обработки посевов зерновых культур является период, когда культурные растения находятся в фазе 4-го листа и до появления 1-го междуузлия. Кукурузу опрыскивают в фазе 3-5 листьев (высота растений 10-15 см).

Факторы, влияющие на эффективность

Проводить обработку посевов следует при благоприятных погодных условиях: в ясную, теплую, безветренную погоду, при достаточной увлажненности почвы.

Рекомендации по применению в неблагоприятных условиях

Не рекомендуется применять препарат при скорости ветра более 5 м/с. Во время обработки необходимо следить, чтобы не было сноса препарата на соседние чувствительные культуры.

Не рекомендуется проводить обработку в дни, когда прогнозируются ночные заморозки, и после них, из-за возможности снижения эффективности препарата. Осадки, выпавшие через 2-3 часа после опрыскивания, не снижают гербицидного действия препарата.

В условиях засухи рекомендуется использовать максимальные нормы расхода препарата, так как он действует на активно делящиеся клетки меристемы, а в жаркую погоду все ростовые процессы в растениях замедляются.

Рекомендуемые баковые смеси

Для усиления гербицидного эффекта, ЭЛАНТ ПРЕМИУМ можно использовать в баковой смеси с гербицидами из других химических классов, например, с сульфонилмочевинами: ЭЛАНТ ПРЕМИУМ (0,4 л/га) + МЕТУРОН (4-6 г/га), ЭЛАНТ ПРЕМИУМ (0,5 л/га) + СТАЛКЕР (7-10 г/

га). Для одновременного уничтожения двудольных и злаковых сорняков в посевах зерновых рекомендуется использовать в баковой смеси с граминицидом ФАБРИС или ТАЙПАН.

Препарат совместим также с гербицидами на основе клопирилда и глифосата на объектах их применения.

Возможность возникновения резистентности

Резистентность к препарату не выявлена. Для предупреждения возникновения устойчивых видов следует чередовать применение с препаратами, имеющими другие механизмы действия.

Ограничения по севообороту

В связи с быстрым периодом распада в почве (в течение 10-20 дней), препарат не обладает последействием и может использоваться во всех типах севооборотов без ограничений.

Может проникать в растение через корневую систему, поэтому не рекомендуется к применению в качестве до-всходового гербицида на широколистных культурах.

Фитотоксичность

При соблюдении рекомендаций по срокам и нормам внесения препарата, случаев проявления фитотоксичности по отношению к обрабатываемым культурам не выявлено.

При применении, на посевах гибридной кукурузы возможно кратковременное полегание отдельных растений. Это связано с тем, что некоторые гибриды чувствительны к действию 2,4-Д.

Совместимость

Для расширения спектра действия ЭЛАНТ ПРЕМИУМ можно применять в баковых смесях с граминицидами, а также с различными фунгицидами, инсектицидами, минеральными удобрениями, микроэлементами и регуляторами роста, стимуляторами роста (КОНТУР), применяемыми в те же сроки на соответствующих культурах.

Перед применением рекомендуется проверить компоненты баковой смеси на совместимость.

Условия хранения

При хранении избегать попадания прямых солнечных лучей и соблюдать рекомендуемые температурные интервалы. По истечении гарантийного срока хранения, препарат должен быть проверен на соответствие требованиям технических условий. При установлении соответствия, может быть использован по прямому назначению.

Регламенты применения

Культура	Вредный объект	Норма расхода, л/га	Норма расхода рабочей жидкости, л/га	Способ, время обработки
Пшеница и ячмень яровые, овес*	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	0,6-0,8	200-300	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры до выхода в трубку
Кукуруза (зерно, масло)		0,8-0,9		Опрыскивание посевов в фазе 3-4 листьев культуры

*препарат находится на стадии государственной регистрации или ее расширения



Системный избирательный гербицид широкого спектра действия против однолетних и некоторых многолетних двудольных сорняков на яровых пшенице и ячмене.

Компоненты:
2,4-Д кислота (в виде сложного 2-этилгексилового эфира) + флорасулам

Химический класс:
арилоксикарбоновые кислоты + триазолпиримидины

Концентрация:
410 г/л (в пересчете на 2,4-Д кислоту) + 7,4 г/л

Препартивная форма:
супензионная эмульсия, СЭ

Упаковка: канистра 10 л
Гарантийный срок хранения:

3 года

Температура хранения:
от -5°C до +30°C

Класс опасности для человека:
2 (высокоопасное вещество для пчел:
3 (малоопасное вещество)

ЭЛАНТ ЭКСТРА

Преимущества:

- За счет синергического действия двух действующих веществ эффективен в борьбе с широким спектром двудольных сорняков, в том числе подмаренником цепким, ромашкой, осотом и молочаем лозным;
- Отличается высокой скоростью проникновения в растения и быстрым гербицидным действием;
- Имеет широкий интервал применения от фазы кущения до выхода в трубку (1-2 междуузлия) культуры;
- Благодаря отсутствию последействия возможно применение препарата во всех типах севооборотов.

Механизм действия

2,4-Д кислота является синтетическим аналогом гормона роста, который, попадая в растения через листья и корни, замещает гормоны растения, блокируя их функции. В результате чего нарушаются процессы фотосинтеза, вызывающие нарушение роста и развития растений и ведущее к последующей гибели растений. Флорасулам проникает в растения через листья и корни, в которых ингибирует биосинтез ацетолактатсигнатзы, являющейся ключевым ферментом в образовании валина, изолейцина и лейцина.

Симптомы воздействия

Основными симптомами действия являются: неравномерный рост надземной массы, разного рода деформации, обесцвечивание листьев, покраснение жилок, хлороз листьев, отмирание точек роста, некроз тканей.

Скорость воздействия

Компоненты ЭЛАНТА ЭКСТРА в течение часа после обработки проникают через листья в растения, передвигаются в них, концентрируясь в местах активного деления клеток (точки роста). Рост чувствительных сорняков и видимые симптомы действия препарата наблюдаются через сутки после обработки. Полная гибель сорных растений происходит в течении 2-3 недель.

Спектр действия

Чувствительные сорняки: амброзия полыннолистная, василек синий, горец (виды), горчица полевая, дескурайния Софии, дурнушник обыкновенный, звездчатка средняя, мак – самосейка, одуванчик (виды), осот полевой, пастушья сумка, редька дикая, смоловка обыкновенная, сурепка обыкновенная, торица полевая, фиалка полевая, щирица (виды), ярутка полевая.

Среднечувствительные сорняки: бодяк полевой, вероника (виды), гульянник (виды), дымянка лекарственная, канатник Теофраста, конопля сорная, лебеда (виды), марь (виды), молочай лозный, паслен черный, подмаренник цепкий, полынь обыкновенная, ромашка непахучая, яснотка (виды).

Период защитного действия

Действует на чувствительные широколистные сорняки, имеющиеся в посевах на момент обработки. Не сдерживает вторую волну сорняков. Как правило, достаточно одной обработки за вегетацию при условии оптимальной конкуренции культуры.

Рекомендации по применению

Максимальная эффективность препарата достигается при обработке активно вегетирующих сорняков в интервале температур от +8°C до +25°C.

Однолетние сорные растения наиболее уязвимы к действию препарата при обработке в фазе от 2 до 6 листьев (высотой 5-10 см), многолетние корнеотпрысковые – в фазе розетки до начала стеблевания (высотой 10-15 см).

Подмаренник цепкий наиболее восприимчив к действию гербицида в фазе от 2 до 4 мутовок, поэтому в этот период рекомендуется проведение обработки препаратом ЭЛАНТ ЭКСТРА в минимальных нормах расхода. В борьбе с переросшим сорняком (в фазе от 4 до 6 мутовок) необходимо использовать максимальные нормы расхода препарата.

Факторы, влияющие на эффективность

Проводить обработку посевов стоит при благоприятных погодных условиях: в ясную, теплую, безветренную погоду, при достаточном увлажнении почвы.

Рекомендации по применению в неблагоприятных условиях

Не рекомендуется применять препарат при скорости ветра более 5 м/с. Во время обработки необходимо следить, чтобы не было сноса препарата на соседние чувствительные культуры (бобовые, сахарная свекла, подсолнечник и др.).

Не рекомендуется проводить обработку в те дни, когда прогнозируются ночные заморозки, и после них, из-за возможности снижения эффективности препарата. Осадки, выпавшие через 2-3 часа после обработки, не снижают гербицидного действия препарата.

Рекомендуемые баковые смеси

Эффективно подавляет широкий спектр двудольных сорняков при самостоятельном применении, поэтому не рекомендуется к совместному использованию с другими гербицидами. Для борьбы со смешанным типом засорения в посевах зерновых культур рекомендуются баковые смеси с граминицидами (ФАБРИС, ТАЙПАН) в рекомендуемых нормах расхода.

Возможность возникновения резистентности

Благодаря совместному применению веществ с различными механизмами действия предотвращает появление и накопление резистентных форм сорных растений, по-

этому препарат рекомендуется к применению в антирезистентных программах.

Ограничения по севообороту

В связи с быстрым периодом распада в почве (10-20 дней), препарат не обладает последействием и может быть использован во всех типах севооборота без исключения.

Фитотоксичность

При соблюдении рекомендаций по срокам и нормам применения препарата, случаев проявления фитотоксичности по отношению к обрабатываемым культурам не наблюдалось.

В случае обработки зерновых культур в поздний период развития – в фазе выхода в трубку (1-2 междуузлия) необходимо учитывать их сортовую чувствительность.

Совместимость

Для расширения спектра действия ЭЛАНТ ЭКСТРА можно применять в баковых смесях с граминицидами, фунгицидами, инсектицидами, минеральными удобрениями, микроэлементами, регуляторами и стимуляторами роста, применяемыми в те же сроки на соответствующих культурах.

Перед применением рекомендуется проверить компоненты баковой смеси на физико – химическую совместимость.

Условия хранения

Для расширения спектра действия ЭЛАНТ ЭКСТРА можно применять в баковых смесях с граминицидами, фунгицидами, инсектицидами, минеральными удобрениями, микроэлементами, регуляторами и стимуляторами роста, применяемыми в те же сроки на соответствующих культурах.

Перед применением рекомендуется проверить компоненты баковой смеси на физико – химическую совместимость.

Регламенты применения

Культура	Вредный объект	Норма расхода, л/га	Норма расхода рабочей жидкости, л/га	Способ, время обработки
Пшеница и ячмень яровые	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	0,3-0,5 0,5	50-300	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до появления второго междуузлия и ранние фазы роста сорняков Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междуузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков (с учетом чувствительности сортов) в случае преобладания подмаренника цепкого; если погодные условия не позволили произвести обработку раньше срока

ЭЛАНТ ЭКСТРА:
эффективен В БОРЬБЕ С ПОДМАРЕННИКОМ ЦЕПКИМ и НЕ ОБЛАДЕАТ ПОСЛЕДЕЙСТВИЕМ
на последующие культуры севооборота



◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Системный послевсходовый гербицид избирательного действия против однолетних и многолетних двудольных сорняков в посевах зерновых и технических культур

Действующее вещество:
клопирагид в виде сложного 2-этилгексилового эфира

Химический класс:
пиридинкарбоновые кислоты

Концентрация:
500 г/л (по клопирагиду)

Препартивная форма:
концентрат эмульсии, КЭ

Упаковка: канистра 1 л
Гарантийный срок хранения:

3 года

Температура хранения:
от -20°C до +30°C

Класс опасности для человека:
2 (высокоопасное вещество)
для пчел:

3 (малоопасное вещество)

ЭЛЬФ:
эфир клопирагида,
ОБЛАДАЕТ
ПОВЫШЕННОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
в борьбе С ВИДАМИ
ОСОТА, РОМАШКИ,
ГОРЦА

ЭЛЬФ

Преимущества:

- Высокоэффективен против малолетних и многолетних двудольных сорняков, особенно против таких злостных и трудноискоренимых, как виды осотов, горцев и ромашки.
- Эфирная форма клопирагида позволяет уничтожать не только надземные части, но и корневую систему сорняков, включая почки возобновления и корневые отпрыски, тем самым полностью исключая их отрастание и вегетативное размножение.
- Идеальный компонент для использования в баковых смесях с другими гербицидами.

Механизм действия

Препарат поступает в сорняки через листья и корни и легко перемещается по растению в восходящем и нисходящем направлении.

Сложный эфир клопирагида является синтетической формой натурального растительного гормона. Замещает натуральные гормоны растения, нарушает процессы дыхания клеток и блокирует точки роста. Это приводит к значительным нарушениям ростовых процессов в растениях и их гибели.

Симптомы воздействия

Основными симптомами действия являются: неравномерный рост надземных органов, разного рода деформации, обесцвечивание листьев, сокращение длины междуузлий, покраснение жилок, хлороз листьев, отмирание точек роста, некроз тканей.

Скорость воздействия

Действие гербицида начинается при температуре +10°C и возрастает с увеличением температуры. Рост чувствительных сорняков и конкуренция с культурой прекращаются в течение нескольких часов после обработки. Гибель чувствительных сорных растений происходит обычно через 3-7 дней, полная гибель наступает через 2-3 недели. Корневая система наиболее вредоносных многолетних сорняков, включая почки вегетативного возобновления и корневые отпрыски бодяков, осотов и др., отмирает медленнее (15-30 дней).

Спектр действия

Чувствительные сорняки: амброзия полыннолистная, бодяк полевой, болиголов крапчатый, василек синий, вика сорнополевая, воронья лапка, горец вьюнковый, горчица полевая, гульянник высокий, дурман обыкновенный, дурнишник обыкновенный, конопля сорная, крапива жгучая, крестовник обыкновенный, курай, лопушник (виды), льнянка обыкновенная, мак-самосейка, манжетка полевая, марь белая, марь многосемянная, марь фиголистная, мать-и-мачеха обыкновенная, мелколепестник канадский, молокан татарский, молочай лозный, одуванчик лекарственный, осот полевой, очный цвет полевой, подсолнечник цепкий, пупавка (виды), ромашка непахучая, щавель конский, щирица запрокинутая, ярутка полевая, ясколка полевая, яснотка (виды).

Среднечувствительные сорняки: воронья лапка, вьюнок полевой, герань нежная, герань рассеченная, гречишко татарская, двурядка (виды), донник лекарственный, дрема, дымянка аптечная, желтушник левкойный, звездчатка средняя, клевер (виды), клоповник мусорный, крапива двудомная, липучка (виды), лютик полевой, люцерна (виды), незабудка полевая, паслен черный, пастушья сумка, пикульник (виды), подорожник (виды), полынь горькая, редька дикая, смолевка белая, чина (виды).

Полный список чувствительных сорняков представлен в «Таблице эффективности...».

Период защитного действия

Не обладает почвенным действием, воздействует только на сорняки, ко-

торые присутствовали на момент обработки. При соблюдении рекомендаций достаточно одной обработки для эффективного подавления двудольных сорняков до конца вегетации, при условии оптимального развития культуры.

Рекомендации по применению

Препарат наиболее эффективен при опрыскивании активно вегетирующих сорняков в интервале температур от +10°C до +25°C. Для получения высокой биологической эффективности необходимо проводить обработку в наиболее чувствительные фазы развития сорных растений.

Максимальная эффективность действия препарата наблюдается при применении его на начальных этапах роста и развития сорняков: фаза 2...6 листьев для однолетних двудольных сорняков и фаза розетки для многолетних двудольных сорняков.

Обработка в более поздней фазе может дать более слабый эффект, некоторые сорняки могут не погибнуть, а только остановиться в росте.

В случае высокой засоренности и активной вегетации сорняков, использовать максимально рекомендуемую норму препарата.

Факторы, влияющие на эффективность

Проводить обработку посевов следует при благоприятных погодных условиях: в ясную, теплую погоду, при достаточной увлажненности почвы.

Прохладные погодные условия (среднесуточная температура менее +12°C) замедляют проявление визуальных признаков гербицидного действия и могут снизить эффективность действия препарата на сорняки.

Внесение препарата, когда культурные растения находятся в стрессовом состоянии (засуха, заморозки, повреждения вредителями и болезнями и др.), может уменьшить эффективность действия гербицида на сорняки, а также повысить риск токсикации культурных растений, независимо от их фазы развития.

Восковой налет, образующийся на растениях в жарких погодных условиях, приводит к стеканию рабочего раствора, что в итоге снижает эффективность препарата.

Рекомендации по применению в неблагоприятных условиях

Не рекомендуется применять препарат при скорости ветра более 5 м/с. Во время обработки необходимо следить, чтобы не было сноса препарата на соседние чувствительные культуры.

Наличие капельной влаги на растениях, а также осадки, выпавшие в течение 6 часов после внесения препарата, существенно снижают эффективность его воздействия.

Регламенты применения

Культура	Вредный объект	Норма расхода, л/га	Норма расхода рабочей жидкости, л/га	Способ, время обработки
Свёкла сахарная				Опрыскивание посевов в фазе 1-3 пары листьев культуры
Пшеница и ячмень яровые, пшеница озимая	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	0,1-0,4	200-300	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку и ранние фазы роста сорняков
Рапс яровой				Опрыскивание посевов в фазе 3-4 листьев культуры

на сорняки.

Для получения высокой биологической эффективности применения препарата необходимо проводить обработку в наиболее чувствительные фазы развития сорных растений.

Рекомендуемые баковые смеси

Для расширения спектра действия, ЭЛЬФ рекомендуется для составления баковых смесей с препаратами бетанальной группы, применяемыми на сахарной свекле.

Возможность возникновения резистентности

Резистентность к препарату не выявлена. Для предупреждения возникновения устойчивых видов следует чередовать применение с препаратами, имеющими другие механизмы действия.

Ограничения по севообороту

Клопирагид подвергается быстрому микробиологическому разложению в почве (в полевых условиях период полураспада длится 8-66 дней), поэтому на следующий год, после применения препарата в полной норме расхода, можно выращивать любые культуры, кроме картофеля.

Фитотоксичность

При соблюдении рекомендаций по срокам и нормам внесения препарата, случаев проявления фитотоксичности по отношению к обрабатываемым культурам не выявлено.

При использовании препарата при температуре воздуха выше +25°C, возможно кратковременное угнетение свеклы, выражющееся в поникании листьев после обработки. Однако снижения урожайности из-за этого не происходит.

Совместимость

Совместим с фунгицидами, инсектицидами, стимуляторами роста и удобрениями, применяемыми в те же сроки, за исключением сильнощелочных.

Перед применением рекомендуется проверить компоненты баковой смеси на совместимость.

Условия хранения

При хранении избегать попадания прямых солнечных лучей и соблюдать рекомендуемые температурные интервалы. По истечении гарантийного срока хранения, препарат должен быть проверен на соответствие требованиям технических условий. При установлении соответствия, может быть использован по прямому назначению.



**Doctor
Farmer**



Системный послевсходовый граминицид избирательного действия для борьбы с однолетними и многолетними злаковыми сорняками в посевах льна, сахарной свеклы и подсолнечника.

Действующее вещество:

клетодим

Химический класс:
циклогександионы

Концентрация: 240 г/л

Препартивная форма:
концентрат эмульсии, КЭ

Упаковка: канистра 10 л

Гарантийный срок хранения:

2 года

Температура хранения:
от -20°C до +30°C

**Класс опасности
для человека:**

3 (малоопасное вещество)
для пчел:

3 (малоопасное вещество)

**ЭФЕС:
УНИЧТОЖАЕТ ВСЕ
ВИДЫ ЗЛАКОВЫХ
СОРНЯКОВ,** в т.ч. пырей

ползучий, **ПРЕПЯТСТВУЕТ**

**ВТОРИЧНОМУ
ОТРАСТАНИЮ**

корневищных

СОРНЯКОВ

ЭФЕС

Преимущества:

- Уничтожает практически все виды однолетних и многолетних злаковых сорняков, в том числе трудноискоренимых (пырей ползучий, свинорой пальчатья, гумай).
- Обладает высоким системным действием, что обеспечивает гибель не только надземной части сорных растений, но и корневой системы.
- Характеризуется быстрым проникновением в сорные растения, обеспечивает высокую эффективность при малых нормах расхода, независимо от почвенно-климатических условий.
- В баковых смесях с противодувольными гербицидами обладает эффектом синергизма, что позволяет снижать рекомендованные нормы расхода всех компонентов смеси.

Механизм действия

Препарат проникает в растения через листья и стебли, активно перемещается по ним, аккумулируясь в меристематических тканях корневой системы.

На биохимическом уровне клетодим подавляет активность фермента ацетил-КоА-карбоксилазы, тем самым блокируя синтез липидов (жирных кислот) и флавоноидов, что приводит к нарушению функций мембран и деления клеток у сорняков. В толерантных широколиственных культурах действующее вещество включается в обмен веществ и инактивируется.

Симптомы воздействия

Первые видимые симптомы действия препарата (хлоротизация, появление антоциановой окраски) становятся заметны на 5...7 день после опрыскивания.

Скорость воздействия

Препарат после обработки быстро проникает в листья сорных растений, по сосудистой системе перемещается по всем органам (включая корни и корневища), вызывая массовое поражение точек роста у чувствительных злаков. Рост сорняков прекращается в течение 1-2 дней после обработки. Полное отмирание сорняков происходит спустя 10-15 дней, в зависимости от погодных условий, гибель может наступить позднее. Корневища пырея ползучего усыхают через 12-20 дней.

Спектр действия

Чувствительные сорняки: гумай, костер ржаной, метлица обыкновенная, мятыник однолетний, овсянка обыкновенная, плевел (виды), просо куриное, пырей ползучий, росичка (виды), щетинник сизый, свинорой пальчатья.

Полный список чувствительных сорняков представлен в «Таблице эффективности...».

Период защитного действия

Не обладает почвенным действием, воздействует только на сорняки, которые присутствовали на момент обработки. При соблюдении рекомендаций достаточно одной обработки для эффективного подавления злаковых сорняков до конца вегетации, при условии оптимального развития культуры.

При появлении «второй волны» сорняков возможно повторное внесение препарата.

Рекомендации по применению

Наибольшая биологическая эффективность препарата достигается при опрыскивании по активно вегетирующему сорнякам в интервале температур от +10°C до +25°C.

Обязательным условием качественного внесения препарата является обеспечение сплошного покрытия растений. На момент обработки одно-

летние злаковые сорняки должны находиться в фазе 2-6 листьев, многолетние, в том числе пырей ползучий - при достижении ими высоты от 10 до 20 см. Сроки обработки не зависят от фазы развития культуры, однако, культурные растения не должны закрывать собой сорняки, мешая равномерному опрыскиванию.

Минимальные нормы расхода препарата применяют при соблюдении оптимальных сроков обработки, максимальные – при высокой засоренности (свыше 300 шт./кв. м) или по переросшим сорнякам.

Факторы, влияющие на эффективность

Пониженная (меньше +10°C) или повышенная (больше +25°C) температура воздуха, засуха, заморозки и другие стрессовые факторы в период внесения препарата могут существенно замедлить действие препарата на сорняки (признаки действия гербицида появляются на 3-5 дней позже), а также снизить его эффективность.

Для получения максимального эффекта при борьбе с многолетними злаками следует исключить культивацию междуурядий в течение двух недель после обработки, то есть до момента, когда процесс отмирания корневищ станет необратимым.

Рекомендации по применению в неблагоприятных условиях

Не рекомендуется применять препарат при скорости ветра более 5 м/с. Во время обработки необходимо следить, чтобы не было сноса препарата на соседние чувствительные культуры.

Не следует проводить опрыскивание в периоды, когда листья сорняков и культурных растений увлажнены. При высокой засоренности посевов и в случае наличия переросших сорняков обработку следует проводить максимальной рекомендованной для культуры нормой препарата.

Рекомендуемые баковые смеси

ЭФЕС в баковых смесях сочетается с гербицидами на основе бромоксилина, МЦПА, препаратами бетанальной группы, метамитрона, клопирагида (ЭЛЬФ, КЛОПИРА-

ГИД). При этом препарат обладает синергическим эффектом в борьбе с сорной растительностью, что позволяет снижать нормы внесения компонентов смеси. Максимальная концентрация рабочего раствора не должна превышать 0,5% по препарату.

Возможность возникновения резистентности

Резистентность к препарату не выявлена. Для предупреждения возникновения устойчивых видов, следует чередовать применение с препаратаами, имеющими другие механизмы действия.

Ограничения по севообороту

В связи с быстрым периодом распада в почве (в течение 1-3 дней), препарат не обладает последействием и может использоваться во всех типах севооборотов без ограничений.

Фитотоксичность

При использовании в соответствии с регламентом применения, не создается риска возникновения фитотоксичности для двудольных культур.

Совместимость

Совместим с другими гербицидами, фунгицидами, инсектицидами и регуляторами роста, применяемыми в те же сроки. Не рекомендуется совместное применение препарата с гербицидами на основе бентазона, так как это может привести к снижению его биологической эффективности против злаковых сорняков.

Перед применением рекомендуется проверить компоненты баковой смеси на совместимость.

Условия хранения

При хранении избегать попадания прямых солнечных лучей и соблюдать рекомендуемые температурные интервалы. По истечении гарантийного срока хранения, препарат должен быть проверен на соответствие требованиям технических условий. При установлении соответствия, может быть использован по прямому назначению.

Регламенты применения

Культура	Вредный объект	Норма расхода рабочей жидкости, л/га	Способ, время обработки
Лен масличный	Однолетние злаковые сорняки (щетинник, просо куриное, просо сорно-полевое)	0,2-0,4	200-300
	Многолетние злаковые сорняки	0,7-1,0	
Свекла сахарная	Однолетние и многолетние злаковые сорняки	0,2-0,4	Опрыскивание сорняков в период их активного роста (в фазе от 2-6 листьев) с добавлением 0,2 л/га ПАВ Неон 99.
	Многолетние злаковые сорняки	0,7-1,0	
Подсолнечник	Однолетние и многолетние злаковые сорняки	0,2-0,4	Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-20 см с добавлением 0,2 л/га ПАВ Неон 99.
	Многолетние злаковые сорняки	0,7-1,0	



◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Заводская бинарная упаковка системных послевсходовых гербицидов избирательного действия против широкого спектра двудольных сорняков в посевах зерновых культур

Компоненты:
Клопэфир, КЭ (2,4-Д кислота и клопирагид в виде сложных 2-этилгексиловых эфиров) + Сталкер*, ВДГ (трибенурон-метил)

Химический класс:
арилоксиалканкарбоновые кислоты + пиридинкарбоновые кислоты + сульфонилмочевины

Концентрация: 619 г/л
(по эфиру 2,4-Д) + 58 г/л (по эфиру клопирагида) + 750 г/кг (трибенурон-метил)

Препартивная форма:
концентрат эмульсии, КЭ + водно-диспергируемые гранулы, ВДГ

Упаковка: бинарная канистра 4,0 л (4,0 л + 0,12 кг)

Гарантийный срок хранения:
3 года

Температура хранения:
от -10°C до +25°C

Класс опасности для человека:
2 (высокоопасное вещество)
для пчел:
3 (малоопасное вещество)

КЛОПЭФИР МИКС:
эффективен против
БОЛЬШИНСТВА ВИДОВ ДВУДОЛЬНЫХ сорняков
в посевах зерновых,
ВКЛЮЧАЯ БОДЯК ПОЛЕВОЙ И ГРЕЧИХУ ТАТАРСКУЮ

КЛОПЭФИР МИКС

Преимущества:

- Эффективен против большинства видов сорняков в посевах зерновых колосовых культур, в том числе против наиболее вредоносных, включая молочай лозный, подмаренник цепкий, виды пикульника, бодяк, осот.
- Благодаря сниженным нормам расхода компонентов, препарат не оказывает отрицательного влияния на обрабатываемые культуры и может применяться в широком интервале - с фазы 2-х листьев до появления первого междуузлия.
- За счет быстрого разложения трибенурон-метила в почве, отсутствует риск возникновения последействия, поэтому может использоваться без ограничений во всех типах севооборотов.

Механизм действия

Эфиры 2,4-Д кислоты и клопирагида являются синтетическими формами растительных гормонов роста. Попав в растение, они быстро перераспределяются (по ксилеме и флоэме) и замещают натуральные гормоны растений, блокируя, таким образом, их функции. При этом происходит перенасыщение синтетическими гормонами, что приводит к нарушениям процесса фотосинтеза и деления клеток в меристеме, вызывая аномальную деформацию листьев, значительное нарушение роста сорняков и последующую их гибель.

Трибенурон-метил проникает через листья и частично через корневую систему в растение, блокирует в нем синтез фермента ацетолактатсинтазы, участвующей в синтезе незаменимых аминокислот валина, лейцина и изолейцина. Подавление данного фермента блокирует деление клеток, приводит к быстрой остановке роста сорняков, пожелтению, а затем к их гибели.

Симптомы воздействия

Основными симптомами действия являются: неравномерный рост надземных органов, разного рода деформации, обесцвечивание листьев, сокращение длины междуузлий, покраснение жилок, хлороз листьев, отмирание точек роста, некроз тканей.

Скорость воздействия

Компоненты КЛОПЭФИР МИКС поступают через листья в растение в течение 2-3 часов после обработки, активно в нем перемещаются, концентрируясь в местах активного деления клеток (точки роста). Рост чувствительных сорных растений и конкуренция с культурой приостанавливаются уже в течение нескольких часов после обработки, а через сутки прекращаются.

Гибель чувствительных сорных растений происходит обычно через 3...7 дней, полная гибель наступает через 2-3 недели. При неблагоприятных погодных условиях активность гербицидов может снижаться.

Спектр действия

Чувствительные сорняки: аистник цикутный, амброзия полыннолистная, бифора лучистая, бодяк полевой, болиголов крапчатый, бородавник обыкновенный, василек синий, вероника, вика сорнополевая, воробейник полевой, воронья лапка, герань (виды), горец (виды), горчица полевая, грецишка татарская, гулявник (виды), двуярдка (виды), донник лекарственный, дурман обыкновенный, звездчатка средняя, клевер (виды), клоповник мусорный, коммелина, конопля сорная, крапива (виды), крестовник обыкновенный, куколь обыкновенный, курай, лебеда раскидистая, липучка (виды), лопушник (виды), льнянка обыкновенная, лютик полевой, люцерна (виды), марь (виды), мелколепестник канадский, молокан татарский, молочай лозный, незабудка полевая, пастушья сумка, пикульник (виды), подмаренник

цепкий, подсолнечник сорный, полынь горькая, рапс, редька дикая, ромашка непахучая, сурепка обыкновенная, фиалка полевая, чина (виды), щирица запрокинутая, ярутка полевая, яснотка виды.

Среднечувствительные: выонок полевой, галинсога (виды), гибискус тройчатый.

Полный список чувствительных сорняков представлен в «Таблице эффективности...».

Период защитного действия

Не обладает почвенным действием, воздействует только на сорняки, которые присутствовали на момент обработки. При соблюдении рекомендаций, достаточно одной обработки для эффективного подавления двудольных сорняков до конца вегетации, при условии оптимального развития культуры.

Рекомендации по применению

Одна упаковка рассчитана на обработку 10 га. Наиболее эффективно применение препарата по активно вегетирующему сорнякам в интервале температур: от +8°C до +25°C. Осадки, выпавшие через 2-3 часа после опрыскивания, не снижают гербицидного действия.

Большинство однолетних сорняков наиболее уязвимы к действию препарата в фазу от 2 до 8 листьев или розетки. Высота многолетних корнеотпрысковых в момент обработки не должна превышать 10-15 см (для осотов - фаза розетки - начала стеблевания). Фаза развития подмаренника не должна превышать 4-х мутовок.

Выонок полевой наиболее восприимчив в фазу до начала цветения, при длине плетей 25...40 см.

Оптимальная фаза развития культуры для обработки гербицидом – фаза кущения зерновых, однако, допустимо применение и в более широкие сроки: от 2-3 листа до начала выхода в трубку.

Факторы, влияющие на эффективность

Проводить обработку посевов следует при благоприятных погодных условиях: в ясную, теплую, безветренную погоду, при достаточной увлажненности почвы.

Рекомендации по применению в неблагоприятных условиях

Не рекомендуется применять препарат при скорости ветра более 5 м/с. Во время обработки необходимо следить, чтобы не было сноса препарата на соседние чувствительные культуры.

Не рекомендуется проводить обработку в дни, когда прогнозируются ночные заморозки, и после них, из-за возможного снижения эффективности препарата.

Регламенты применения

Культура	Вредный объект	Норма расхода, л/га, г/га	Норма расхода рабочей жидкости, л/га	Способ, время обработки
Пшеница яровая	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки (бодяк, осоты, выонок), в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2 М-Х	0,4 л/га Клопэфир, КЭ (410 г/л 2,4-Д кислоты + 40 г/л клопирагида в виде сложных 2-этилгексиловых эфиров) + 12 г/га Сталкер*, ВДГ (трибенурон-метил, 750 г/кг)	200-300	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку. Озимые обрабатываются весной
Ячмень яровой				

*препарат находится на стадии государственной регистрации или ее расширения

При применении при температуре выше +25°C эффективность обработки существенно снижается, так как у сорных растений образуется защитный восковой слой.

Рекомендуемые баковые смеси

Эффективно подавляет двудольные сорняки при самостоятельном применении, поэтому не рекомендуется к одновременному использованию с другими двудольными гербицидами. Для одновременного уничтожения двудольных и злаковых сорняков рекомендуется использовать в баковой смеси с граминицидами ФАБРИС и ТАЙ-ПАН (в рекомендуемых нормах расхода).

Возможность возникновения резистентности

Препарат рекомендуется к применению в антирезистентных программах. В состав препарата входит три действующих вещества с разными механизмами действия, исключающие риск возникновения устойчивых видов сорняков.

Ограничения по севообороту

В связи с быстрым периодом распада трибенурон-метила в почве (в течение 25 дней), препарат не обладает последствием и может использоваться во всех типах севооборотов без ограничений.

Фитотоксичность

При соблюдении рекомендаций по срокам и нормам внесения препарата, случаев проявления фитотоксичности по отношению к обрабатываемым культурам не выявлено.

Совместимость

Для расширения спектра действия, КЛОПЭФИР МИКС можно применять в баковых смесях с граминицидами, а также с различными фунгицидами, инсектицидами, минеральными удобрениями, микроэлементами и регуляторами роста, стимуляторами роста (КОНТУР) и удобрениями, применяемыми в те же сроки.

Перед применением рекомендуется проверить компоненты баковой смеси на совместимость.

Условия хранения

При хранении избегать попадания прямых солнечных лучей и соблюдать рекомендуемые температурные интервалы. По истечении гарантийного срока хранения, препарат должен быть проверен на соответствие требованиям технических условий. При установлении соответствия, может быть использован по прямому назначению.



◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Заводской комплект системных послевсходовых гербицидов избирательного действия против широкого спектра однолетних и некоторых многолетних двудольных сорняков, в том числе устойчивых к 2,4-Д и МЦПА кислотам в посевах зерновых культур

Действующее вещество:
СТАЛКЕР*, ВДГ (трибенурон-метил) + МЕТУРОН, ВДГ (метсульфурон-метил)

Химический класс:
сульфонилмочевины + сульфонилмочевины

Концентрация:
750 г/кг + 600 г/кг

Препартивная форма:

водно-диспергируемые гранулы,
ВДГ + водно-диспергируемые
гранулы, ВДГ

Упаковка: флакон СТАЛКЕР*
0,062 кг + МЕТУРОН 0,051 кг

Гарантийный срок хранения:
3 года

Температура хранения:
от -20°C до +30°C

**Класс опасности
для человека:**
3 (малоопасное вещество)

для пчел:
3 (малоопасное вещество)

СТАЛМЕТ
ЭКОНОМИЧНЫЙ
комплект гербицидов,

уничижает
БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ
ДВУДОЛЬНЫХ
сорняков

СТАЛМЕТ

Преимущества:

- Гербициды, входящие в заводской комплект, подавляют большую часть наиболее распространенных двудольных сорняков в посевах зерновых культур.
- Широкий интервал применения – с фазы 2-3 листьев до появления второго междуузлия.
- За счет присутствия метсульфурон-метила продлевается период гербицидного действия, создается так называемый «экранирующий» эффект, позволяющий подавлять вторую «волну» сорняков.
- Может применяться в любых типах севооборотов без ограничений.

Механизм действия

Трибенурон-метил и метсульфурон-метил проникают в сорные растения через листья и частично через корневую систему, блокируют синтез фермента ацетолактатсингтазы, участвующей в синтезе незаменимых аминокислот валина, лейцина и изолейцина. Подавление данного фермента блокирует деление клеток, приводит к быстрой остановке роста сорняков, пожелтению, а затем к гибели.

Трибенурон-метил и метсульфурон-метил воздействуют на разные этапы ингибирования ацетолактатсингтазы, поэтому при совместном применении характеризуются эффектом синергизма.

Симптомы воздействия

Появление и характер симптомов зависит от степени восприимчивости сорных растений, стадии роста и погодных условий. Первые видимые симптомы воздействия (изменения окраски, хлорозы, некрозы) проявляются спустя 5-14 дней после опрыскивания.

Скорость воздействия

Рост сорных растений прекращается в течение суток после обработки, снижается потребление ими питательных веществ и воды. Через 1-2 недели после опрыскивания погибает точка роста. Полная гибель сорных растений происходит через 2-4 недели после опрыскивания.

Менее чувствительные (или находящиеся в более поздней фазе развития) сорняки могут сохраняться в посевах, но их рост приостанавливается, и они не могут конкурировать с культурой в потреблении питательных веществ и воды. В теплую и влажную погоду действие гербицида ускоряется, а в прохладную и сухую замедляется.

Спектр действия

Чувствительные сорняки: аистник цикутный, амброзия полыннолистная, бифора лучистая, бодяк полевой, болиголов крапчатый, воробейник полевой, герань рассеченная, горошек мышиный, горчица полевая, двуядрка (виды), донник лекарственный, звездчатка средняя, крестовник обыкновенный, льнянка обыкновенная, лютик полевой, мак-самосейка, пастушья сумка, пижулюник (виды), плевел (виды), рапс, редька дикая, сурепка обыкновенная, щирица запрокинутая, ярутка полевая, ясколка полевая.

Среднечувствительные сорняки: бородавник обыкновенный, васильек синий, вероника, герань нежная, горец вынковый, горец почечуйный, гречишко татарская, дурман обыкновенный, дымянка аптечная, крапива двудомная, марь белая, марь фиголистная, мать-и-мачеха обыкновенная, мелколепестник канадский, молокан татарский, осот полевой, подмаренник цепкий, ромашка непахучая, смолевка белая, яснотка (виды).

Полный список чувствительных сорняков представлен в «Таблице эффективности».

Период защитного действия

Заводской комплект содержит метсульфурон-метил, создающий в почве защитный «экран» и предотвращающий появление второй «волны» сорняков в течение 1-2 недель после применения.

При соблюдении рекомендаций, достаточно одной обработки для эффективного подавления двудольных сорняков до конца вегетации, при условии оптимального развития культуры.

Рекомендации по применению

Один заводской комплект гербицидов рассчитан на обработку 10-13 га.

Наиболее эффективно применение препарата по активно вегетирующему сорнякам в интервале температур от +8°C до +25°C.

Большинство однолетних сорняков наиболее уязвимы в фазу от 2 до 8 листьев или розетки. Высота многолетних корнеотпрысковых в момент обработки не должна превышать 10-15 см (для осотов - фаза розетки - начала стеблевания).

При засорении посевов трудноискоренимыми сорняками в высокой степени, а также в неблагоприятных погодных условиях (засуха) для усиления гербицидного действия СТАЛМЕТ следует применять совместно с ПАВ «Неон-99» (0,15-0,2 л/га). ПАВ улучшает смачиваемость листьев рабочим раствором и значительно улучшает проникновение действующих веществ.

Оптимальная фаза развития культуры для обработки: с 2-3 листьев до начала выхода в трубку, однако, допустимо применение и в более широкие сроки – до появления второго междуузлия.

Факторы, влияющие на эффективность

Максимальная эффективность достигается при обработке посевов в благоприятных погодных условиях: в ясную, теплую погоду, при достаточной увлажненности почвы.

Не рекомендуется проводить механическую обработку почвы на протяжении 2-х недель после применения, поскольку это может нарушить защитный почвенный «экран» и проводящую систему сорняков, что снижает эффективность их уничтожения.

Рекомендации по применению в неблагоприятных условиях

Рекомендовано применение при скорости ветра не более 5 м/с. Во время обработки необходимо следить, чтобы не было сноса препарата на соседние чувствительные двудольные культуры.

Не рекомендуется проводить обработку в дни, когда прогнозируются ночные заморозки, из-за возможности снижения эффективности действия.

Осадки, выпавшие через 1-3 часа после опрыскивания могут значительно снизить гербицидное действие.

Рекомендуемые баковые смеси

Наибольшая эффективность гербицидного действия достигается при совместном применении с ПАВ «Неон 99» (0,15-0,2 л/га).

Проявляет максимальный эффект синергизма в смесях с препаратами на основе 2,4-Д кислоты, дикамбы кислоты, клопириала. Метсульфурон-метил и трибенурон-метил в этих смесях уничтожают сорняки, устойчивые к 2,4-Д и дикамбы кислоте (виды пикульников, горцев и т.д.), а ауксинные гербициды улучшают проникновение действующих веществ через восковой налет листьев.

При среднем уровне засорения многолетними двудольными сорняками и оптимальной конкуренции культуры

/ЗАВОДСКИЕ БИНАРНЫЕ УПАКОВКИ ГЕРБИЦИДОВ/67

ры можно порекомендовать смесь СТАЛМЕТ + ЭЛАНТ (6-8 г/га + 0,2-0,25 л/га).

Если посевы засорены многолетними двудольными сорняками в большей степени, а также в неблагоприятных погодных условиях, рекомендуется повышать нормы расхода 2,4-Д содержащих препаратов - СТАЛМЕТ + ЭЛАНТ (6-8 г/га + 0,3-0,5 л/га), СТАЛМЕТ + ЭЛАНТ ПРЕМИУМ (6-8 г/га + 0,3-0,45 л/га).

Для одновременного уничтожения двудольных и злаковых сорняков рекомендуется использовать в баковой смеси с граминицидами ФАБРИС, ТАЙПАН (в рекомендуемых нормах расхода).

Возможность возникновения резистентности

Содержит два действующих вещества, поэтому риски возникновения резистентности минимальны. Для предотвращения накопления устойчивых к сульфонилмочевинным гербицидам сорняков рекомендуется к чередованию (или совместному применению) с гербицидами, имеющими другие механизмы действия.

Ограничения по севообороту

Рекомендуется применять в севооборотах на почвах с pH < 7,5. В связи с быстрым периодом распада трибенурон-метила в почве (до 1 недели в полевых условиях), а также, благодаря сниженным в 2 раза нормам расхода метсульфурон-метила, по сравнению с самостоятельным применением, полностью разлагается в почве за вегетационный период, поэтому не создает угрозы для последующих культур севооборота.

В случае гибели обработанных посевов, пересев следует производить только зерновыми культурами.

Фитотоксичность

Проявляет селективность для всех зерновых культур. При соблюдении рекомендаций по срокам и нормам внесения, случаев проявления фитотоксичности по отношению к обрабатываемым культурам не выявлено.

Совместимость

Может использоваться в баковых смесях с большинством гербицидов, инсектицидов, фунгицидов и удобрений, применяемых в те же сроки на соответствующих культурах. Не рекомендуется применять в смеси с фосфорограническими инсектицидами при обработке посевов овса.

Перед применением рекомендуется проверить компоненты баковой смеси на совместимость.

Условия хранения

При хранении избегать попадания прямых солнечных лучей и соблюдать рекомендуемые температурные интервалы. По истечении гарантированного срока хранения заводского комплекта, должен быть проведен анализ действующих веществ на соответствие требованиям технических условий. При установлении соответствия заводской комплект гербицидов может быть использован по прямому назначению.

Регламенты применения

Культура	Вредный объект	Норма расхода рабочей жидкости, л/га	Способ, время обработки
Пшеница яровая и ячмень яровой*, овес*	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА кислотам	4,8-6,2 Сталкер*, ВДГ (трибенурон-метил, 750 г/кг) + 3,9-5,1 Метурон, ВДГ (метсульфурон-метил, 600 г/кг) 200-300	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста однолетних двудольных сорняков (2-4 листа) и многолетних в фазе розетки, начиная с фазы 2 листьев до фазы выхода в трубку культуры с 0,15-0,2 л/га ПАВ «Неон 99». Озимые обрабатывать весной

*препарат находится на стадии государственной регистрации или ее расширения



Заводская бинарная упаковка системных послевсходовых гербицидов избирательного действия против широкого спектра двудольных сорняков в посевах зерновых культур

Компоненты:

Элант-Премиум, КЭ (2,4-Д кислота и дикамбы кислота в виде сложных 2-этилгексиловых эфиров) + Сталкер*, ВДГ (трибенурон-метил)

Химический класс:

арилоксиалканкарбоновые кислоты + сульфонилмочевины

Концентрация:

420 г/л (по 2,4-Д кислоте) + 60 г/л (по дикамбы кислоте) + 750 г/кг

Препартивная форма:

концентрат эмульсии, КЭ + водно-диспергируемые гранулы, ВДГ

Упаковка: бинарная канистра 4,5 л + 0,15 кг

Гарантийный срок хранения: 3 года

Температура хранения:

от -10°C до +25°C

Класс опасности для человека:

2 (высокоопасное вещество) для пчел:

3 (малоопасное вещество)

ТРИАТЛОН ПЛЮС:

эффективно ПОДАВЛЯЕТ даже ПЕРЕРОСШИЕ СОРНЯКИ: виды осотов, подмаренник ЦЕПКИЙ и др в посевах зерновых культур

ТРИАТЛОН ПЛЮС

Преимущества:

- Благодаря повышенному содержанию трибенурон-метила, препарат эффективен даже по переросшим сорнякам в посевах зерновых культур, таких как виды осотов, бодяков, подмаренник цепкий и др.
- Обладает высокой избирательностью, имеет широкий интервал сроков применения (с фазы 2-х листьев до появления первого междуузлия).
- В состав препарата входит три действующих вещества с разными механизмами действия, исключающих риск возникновения устойчивых видов сорняков.
- Отличается высокой скоростью проникновения в растения и быстрой гербицидной действия.

Механизм действия

Эфиры 2,4-Д кислоты и дикамбы являются синтетическими формами растительных гормонов роста. Попав в растение, они быстро перемещаются (по ксилеме и флоэме) и замещают натуральные гормоны растений, блокируя, таким образом, их функции. При этом происходит перенасыщение синтетическими гормонами, что приводит к нарушениям процесса фотосинтеза и деления клеток в меристеме, вызывая деформацию листьев, значительное нарушение роста сорняков и последующую их гибель.

Трибенурон-метил проникает в растение через листья и частично через корневую систему, блокирует в нем синтез фермента ацетолактатсингазы, участвующей в синтезе незаменимых аминокислот валина, лейцина и изолейцина. Подавление данного фермента блокирует деление клеток, приводит к быстрой остановке роста сорняков, пожелтению, а затем к их гибели.

Симптомы воздействия

Благодаря эфирам 2,4-Д кислоты и дикамбы, визуальные симптомы воздействия препарата становятся заметны гораздо раньше, чем при самостоятельном использовании одного гербицида на основе сульфонилмочевины.

Основными симптомами действия являются: неравномерный рост надземных органов, разного рода деформации, обесцвечивание листьев, сокращение длины междуузлий, покраснение жилок, хлороз листьев, отмирание точек роста, некроз тканей.

Скорость воздействия

Действующие вещества поступают в растения через листья в течение 2-3 часов после обработки, активно в нем перемещаются, концентрируясь в местах активного деления клеток (точки роста). Рост чувствительных сорных растений и конкуренция с культурой приостанавливаются уже в течение нескольких часов после обработки, а через сутки прекращаются.

Гибель чувствительных сорных растений происходит обычно через 3-7 дней, полная гибель наступает через 2...3 недели. При неблагоприятных погодных условиях активность гербицидов может снижаться.

Менее чувствительные (вьюнок полевой) или находящиеся в более поздней фазе развития, сорняки могут сохраняться в посевах, но их рост приостанавливается, и они не могут конкурировать с культурой в потреблении питательных веществ и воды.

Спектр действия

Чувствительные сорняки: аистник цикутный, амброзия полыннолистная, бифора лучистая, бодяк полевой, болиголов крапчатый, бородавник обыкновенный, вика сорнополевая, воробейник полевой, воронья лапка, герань (виды), горец (виды), горох посевной, горчица полевая, гречишко

татарская, гулявник (виды), двуядра (виды), донник лекарственный, дурман обыкновенный, звездчатка средняя, клевер (виды), клоповник мусорный, коммелина, конопля сорная, крапива (виды), куколь обыкновенный, липучка (виды), льнянка обыкновенная, лютик полевой, мак-самосейка, марь (виды), мать-и-мачеха, мелколепестник канадский, молокан татарский, незабудка полевая, одуванчик лекарственный, очный цвет полевой, пастушья сумка, пикульник (виды), подмаренник цепкий, полынь горькая, рапс, редька дикая, сурепка обыкновенная, чина (виды), щавель конский, ярутка полевая, яснотка (виды).

Среднечувствительные сорняки: василек синий, веноника, вьюнок полевой, дрема, молочай лозный, мята полевая, осот полевой, паслен черный, ромашка непахучая, смолевка белая, хвощ полевой, чистец (виды).

Полный список чувствительных сорняков представлен в «Таблице эффективности».

Период защитного действия

Не обладает почвенным действием, воздействует только на сорняки, которые присутствовали на момент обработки. При соблюдении рекомендаций достаточно одной обработки для эффективного подавления двудольных сорняков до конца вегетации, при условии оптимального развития культуры.

Рекомендации по применению

Одна упаковка рассчитана на обработку 10-11 га.

Наиболее эффективно применение препарата по активно вегетирующему сорнякам в интервале температур от +8°C до +25°C.

Большинство однолетних сорняков наиболее уязвимы к действию препарата при обработке в фазе от 2 до 8 листьев или розетки. Высота многолетних корнеотпрысковых в момент обработки не должна превышать 10-15 см (для осотов фаза розетки - начала стеблевания). Фаза развития подмаренника не должна превышать 4-х мутовок.

Вьюнок полевой наиболее восприимчив до фазы бутонизации, при длине плетей 25-40 см.

Оптимальная фаза развития зерновых для обработки гербицидом – фаза кущения. Однако допустимо применение и более широкие сроки: от 2-3 листьев до начала выхода в трубку.

Факторы, влияющие на эффективность

Проводить обработку посевов следует при благоприятных погодных условиях: в ясную, теплую, безветренную погоду, при достаточной увлажненности почвы.

Рекомендации по применению в неблагоприятных условиях

Не рекомендуется применять препарат при скорости

/ЗАВОДСКИЕ БИНАРНЫЕ УПАКОВКИ ГЕРБИЦИДОВ/69

ветра более 5 м/с. Во время обработки необходимо следить, чтобы не было сноса препарата на соседние чувствительные культуры.

Не рекомендуется проводить обработку в дни, когда прогнозируются ночные заморозки, и после них, из-за возможности снижения эффективности препарата. Осадки, выпавшие через 2..3 часа после опрыскивания, не снижают гербицидного действия препарата.

Рекомендуемые баковые смеси

Эффективно подавляет двудольные сорняки при самостоятельном применении, поэтому не рекомендуется к совместному использованию с другими гербицидами. Для одновременного уничтожения двудольных и злаковых сорняков рекомендуется использовать в баковой смеси с граминицидами, ФАБРИС и ТАЙПАН (в рекомендуемых нормах расхода).

Возможность возникновения резистентности

Препарат рекомендуется к применению в антирезистентных программах. В состав препарата входит три действующих вещества с разными механизмами действия, исключающие риск возникновения устойчивых видов сорняков.

Ограничения по севообороту

В связи с быстрым периодом распада трибенурон-метила в почве (в течение 25 дней), препарат не обладает постдействием и может использоваться во всех типах севооборотов без ограничений.

Фитотоксичность

При соблюдении рекомендаций по срокам и нормам внесения препарата, случаев проявления фитотоксичности по отношению к обрабатываемым культурам не выявлено.

Совместимость

Для расширения спектра действия, ТРИАТЛОН ПЛЮС можно применять в баковых смесях с граминицидами, а также с различными фунгицидами, инсектицидами, минеральными удобрениями, микроэлементами, регуляторами роста, стимуляторами роста (КОНТУР) и удобрениями, применяемыми в те же сроки.

Условия хранения

При хранении избегать попадания прямых солнечных лучей и соблюдать рекомендуемые температурные интервалы. По истечении гарантийного срока хранения, препарат должен быть проверен на соответствие требованиям технических условий. При установлении соответствия, может быть использован по прямому назначению.

Регламенты применения

Культура	Вредный объект	Норма расхода, г/га, л/га	Норма расхода рабочей жидкости, л/га	Способ, время обработки
Пшеница озимая и яровая, ячмень яровой, овес	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки (бодяк, осоты, вьюнок), в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2 М-4Х	13,6-15 г/га Сталкер*, ВДГ (750 к/г трибенурон метила) + 0,4-0,45 л/га Элант-Премиум, КЭ (420 г/л 2,4 Д кислоты + 60 г/л дикамбы кислоты в виде сложных 2-этилгексиловых эфиров)	200-300	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода трубок. Озимые обрабатываются весной

*препарат находится на стадии государственной регистрации или ее расширения



◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Заводская бинарная упаковка системных послевсходовых гербицидов избирательного действия против широкого спектра двудольных сорняков в посевах зерновых культур

Компоненты:
Элант, КЭ (2,4-Д кислота в виде сложного 2-этилгексилового эфира) + Сталкер*, ВДГ (трибенурон-метил)

Химический класс:
арилоксиалканкарбоновые кислоты + сульфонилмочевины

Концентрация:
564 г/л (по 2,4-Д кислоте)
+ 750 г/кг

Препартивная форма:
концентрат эмульсии, КЭ
+ водно-диспергируемые гранулы, ВДГ

Упаковка: бинарная канистра 4,5 л + 0,12 кг

Гарантийный срок хранения:
3 года

Температура хранения:
от -10°C до +25°C

Класс опасности для человека:
2 (высокоопасное вещество)

для пчел:
3 (малоопасное вещество)

ЭЛАСТЕР: РЕКОМЕНДУЕТСЯ

К применению на зерновых
ПРИ ПРЕОБЛАДАНИИ ГОРЧИЦЫ ПОЛЕВОЙ, ОСТОВ, БОДЯКА ПОЛЕВОГО, ГРЕЧИШКИ ТАТАРСКОЙ

ЭЛАСТЕР

Преимущества:

- Эффективен против большинства видов сорняков в посевах зерновых колосовых культур, в том числе против наиболее вредоносных: видов осотов, бодяков, горцев и гречишни татарской.
- Обладает высокой скоростью воздействия – первые симптомы поражения чувствительных сорняков заметны уже через сутки после опрыскивания.
- Не представляет опасности для последующих культур севаоборота, так как быстро разлагается в почве в течение вегетационного периода.

Механизм действия

2,4-Д кислота, обладая гормональной активностью, действует как ингибитор роста. Проникая через листья, стебли и корни, она активно влияет на процессы фотосинтеза и деление клеток в меристеме сорняков, вызывая деформацию листьев, стеблей и, как следствие, отмирание всего растения.

Трибенурон-метил блокирует синтез фермента ацетолактатсинтазы, участвующей в синтезе незаменимых аминокислот валина, лейцина и изолейцина. Подавление данного фермента блокирует деление клеток, приводит к быстрой остановке роста сорняков, пожелтению, а затем к их гибели.

Симптомы воздействия

Основными симптомами действия являются: неравномерный рост надземных органов, разного рода деформации, обесцвечивание листьев, сокращение длины междуузлий, покраснение жилок, хлороз листьев, отмирание точек роста, некроз тканей.

Скорость воздействия

Компоненты ЭЛАСТЕРА в течение часа после обработки проникают через листья в растение, активно в нем перемещаются, концентрируясь в местах активного деления клеток (точки роста). Рост чувствительных сорных растений и конкуренция с культурой приостанавливаются уже в течение нескольких часов после обработки, а через сутки прекращаются.

Гибель чувствительных сорных растений происходит обычно через 3-7 дней, полная гибель наступает через 2-3 недели. При неблагоприятных погодных условиях активность гербицидов может снижаться.

Менее чувствительные (выюнок полевой) или сорняки, находящиеся в более поздней фазе развития (молочай лозный в стадии бутонизации или цветения) могут сохраняться в посевах, но их рост приостанавливается, и они не могут конкурировать с культурой в потреблении питательных веществ и воды.

Спектр действия

Чувствительные сорняки: аистник цикутный, бифора листистая, бодяк полевой, болиголов крапчатый, вика сорнополевая, воробейник полевой, воронья лапка, галиногора (виды), герань (виды), горец (виды), горчица полевая, гречишко татарская, гульянник (виды), конопля сорная, крестовник обыкновенный, куколь обыкновенный, лебеда раскидистая, липучка (виды), льнянка, обыкновенная, лютник полевой, манжетка полевая, марь (виды), подсолнечник сорный, пупавка (виды), рапс, редька дикая, сурепка обыкновенная, ярутка полевая.

Среднечувствительные сорняки: василек синий, вероника, выюнок полевой, гибискус тройчатый, дрема, дымянка аптечная, клоповник мусорный, крапива (виды), курай, молокан татарский, молочай лозный, незабудка полевая, осот полевой, очный цвет полевой, пастушья сумка, пикульник (виды), подмаренник цепкий, полынь горькая, ромашка непахучая, смолевка белая, смолевка белая, хвощ полевой, чина (виды), чистец виды.

Полный список чувствительных сорняков представлен в «Таблице эффективности...».

Период защитного действия

Не обладает почвенным действием, воздействует только на сорняки, которые присутствовали на момент обработки. При соблюдении рекомендаций достаточно одной обработки для эффективного подавления двудольных сорняков до конца вегетации, при условии оптимального развития культуры.

Рекомендации по применению

Одна упаковка рассчитана на обработку 10-11 га. ЭЛАСТЕР содержит в своем составе два действующих вещества из разных химических классов, обладающих ярко выраженным синергетическим эффектом, при совместном применении.

Наиболее эффективно применение препарата по активно вегетирующему сорнякам в интервале температур от +8°C до +25°C.

Обработку необходимо проводить в наиболее чувствительные фазы развития сорных растений: однолетние - от 2 до 4 листьев, многолетние - в фазе розетки, начала стеблевания.

Рекомендуется к применению на зерновых с фазы 3-4-х листьев до появления второго междуузлия культуры (при преобладании в посевах горчицы полевой, осотов, бодяка полевого, гречишни татарской и др.).

При высокой засоренности посевов и в случае наличия переросших сорняков, обработку следует проводить максимальной рекомендованной для культуры нормой препарата или использовать препараты на основе 2,4-Д и дикамбы (ЭЛАНТ, ЭЛАНТ ПРЕМИУМ, ЭЛАНТ ЭКСТРА) в рекомендованных нормах расхода.

Факторы, влияющие на эффективность

Проводить обработку посевов следует при благоприятных погодных условиях: в ясную, теплую, безветренную погоду, при достаточной увлажненности почвы.

Рекомендации по применению в неблагоприятных условиях

Применять нужно при скорости ветра не более 5 м/с. Во время внесения необходимо следить, чтобы не было сноса препарата на соседние чувствительные культуры.

Не рекомендуется проводить обработку в дни, когда прогнозируются ночные заморозки, и после них, из-за возможности снижения эффективности препарата. Осадки, выпавшие через 2-3 часа после опрыскивания, не снижают гербицидного действия препарата.

Регламенты применения

Культура	Вредный объект	Норма расхода, г/га, л/га	Норма расхода рабочей жидкости, л/га	Способ, время обработки
Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки (бодяк, осоты, выюнок), в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-Х	0,4-0,45 л/га Элант, КЭ (2,4-Д кислота в виде сложного 2-этилгексилового эфира, 564 г/л) + 10,6-12 г/га Сталкер*, ВДГ (трибенурон-метил, 750 г/кг)	200-300	Опрыскивание в фазе кущения культуры до выхода в трубку.

При применении в температурном интервале выше +25°C эффективность обработки существенно снижается, так как у сорных растений образуется защитный восковой слой.

Рекомендуемые баковые смеси

Эффективно подавляет двудольные сорняки при самостоятельном применении, поэтому не рекомендуется к совместному использованию с другими гербицидами. Для одновременного уничтожения двудольных и злаковых сорняков рекомендуется использовать в баковой смеси с граминицидами ФАБРИС (в рекомендуемых нормах расхода) или ТАЙПАН.

Возможность возникновения резистентности

Рекомендуется к применению в антирезистентных программах. В состав входит три действующих вещества с разными механизмами действия, исключающие риск возникновения устойчивых видов сорняков.

Ограничения по севаобороту

В связи с быстрым периодом распада, трибенурон-метил в почве (в течение 25 дней) препарат не обладает последствием и может использоваться во всех типах севаоборотов без ограничений.

Фитотоксичность

При соблюдении рекомендаций по срокам и нормам внесения препарата, случаев проявления фитотоксичности по отношению к обрабатываемым культурам не выявлено.

Совместимость

Для расширения спектра действия, ЭЛАСТЕР можно применять в баковых смесях с граминицидами, а также с различными фунгицидами, инсектицидами, минеральными удобрениями, микроэлементами и регуляторами роста, стимуляторами роста (КОНТУР) и удобрениями, применяемыми в те же сроки.

Перед применением рекомендуется проверить компоненты баковой смеси на совместимость.

Условия хранения

При хранении избегать попадания прямых солнечных лучей и соблюдать рекомендуемые температурные интервалы. По истечении гарантийного срока хранения, препарат должен быть проверен на соответствие требованиям технических условий. При установлении соответствия, может быть использован по прямому назначению.

*препарат находится на стадии государственной регистрации или ее расширения



Заводская бинарная упаковка системных послевсходовых гербицидов избирательного действия против широкого спектра двудольных сорняков в посевах зерновых культур. Теперь с увеличенным содержанием трибенуран-метила на 25%

Компоненты:

Элант, КЭ (2,4-Д кислота в виде сложного 2-этилгексилового эфира) + Сталкер*, ВДГ (трибенуран-метил)

Химический класс:

арилоксиалканкарбоновые кислоты + сульфонилмочевины

Концентрация:

564 г/л (по 2,4-Д кислоте)
+ 750 г/кг

Препартивная форма:
концентрат эмульсии, КЭ
+ водно-диспергируемые гранулы, ВДГ

Упаковка: бинарная канистра 4,5 л + 0,15 кг

Гарантийный срок хранения:
3 года

Температура хранения:
от -10°C до +25°C

Класс опасности для человека:
2 (высокоопасное вещество)
для пчел:
3 (малоопасное вещество)

ЭЛАСТЕР ПЛЮС: РЕКОМЕНДУЕТСЯ

к применению на зерновых
ПРИ ПРЕОБЛАДАНИИ ГОРЧИЦЫ ПОЛЕВОЙ, ОСОТОВ, БОДЯКА ПОЛЕВОГО, ГРЕЧИШКИ ТАТАРСКОЙ

ЭЛАСТЕР ПЛЮС

Преимущества:

- Эффективен против большинства видов сорняков в посевах зерновых колосовых культур, в том числе против наиболее вредоносных: видов осотов, бодяков, горцев и гречишки татарской.
- Обладает высокой скоростью воздействия – первые симптомы поражения чувствительных сорняков заметны уже через сутки после опрыскивания.
- Не представляет опасности для последующих культур севооборота, так как быстро разлагается в почве в течение вегетационного периода.

Механизм действия

2,4-Д кислота, обладая гормональной активностью, действует как ингибитор роста. Проникая через листья, стебли и корни, она активно влияет на процессы фотосинтеза и деление клеток в меристеме сорняков, вызывая деформацию листьев, стеблей и, как следствие, отмирание всего растения.

Трибенуран-метил блокирует синтез фермента ацетолактатсинтазы, участвующей в синтезе незаменимых аминокислот валина, лейцина и изолейцина. Подавление данного фермента блокирует деление клеток, приводит к быстрой остановке роста сорняков, пожелтению, а затем к их гибели.

Симптомы воздействия

Основными симптомами действия являются: неравномерный рост надземных органов, разного рода деформации, обесцвечивание листьев, сокращение длины междуузлий, покраснение жилок, хлороз листьев, отмирание точек роста, некроз тканей.

Скорость воздействия

Компоненты ЭЛАСТЕРА ПЛЮС в течение часа после обработки проникают через листья в растение, активно в нем перемещаются, концентрируясь в местах активного деления клеток (точки роста). Рост чувствительных сорных растений и конкуренция с культурой приостанавливаются уже в течение нескольких часов после обработки, а через сутки прекращаются.

Гибель чувствительных сорных растений происходит обычно через 3-7 дней, полная гибель наступает через 2-3 недели. При неблагоприятных погодных условиях активность гербицидов может снижаться.

Менее чувствительные (выюнок полевой) или сорняки, находящиеся в более поздней фазе развития (молочай лозный в стадии бутонизации или цветения) могут сохраняться в посевах, но их рост приостанавливается, и они не могут конкурировать с культурой в потреблении питательных веществ и воды.

Спектр действия

Чувствительные сорняки: аистник цикутный, бифора лучистая, бодяк полевой, болиголов крапчатый, вика сорнолоповая, воробейник полевой, воронья лапка, галинсога (виды), герань (виды), горец (виды), горчица полевая, гречишко татарская, гулявник (виды), конопля сорная, крестовник обыкновенный, куколь обыкновенный, лебеда раскидистая, липучка (виды), льнянка, обыкновенная, лютик полевой, манжетка полевая, марь (виды), подсолнечник сорный, пупавка (виды), рапс, редька дикая, сурепка обыкновенная, ярутка полевая.

Среднечувствительные сорняки: василек синий, вероника, выюнок полевой, гибискус тройчатый, дрема, дымянка аптечная, клоповник мусорный, крапива (виды), курай, молокан татарский, молочай лозный, незабудка полевая, осот полевой, очный цвет полевой, пастушья сумка, пикульник (виды),

подмаренник цепкий, полынь горькая, ромашка непахучая, смолевка белая, смолевка белая, хвощ полевой, чина (виды), чистец виды.

Полный список чувствительных сорняков представлен в «Таблице эффективности».

Период защитного действия

Не обладает почвенным действием, воздействует только на сорняки, которые присутствовали на момент обработки. При соблюдении рекомендаций достаточно одной обработки для эффективного подавления двудольных сорняков до конца вегетации, при условии оптимального развития культуры.

Рекомендации по применению

Одна упаковка рассчитана на обработку 10-11 га.

ЭЛАСТЕР ПЛЮС содержит в своем составе два действующих вещества из разных химических классов, обладающих ярко выраженным синергетическим эффектом, при совместном применении.

Наиболее эффективно применение препарата по активно вегетирующему сорнякам в интервале температур от +8°C до +25°C.

Обработку необходимо проводить в наиболее чувствительные фазы развития сорных растений: однолетние - от 2 до 4 листьев, многолетние - в фазе розетки, начала стеблевания.

Рекомендуется к применению на зерновых с фазы 3-4-х листьев до конца кущения культуры (при преобладании в посевах горчицы полевой, осотов, бодяка полевого, гречишко татарской и др.).

При высокой засоренности посевов и в случае наличия переросших сорняков, обработку следует проводить максимальной рекомендованной для культуры нормой препарата или использовать препараты на основе 2,4-Д и дикамбы (ЭЛАНТ, ЭЛАНТ ПРЕМИУМ) в рекомендованных нормах расхода.

Факторы, влияющие на эффективность

Проводить обработку посевов следует при благоприятных погодных условиях: в ясную, теплую, безветренную погоду, при достаточной увлажненности почвы.

Рекомендации по применению в неблагоприятных условиях

Применять препарат нужно при скорости ветра не более 5 м/с. Во время внесения необходимо следить, чтобы не было сноса препарата на соседние чувствительные культуры.

Не рекомендуется проводить обработку в дни, когда прогнозируютсяочные заморозки, и после них, из-за возможности снижения эффективности препарата. Осадки,

/ЗАВОДСКИЕ БИНАРНЫЕ УПАКОВКИ ГЕРБИЦИДОВ/73
выпавшие через 2-3 часа после опрыскивания, не снижают гербицидного действия препарата.

При применении в температурном интервале выше +25°C эффективность обработки существенно снижается, так как у сорных растений образуется защитный восковой слой.

Рекомендуемые баковые смеси

Эффективно подавляет двудольные сорняки при самостоятельном применении, поэтому не рекомендуется к совместному использованию с другими гербицидами. Для одновременного уничтожения двудольных и злаковых сорняков рекомендуется использовать в баковой смеси с граминицидами ФАБРИС и ТАЙПАН (в рекомендуемых нормах расхода).

Возможность возникновения резистентности

Препарат рекомендуется к применению в антирезистентных программах. В состав препарата входит два действующих вещества с разными механизмами действия, исключающие риск возникновения устойчивых видов сорняков.

Ограничения по севообороту

В связи с быстрым периодом распада, трибенуран-метил в почве (в течение 25 дней) препарат не обладает последействием и может использоваться во всех типах севооборотов без ограничений.

Фитотоксичность

При соблюдении рекомендаций по срокам и нормам внесения препарата, случаев проявления фитотоксичности по отношению к обрабатываемым культурам не выявлено.

Совместимость

Для расширения спектра действия, ЭЛАСТЕР ПЛЮС можно применять в баковых смесях с граминицидами, а также с различными фунгицидами, инсектицидами, минеральными удобрениями, микроэлементами и регуляторами роста, стимуляторами роста (КОНТУР РОСТ, КОНТУР ПРОФИ) и удобрениями, применяемыми в те же сроки.

Перед применением рекомендуется проверить компоненты баковой смеси на совместимость.




Условия хранения

При хранении избегать попадания прямых солнечных лучей и соблюдать рекомендуемые температурные интервалы. По истечении гарантийного срока хранения, препарат должен быть проверен на соответствие требованиям технических условий. При установлении соответствия, может быть использован по прямому назначению.

Регламенты применения

Культура	Вредный объект	Норма расхода, г/га, л/га	Норма расхода рабочей жидкости, л/га	Способ, время обработки
Пшеница и яровая, овёс*	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки (бодяк, осоты, выюнок), в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х	0,4-0,45 л/га Элант, КЭ (2,4-Д кислота в виде сложного 2-этилгексилового эфира, 564 г/л) + 13,6-15 г/л Сталкер*. ВДГ (трибенуран-метил, 750 г/кг)	200-300	Опрыскивание в фазе кущения культуры до выхода в трубку. Озимые обрабатываются весной
Ячмень яровой				

*препарат находится на стадии государственной регистрации или ее расширения





Системный неоникотиноидный инсектицид контактно-кишечного действия против широкого спектра вредителей

Действующее вещество:

имидаклоприд

Химический класс:

неоникотиноиды

Концентрация:

200 г/л

Препартивная форма:

водорастворимый концентрат,

ВРК

Упаковка:

канюстра 5 л

Гарантийный срок хранения:

2 года

Температура хранения:

от -10°C до +30°C

Класс опасности для человека:

3 (умеренно опасное вещество)

для пчел:

1 (высокоопасное вещество)

**ИМИДОК:
ДОЛГО
СОХРАНЯЕТСЯ**

в растениях, обеспечивает

**ДЛИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД
ЗАЩИТЫ**

ИМИДОК

Преимущества:

- Обладает выраженным системным действием с длительным периодом защиты, обеспечивающим защиту побегов, появившихся после обработки.
- Уничтожает самых стойких вредителей – колорадского жука на картофеле, злаковых мух и трипсов на посевах зерновых культур.
- Механизм действия отличен от пиретроидов, фосфоорганических соединений и карбаматов, что сводит к минимуму возможность возникновения у насекомых резистентности к препарату.
- Устойчив к смыванию осадками и воздействию солнечного света.

Механизм действия

ИМИДОК обладает выраженным системным действием, проникает в растение через листья, стебли и корни. При поступлении в организм насекомых, активно воздействует на нервную систему, блокируя работу белковых рецепторов нервных клеток, что препятствует проведению нервного импульса. В результате насекомые сначала теряют двигательную активность, затем прекращают питаться и, наконец, в течение суток погибают.

Скорость воздействия

Проникает в растение в течение 2-3 часов после обработки, делая его токсичным для сосущих и грызущих вредителей. Действие начинается в момент контакта насекомого с препаратом или обработанной поверхностью. Гибель вредителей происходит в течение нескольких часов после применения (в зависимости от вредителя и культуры).

Спектр действия

Клоп вредная черепашка, хлебные жуки, злаковые мухи, трипсы, блошки, серая зерновая совка, итальянский прус, азиатская и мароканская саранча, колорадский жук, тли и др.

Период защитного действия

Действующее вещество проявляет высокую остаточную активность. Продолжительность инсектицидного действия препарата сохраняется в течение 14-21 дня после обработки.

Рекомендации по применению

Опрыскивание проводят в безветренную погоду (при температуре воздуха не ниже +15°C и скорости ветра 1-2 м/с) в утренние или вечерние часы, обеспечивая равномерное смачивание листьев.

На посадках картофеля препарат рекомендуется применять при появлении личинок колорадского жука 1-2-го возрастов. В максимальных нормах расхода используется против личинок старших возрастов и имаго, а также при высокой численности вредителей и неблагоприятных погодных условиях. Если численность второго поколения вредителей после обработки ИМИДОК не достигает экономического порога вредоносности, то в этом случае нет необходимости проводить повторное опрыскивание.

Имидаклоприд, в отличие от пиретроидов, не снижает эффективности при высоких температурах воздуха. Он также устойчив к смыванию дождем и воздействию солнечного света.

Слабо воздействует на трипсов, так как поступает в генеративные органы в меньшем количестве, чем в листья.

Препарат опасен для медоносных пчел! Не допускается обработка цветущих энтомофильных растений в период активного лета пчел. Ограничение их лета должно составлять не менее 96-120 часов.

Факторы, влияющие на эффективность

Интервал между обработкой и возможным выпадением осадков должен составлять не менее 3-4 часов. В сухую жаркую погоду на листьях обрабатываемых растений может появляться восковой налет, мешающий проникновению инсектицида. В этом случае рекомендуется использовать повышенные нормы расхода препарата.

При обработке культуры ИМИДОК не рекомендуется использовать ультрамалообъемное опрыскивание. Это связано с ограниченной растворимостью препарата в воде. Рабочий раствор должен содержать не более 0,04% препарата.

Рекомендации по применению в неблагоприятных условиях

Не рекомендуется проводить обработку при обильной росе или если в ближайший час ожидается выпадение осадков.

Категорически запрещается готовить маточный раствор препарата в отдельной емкости, в связи с высокой концентрацией действующего вещества в нем. Рабочий раствор готовят непосредственно в баке опрыскивателя.

Фитотоксичность

При применении ИМИДОК в рекомендуемых дозах фитотоксичного действия на обрабатываемую культуру не обнаружено. Изучение динамики остаточных количеств в растениях показало, что имидаклоприд (по сосудистой системе) проникает преимущественно в листья и практически не поступает в генеративные органы, что свидетельствует о безопасности его использования при капельном поливе

Регламенты применения

Культура	Вредный объект	Норма расхода, л/га	Норма расхода рабочей жидкости, л/га	Способ, время обработки
Пшеница яровая	Вредная черепашка	0,07	100-200	Опрыскивание в период вегетации
	Злаковые мухи, блошки, трипсы	0,06	200-400	
	Серая зерновая совка			
Картофель	Колорадский жук	0,05-0,07	1000-3000	Опрыскивание в период массового отрождения личинок
Участки, заселенные саранчовыми	Итальянский прус, азиатская и мароканская саранча			

овощных культур в закрытом грунте.

Рекомендуемые баковые смеси

Для расширение спектра действия и снижения пестицидной нагрузки можно использовать баковую смесь ЦУНАМИ (0,05 л/га)+ИМИДОК (0,05-0,07 л/га).

Возможность возникновения резистентности

Резистентность к препарату не выявлена. Механизм действия препарата отличается от механизма действия пиретроидов, карbamатов и фосфоорганических соединений, что сводит к минимуму возникновение как прямой, так и перекрестной устойчивости у вредителей.

Совместимость

Препарат можно использовать в баковых смесях с большинством гербицидов, инсектицидов, фунгицидов, удобрений и регуляторов роста, применяемых в те же сроки, за исключением препаратов, имеющих сильнощелочную или сильноискусственную реакцию.

Перед применением рекомендуется проверить компоненты баковой смеси на совместимость.

Условия хранения

При хранении избегать попадания прямых солнечных лучей и соблюдать рекомендуемые температурные интервалы. По истечении гарантийного срока хранения, препарат должен быть проверен на соответствие требованиям технических условий. При установлении соответствия, может быть использован по прямому назначению.



Системный неоникотиноидный инсектицид контактно-кишечного действия для защиты сельскохозяйственных культур от широкого спектра вредителей

Действующие вещества:

тиаметоксам

Химический класс:

неоникотиноиды

Концентрация: 350 г/л

Препартивная форма:
концентрат супензии, КС

Упаковка: канистра, 5 л

Гарантийный срок хранения:

2 года

Температура хранения:

от -5°C до +30°C

Класс опасности

для человека:

3 (умеренно опасное вещество)

Класс опасности для пчел:

1 (высоко опасное вещество)

**ТИМАТЕРР:
ДЛИТЕЛЬНЫЙ
ЗАЩИТНЫЙ
ЭФФЕКТ** против
**ЖУЖЕЛИЦЫ И ДРУГИХ
ВРЕДИТЕЛЕЙ ЗЕРНОВЫХ
КУЛЬТУР**

ТИМАТЕРР

Преимущества

- Обладает выраженным системным действием с длительным периодом защиты, обеспечивающим защиту побегов, появившихся после обработки.
- Высокая скорость воздействия, гибель насекомых наступает в первые часы после обработки препаратом.
- Трансламинарное перераспределение внутри растения обуславливает его высокую эффективность против сосущих и грызущих насекомых.
- Высокая эффективность независимо от внешних условий (сохраняет активность при высоких температурах, низкой влажности, устойчив к солнечной инсоляции).

Механизм действия

Тиаметоксам оказывает острое контактно-кишечное и системное действие. При попадании препарата в растение тиаметоксам метаболизируется до клотианидина, увеличивая скорость воздействия на насекомых. Быстро передвигается в восходящем направлении к вновь образующимся частям растения. При поедании насекомыми воздействует на передачу нервного импульса на уровне ацетилхолинового рецептора постсинаптической мембранны, прекращается двигательная активность и насекомые погибают.

Скорость воздействия

Гибель вредителей наступает в течение нескольких часов в зависимости от нормы расхода препарата, вида насекомого, а также от фазы развития растений.

Спектр действия

Пьявица, клоп вредная черепашка, хлебная жужелица, и др.

Период защитного действия

После внесения препарата происходит активное перераспределение действующего вещества во все растущие части растения. Таким образом, стебли, точка роста и листья находятся под надежной защитой препарата и становятся несъедобными для вредителей в течение 14-28 дней.

Рекомендации по применению

Опрыскивание проводят в безветренную погоду (при температуре воздуха не ниже +15°C и скорости ветра 1-2 м/с) в утренние или вечерние часы, обеспечивая равномерное смачивание листьев. Максимальная эффективность проведения обработок наблюдается, при достижении численности вредителей экономического порога вредоносности. Препарат действует непосредственно на насекомых, которые входят в контакт с рабочим раствором, а также на насекомых, которые пытаются обработанными растениями. Препаратор опасен для медоносных пчел! Не допускается обработка цветущих энтомофильных растений в период активного лета пчел. Ограничение их лета должно составлять не менее 96-120 часов.

Факторы, влияющие на эффективность

Не рекомендуется проводить обработку при обильной росе или если в ближайший час ожидается выпадение осадков. В сухую жаркую погоду на листьях обрабатываемых растений может появляться восковой налет, мешающий проникновению инсектицида. В этом случае рекомендуется использовать повышенные нормы расхода препарата. Наличие капельной влаги на поверхности растений во время внесения препарата может снизить эффективность обработки.

Рекомендации по применению в неблагоприятных условиях

Не рекомендуется применять препарат при температуре воздуха выше +25°C.

Осадки, выпавшие в течение 3 часов после внесения препарата, могут снизить эффективность его действия на вредителей.

Фитотоксичность

При использовании ТИМАТЕРРа в строгом соблюдении с регламентами применения риск возникновения фитотоксичности отсутствует. Запрещается скармливать вегетативную массу растений животным на протяжении 21 дня после внесения препарата.

Рекомендуемые баковые смеси

Эффективен при самостоятельном применении, поэтому не рекомендуется к использованию в баковых смесях с другими инсектицидами.

Возможность возникновения резистентности

Резистентность к препаратуре не выявлена. Уничтожает популяции вредителей, устойчивые к пиретроидам и фосфорорганическим инсектицидам.

Для предупреждения возникновения устойчивых рас-

вредителей следует чередовать применение с препарата-ми, имеющими другие механизмы действия.

Совместимость

Препарат можно использовать в баковых смесях с большинством гербицидов, фунгицидов, удобрений и регуляторов роста, применяемых в те же сроки за исключением препаратов, имеющих щелочную реакцию.

При приготовлении баковых смесей следует избегать прямого смешивания препаратов без предварительного разведения водой.

Условия хранения

При хранении избегать попадания прямых солнечных лучей и соблюдать рекомендуемые температурные интервалы. По истечении гарантийного срока хранения, препарат должен быть проверен на соответствие требованиям технических условий. При установлении соответствия, может быть использован по прямому назначению.

Регламенты применения

Культура	Вредный объект	Норма расхода, л/га	Способ, время обработки
Пшеница яровая	Трипы, клоп вредная черепашка, блошки	0,04-0,06	Опрыскивание в период вегетации
Лен масличный	Блошки		

*препарат находится на стадии государственной регистрации или ее расширения



Doctor
Farmer



Пиретроидный инсектицид контактно-кишечного действия против широкого спектра вредителей с репеллентными свойствами

Действующие вещества:

альфа-циперметрин

Химический класс:

пиретроиды

Концентрация: 100 г/л

Препартивная форма:

концентрат эмульсии, КЭ

Упаковка: канистра 5 л

Гарантийный срок хранения:

3 года

Температура хранения:

от -20°C до +30°C

Класс опасности для человека:

3 (умеренно опасное вещество)

для пчел:

1 (высокоопасное вещество)

ЦУНАМИ:
Идеально подходит
для защиты
широкого спектра
сельскохозяйственных
культур,
эффективен
против
саранчовых

ЦУНАМИ

Преимущества:

- Обладает высокой биологической активностью против всех систематических групп вредных насекомых, в том числе устойчивых к фосфорорганическим инсектицидам.
- Эффективен на всех стадиях развития насекомых, кроме стадии яиц.
- Обладает нокдаун-эффектом, мгновенно действуя на нервную систему вредителей.
- Характеризуется высокой скоростью токсического воздействия, в том числе при неблагоприятных погодных условиях.

Механизм действия

Альфа-циперметрин относится к группе высокоэффективных синтетических пиретроидов и обладает стабильным контактно-кишечным действием.

Действует на нервную систему насекомых, нарушает проницаемость клеточных мембран, блокирует натриевые каналы, вызывая паралич всех органов, а затем и гибель вредителя. Препарат обладает репеллентным (отпугивающим) эффектом: тормозит откладку яиц взрослыми особями и процесс откармливания личинок. Действует практически мгновенно при контакте или поедании растений насекомыми.

Скорость воздействия

Действие препарата ЦУНАМИ идет в двух направлениях – контактном и системном. Действие начинается в момент контакта насекомого с препаратом или с обработанной поверхностью. Системность выражается в быстром проникновении инсектицида в растение через листья в течение первых часов после опрыскивания, которое тем самым, обеспечивает защиту от всех систематических групп вредных насекомых. При правильном использовании препарата через 10...15 минут после применения насекомые перестают двигаться из-за паралича, а полная гибель вредителей наступает через 1-2 часа.

Спектр действия

Клоп вредная черепашка, блошки, трипсы, пьявица, рапсовый цветоед, крестоцветные блошки, колорадский жук, свекловичная листовая тля, свекловичная минирующая муха, гороховая зерновка, гороховая плодожорка, тли, саранчовые и др.

Период защитного действия

Общая продолжительность защитного действия составляет 10...20 дней в зависимости от вида вредного объекта, стадии его развития и погодных условий.

Рекомендации по применению

Для достижения высокой эффективности применения ЦУНАМИ, рекомендуется проводить обработку во время активной вегетации растений, при увеличении численности популяции вредителей.

Погодные условия на момент обработки должны быть благоприятными: среднесуточная температура воздуха +15°C+20°C, скорость ветра 1-2 м/с.

Наличие капельной влаги на поверхности растений, а также осадков, выпавших в течение 3 часов после внесения препарата, могут существенно снизить эффективность его действия. Норма расхода рабочей жидкости должна быть не менее 100 л/га. При работе с насекомыми старших возрастов, нормы расхода препарата следует повышать до максимальных.

Рекомендуется одно или два опрыскивания за сезон, в зависимости от появления новых генераций вредителя.

Факторы, влияющие на эффективность

В случае, когда культурные растения находятся в стрессовом состоянии (прохладные погодные условия, заморозки, засуха и повышение температуры), системное действие инсектицида на вредителей существенно уменьшается.

Повышенные температуры (выше +25°C) существенно снижают эффективность действия препарата.

Рекомендации по применению в неблагоприятных условиях

В связи с низкой фотостабильностью препаратов класса пиретроидов (на солнечном свете они быстро разлагаются до неактивных соединений), внесение ЦУНАМИ допускается только в утренние и вечерние часы.

Осадки, выпавшие в течение 3 часов после внесения препарата, могут снизить эффективность его действия на вредителей.

Фитотоксичность

При использовании ЦУНАМИ в строгом соответствии с рекомендациями, не создается риска возникновения фитотоксичности.

Обладает репеллентным действием на пчел, которые сразу после опрыскивания покидают обрабатываемый участок. Благодаря своим физико-химическим свойствам и низким нормам применения препарат практически не мигрирует по профилю почвы и не попадает в грунтовые воды.

Регламенты применения

Культура	Вредный объект	Норма расхода, л/га	Норма расхода рабочей жидкости, л/га	Способ, время обработки
Пшеница*	Клоп вредная черепашка	0,1-0,15		Опрыскивание в период вегетации
	Блошки, тли, цикадки, трипсы, пьявица	0,1		
	Пьявица	0,1-0,15		
	Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки	0,1-0,15		
	Колорадский жук	0,07-0,1		
	Свекловичная листовая тля, свекловичные блошки, долгоносики, озимая совка, клеверная совка	0,1-0,15		
Хлопчатник	Хлопковая совка, трипсы, тли	0,3		Опрыскивание в период отрождения личинок
Участки заселенные саранчевыми	Итальянский прус, мароккская и азиатская саранча	0,15		

*препарат находится на стадии государственной регистрации или ее расширения



Красящий концентрат для создания и увеличения интенсивности сигнальной окраски семенного материала при протравливании

Действующие вещества:
азокраситель кошенилевый красный

Концентрация: 300 г/л

Препартивная форма:
концентрат супспензии, КС

Упаковка: канистра, 1 л

Гарантийный срок хранения:
3 года

Температура хранения:
от -5°C до +30°C

Класс опасности для человека:
4 (вещества малоопасные)

**КОЛОР УЛЬТРА:
СОЗДАЕТ ЯРКУЮ
сигнальную
ОКРАСКУ**
при протравливании

КОЛОР УЛЬТРА

Преимущества:

- Придаёт яркую красную сигнальную окраску обработанным семенам. Повышает безопасность при работе с протравленными семенами. Обработанные семена не выцветают под воздействием солнечных лучей.
- Совместим со всеми препаратами, предназначенными для обработки семян – фунгицидными и инсектицидными протравителями, биологическими препаратами, разного рода удобрениями, не влияет на их эффективность. Повышает степень удерживаемости препаратов на семенах.
- Полностью инертен – не оказывает влияния на процессы роста и развития семян и клубней. Может применяться на всех культурах без ограничений. Не токсичен для объектов окружающей среды и человека.
- Универсален и удобен в применении – может использоваться на любом протравочном оборудовании, имеющимся в хозяйстве.

Механизм действия

Является концентрированным красителем. Закрепляется на обработанной поверхности и создаёт яркую сигнальную окраску красного цвета. Окраска сигнализирует, что зерно было обработано химическими препаратами, и его нельзя употреблять в пищу и на корм животным.

Рекомендации по применению.

Колор Ультра рекомендуется использовать совместно с химическими и биологическими препаратами, не содержащими в составе сигнальной окраски – что позволяет контролировать полноту и равномерность протравливания семян, а также с фунгицидами для протравливания семян, применяемыми в минимальных зарегистрированных нормах расхода, когда необходимо получить более интенсивную окраску обработанного семенного материала.

Фитотоксичность.

Не обладает фунгицидным действием. Полностью инертен. При использовании в строгом соответствии с разработанными рекомендациями применения, риск возникновения фитотоксичности отсутствует.

Условия хранения

При хранении избегать попадания прямых солнечных лучей и соблюдать рекомендуемые температурные интервалы. По истечении гарантийного срока хранения, препарат должен быть проверен на соответствие требованиям технических условий. При установлении соответствия, может быть использован по прямому назначению.

Регламенты применения

Культура	Цель применения	Норма расхода, л/т	Способ, время обработки
Все культуры (зерновые, зернобобовые, масличные и др.)	Создание сигнальной окраски на обработанных семенах и клубнях	0,1	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до одного года)



Инновационный адьювант, усиливающий действие гербицидов при совместном применении

Действующие вещества:
ортрофосфорная кислота, буферные добавки, поверхностно-активные вещества, индикаторный краситель

Препартивная форма:
водный раствор, ВР

Упаковка: канистра, 0,1 л (с индикаторным красителем), 10 л (без красителя)

Гарантийный срок хранения:
3 года

Температура хранения:
от -20 до +30°C

Класс опасности для человека:
2 (высокоопасное соединение)

Рекомендуемые баковые смеси

Может применяться с большинством гербицидов (и десикантов), фунгицидов и инсектицидов (за исключением сильнощелочных), особенно при неблагоприятных условиях внесения (в сухую и жаркую погоду, когда листья сорняков покрыты восковым налетом или имеют густое опушение, при малообъемном опрыскивании).

Фитотоксичность.

Не обладает фитотоксическим действием. Полностью инертен. При использовании в строгом соответствии с разработанными рекомендациями применения, риск возникновения фитотоксичности отсутствует.

Условия хранения

При хранении избегать попадания прямых солнечных лучей и соблюдать рекомендуемые температурные интервалы. По истечении гарантийного срока хранения, препарат должен быть проверен на соответствие требованиям технических условий. При установлении соответствия, может быть использован по прямому назначению.

Регламенты применения

Совместное применение с:	Цель применения	Норма расхода, л/ 1000 л рабочего раствора	Способ, время обработки
Большинство гербицидов (особенно десикантов), фунгицидов и инсектицидов (за исключением сильнощелочных)	Создание оптимальных значений pH используемой воды, снижение содержания солей жесткости, увеличение проникающей способности препаратов	0,8-2,5 (согласно изменению цвета воды на малиновый или доведению значения pH до 5,5)	Согласно регламенту применения пестицидов. Регулятор кислотности всегда заливается первым в баковую смесь!
	Для улучшения совместимости компонентов в сложных баковых смесях и снижения степени поверхностного натяжения капель рабочего раствора	0,2-0,5	

**ГЛАСИС:
ПОВЫШАЕТ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ОБРАБОТОК,
ПОЗВОЛЯЕТ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ЖЕСТКУЮ
ВОДУ**

ГЛАСИС

Преимущества:

- Позволяет в полевых условиях довести значения pH используемой воды до оптимальных слабокислых, повышает биологическую эффективность пестицидов и усвоение микроэлементов из удобрений.
- Умягчает даже очень жесткую воду, снижает содержание солей жесткости (кальция (Ca^{2+}) и магния (Mg^{2+}) на единицу объема воды).
- Улучшает растворение сухих рецептур (СП, ВДГ), помогает стабилизировать многокомпонентные баковые смеси пестицидов, делает более длительным период хранения рабочего раствора.
- Увеличивает проникающую способность большинства препаратов (особенно на основе диквата и глифосата), снижает скорость испарения капель рабочего раствора.

Механизм действия

Устанавливает и стабилизирует заданную слабокислотную среду рабочего раствора. Умягчает жесткую воду, необратимо связывает катионы кальция, магния, железа присутствующие в жесткой воде. Снижает степень поверхностного натяжения капель рабочего раствора.

Позволяет стабилизировать многокомпонентную баковую смесь и увеличить биологическую эффективность большинства препаратов.

Рекомендации по применению

В ёмкость объёмом 1 л набирается вода, которая будет применяться для обработки. В мерный шприц набирается 5 мл регулятора кислотности с индикатором pH и постепенно добавляется в воду при постоянном перемешивании.

Цвет воды по мере увеличения концентрации препарата будет меняться. Необходимо довести цвет раствора до малинового (согласно цветовой шкале на этикетке). Если для получения малинового цвета раствора понадобилось 1,5 мл регулятора кислотности, то на 1000 л рабочего раствора будет необходимо 1,5 л препарата. При использовании pH метра кислотность раствора доводится до 5,5.

Рекомендуемые баковые смеси

Может применяться с большинством гербицидов (и десикантов), фунгицидов и инсектицидов (за исключением сильнощелочных), особенно при неблагоприятных условиях внесения (в сухую и жаркую погоду, когда листья сорняков покрыты восковым налетом или имеют густое опушение, при малообъемном опрыскивании).

Фитотоксичность.

Не обладает фитотоксическим действием. Полностью инертен. При использовании в строгом соответствии с разработанными рекомендациями применения, риск возникновения фитотоксичности отсутствует.

Условия хранения

При хранении избегать попадания прямых солнечных лучей и соблюдать рекомендуемые температурные интервалы. По истечении гарантийного срока хранения, препарат должен быть проверен на соответствие требованиям технических условий. При установлении соответствия, может быть использован по прямому назначению.



Инновационный адъювант, усиливающий действие гербицидов при совместном применении

Действующие вещества:
оксиэтилированный алкилфенол на основе тримеров пропиленов, стабилизированные органические масла

Препартивная форма:

жидкость, Ж

Упаковка:

канистра 10 л

Гарантийный срок хранения:

3 года

Температура хранения:

от -20°C до +30°C

Класс опасности для человека:

3 (умеренно опасное вещество)

для пчел:

3 (малоопасное вещество)

НЕОН 99: УМЕНЬШАЕТ ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ
наносимого раствора, **УСИЛИВАЕТ ПОГЛОЩЕНИЕ**
действующего вещества

НЕОН 99

Преимущества:

- Уменьшает поверхностное натяжение капель рабочего раствора и увеличивает площадь растекания раствора по поверхности. Способен снижать поверхностное натяжение воды в 2 раза (до значения 40 нН/м).
- Связывается с восками на поверхности листьев сорняков, усиливает поглощение действующих веществ, повышает устойчивость гербицидов к смыванию осадками.
- Повышает скорость действия и эффективность гербицидов. Особенное большое значение это имеет в засушливые и холодные периоды, когда замедляется рост сорняков и ухудшается их смачивание рабочей жидкостью.

Механизм действия

Снижает поверхностное натяжение капель рабочего раствора, в связи с чем капли лучше удерживаются на поверхности и меньше скатываются, что ведет к увеличению биологической эффективности гербицидов. Усиливает проникновение липофильных гербицидов, замедляет преждевременное испарение капель рабочего раствора. Также выступает в качестве стабилизатора суспензий гербицидов, выпускаемых в виде водно-диспергируемых гранул.

Рекомендации по применению.

С большинством пестицидов Неон 99 применяется в дозе 0,2 л/га при норме расхода рабочей жидкости от 100 до 300 л/га и 0,15 л/га при норме менее 100 л/га. При приготовлении рабочего раствора в бак опрыскивателя следует заливать в последнюю очередь, в связи с риском повышенного пенообразования.

Рекомендуемые баковые смеси

Применяется в баковых смесях с гербицидами СТАЛКЕР, РОМУЛ, ЭФЕС поэтому рассматривается как элемент технологии применения этих гербицидов. Также может применяться и с другими гербицидами, а также фунгицидами и инсектицидами, особенно при неблагоприятных условиях внесения (в сухую и жаркую погоду, когда листья сорняков покрыты восковым налетом или имеют густое опушение).

Фитотоксичность.

Не обладает гербицидным действием. Полностью инертен. При использовании в строгом соответствии с разработанными рекомендациями применения, риск возникновения фитотоксичности отсутствует.

Условия хранения

При хранении избегать попадания прямых солнечных лучей и соблюдать рекомендуемые температурные интервалы. По истечении гарантийного срока хранения, препарат должен быть проверен на соответствие требованиям технических условий. При установлении соответствия, может быть использован по прямому назначению.

Регламенты применения

Совместное применение с:	Норма расхода, л/га	Особенности применения
Сталкер (10-20 г/га)	0,15-0,2	0,15 л/га при норме расхода рабочей жидкости менее 100 л/га и 0,2 л/га при норме от 100 до 300 л/га
Ромул (30-50 г/га)	0,2-0,4	Пропорция Неон 99 и Эфес 1:1
Эфес (0,2-0,4 л/га)	0,4-1,0	Оптимальная пропорция Неон 99 и Эфес 1:1. Минимальное количество – 0,4 л/га
Эфес (0,7-1,0 л/га)	0,2-0,3	0,2 л/га при норме расхода рабочей жидкости менее 100 л/га и 0,3 л/га при норме от 100 до 300 л/га
Усиление действия гербицидов, фунгицидов, инсектицидов		



Высокоэффективный пеногаситель на основе модифицированных полидиметилсилоксанов линейной и разветвленной структуры

Действующее вещество:
водная эмульсия кремнийорганических полимеров

Препартивная форма:

водный раствор, ВР

Упаковка:

флакон, 0,01 литра.

Гарантийный срок хранения:

3 года

Температура хранения:

от +5° до +30°C

Класс опасности

для человека:

4 (малоопасное соединение)

СНИМАЕТ ПРОБЛЕМУ

избыточного
ПЕНООБРАЗОВАНИЯ
сложных рабочих
растворов и
ГЛИФОСАТОВ

ТЕСИЛ 201

Преимущества:

- Универсальный пеногаситель для любых фунгицидов, гербицидов, инсектицидов, ПАВ, адьювантов и их баковых смесей, не оказывает никакого действия на биологическую активность.
- Надежно нейтрализует образование пены при заполнении бака опрыскивателя, предотвращает потери пестицидов с пеной при заправке.
- Оказывает быстрое пеногасящее действие при низких концентрациях.
- Длительно сохраняет эффект пеногашения - в течение 6-10 часов с момента приготовления рабочего раствора.
- Значительно облегчает процессы приготовления баковых смесей - предотвращает потерю времени, связанную с повышенным пенообразованием.

Механизм действия

Пеногаситель Тесил 201 предназначен для предотвращения образования пены в водных и водно-органических системах при приготовлении баковых смесей с пестицидами. Эффективно гасит пену при значении pH от 3 до 10.

Вытесняет пенообразователь (поверхностно-активное вещество или адьювант) из адсорбционного слоя в пленках пены, в результате чего они становятся неустойчивыми и легко разрушаются.

Рекомендации по применению.

Рабочий интервал концентраций пеногасителя - 0,000005...0,00002% в рабочем растворе (5-20 мл на 1000 л рабочего раствора). В отдельных случаях норма расхода может быть повышенена до 30-50 мл на 1000 л рабочего раствора.

Необходимая концентрация пеногасителя Тесил 201 подбирается опытным путем для каждого конкретного случая в зависимости от качества воды, норм расхода используемых пестицидов и адьювантов, количества компонентов в баковых смесях.

Рекомендуемые баковые смеси

Тесил 201 рекомендуется к совместному применению с пестицидами в случае повышенного пенообразования определенных формулений (Рап, Рап 600 и другие), а также при совместном использовании гербицидов с адьювантами (Эфес, Ромул, Сталкер).

Без пеногасителя в этих случаях при приготовлении рабочих растворов возможно неконтролируемое выделение устойчивой пены.

Пеногаситель Тесил 201 всегда заливается в бак опрыскивателя первым, затем следуют компоненты баковой смеси в соответствии с обычными рекомендациями.

Фитотоксичность

Не обладает гербицидным действием. Полностью инертен. При использовании в строгом соответствии с разработанными рекомендациями применения, риск возникновения фитотоксичности отсутствует.

Условия хранения

При хранении избегать попадания прямых солнечных лучей и соблюдать рекомендуемые температурные интервалы. По истечении гарантийного срока хранения, препарат должен быть проверен на соответствие требованиям технических условий. При установлении соответствия, может быть использован по прямому назначению.

Регламенты применения

Норма расхода, мл/1000 л рабочего раствора	Особенности применения
5-20	При среднем пенообразовании (совместно с Рап и Рап 600, Неон 99 и другими препаратами)
30-50	При повышенном пенообразовании многокомпонентных рабочих растворов



Инновационное комплексное органо-минеральное удобрение с повышенным содержанием гуминовых, фульвовых кислот и микроэлементов в хелатной форме

Компоненты и концентрация:

Комплекс микроэлементов (в хелатной форме - железо, цинк, магний, медь, марганец, молибден) - 10,0 г/л

Гуминовые кислоты - 70,0 г/л

Фульвовые кислоты - 30,0 г/л

Препартивная форма:

водный раствор, ВР

Упаковка: канистра, 10 л

Гарантийный срок хранения:

3 года

Температура хранения:

от 0°C до +25°C

Класс опасности:

4 (малоопасное вещество)

КОНТУР

Преимущества:

- Стимулирует процессы роста и развития растений, повышает устойчивость к неблагоприятным факторам (заморозки, засуха).
- Улучшает питание растений, способствует лучшему усвоению элементов питания из почвы.
- При обработке вегетирующих растений повышает устойчивость к болезням, усиливает процессы фотосинтеза и обмена веществ.
- Значительно снижает токсическую нагрузку гербицидов на культурные растения при совместном использовании.
- Обеспечивает достоверное увеличение общей урожайности любых сельскохозяйственных культур.

Механизм действия

Гуминовые кислоты положительно влияют на обмен веществ у растений через увеличение проницаемости мембран клеток, значительно повышают активность природных регуляторов роста растений - ауксинов, цитокининов и гиббереллинов.

Являются аккумуляторами органического вещества почвы – углеводов, аминокислот, пигментов, биологически активных веществ. В них концентрируются необходимые растениям, как макро, так и микроэлементы. Они улучшают не только физико-химические свойства почвенных частиц, но и связывают избыток токсического для растений почвенного алюминия и других элементов.

Главная роль фульвовых кислот в переносе минеральных элементов и питательных веществ из почвы в растения. Являются своеобразным электролитом - растворяют минералы (с образованием фульватов), а растения вместе с водой их всасывают корневой системой.

Кроме того, фульвовые кислоты усиливают обменные процессы, восстанавливают электрический потенциал клеток, повышают проницаемость клеточных мембран, обладают антиоксидантными свойствами, участвуют в нейтрализации и выводе токсинов из организма.

КОНТУР содержит комплекс шести хелатированных (ЭДТА) микроэлементов: железо (4%), цинк (1,5%), магний (5,4%), медь (1,5%), марганец (4%), молибден (0,1%).

Данные микроэлементы играют очень важную роль в окислительном и энергетическом обмене, образовании хлорофилла, обеспечивают засухо- и морозоустойчивость растений, повышают сопротивляемость к грибным и вирусным заболеваниям, участвуют в регулировании процессов роста.

Период действия

Оказывает продолжительное росторегулирующее действие, период максимально выраженного действия на растения – в течение 10-14 дней после обработки.

Действие на культуру

Обработка семян

При обработке семян наблюдается повышение полевой всхожести и энергии прорастания семян и клубней, стимулируется рост и развитие корневой системы, что обеспечивает появление сильных здоровых всходов, которые способны усваивать труднодоступные элементы питания из почвы. В результате чего повышается устойчивость растений к неблагоприятным климатическим условиям и почвенным патогенам.

Обработка в течение вегетации

Обработка растений в период вегетации увеличивает площадь листовой поверхности и содержания в ней хлорофилла. Растения развиваются быстрее, у зерновых культур происходит увеличение общего коэффициента кущения и количества боковых побегов.

Стимулирует обмен веществ и интенсивность фотосинтеза. Улучшается качество продукции (содержание клейковины, сахара, масла), повышает урожайность, обеспечивает достоверное увеличение урожайности.

Особенности применения

Может применяться на посевах на всех сельскохозяйственных культурах без ограничения. Обеспечивает значительную прибавку урожая и улучшение его качества. Рекомендуется к совместному применению при проведении любых химических обработок.

В период вегетации рекомендуется добавлять КОНТУР в каждую обработку в этом случае увеличение урожая будет максимальным.

Факторы, влияющие на эффективность

Для проправления рекомендуется использовать очищенные от пыли и примесей семена и клубни, что гарантирует хорошую прилипаемость и, следовательно, лучшее качество проправления.

Обработки посевов в период вегетации следует проводить при благоприятных погодных условиях: в ясную, теплую, безветренную погоду.

Рекомендации по применению в неблагоприятных условиях

Не рекомендуется применять препарат при скорости ветра более 5 м/с во избежание его неравномерного внесения. Осадки, выпавшие на протяжении 2-3 часов после обработки препаратом, могут снизить эффективность его действия. В условиях засухи рекомендуется использовать максимальные нормы расхода препарата.

Рекомендации по применению при проправлении

Обработку семян можно проводить как заблаговременно, так и непосредственно в день посева. При заблаговременном проправлении семян зерновых их влажность может слегка повышаться, поэтому обработанные семена нужно хранить в сухом помещении. Беречь обработанные семена от прямых солнечных лучей.

При приготовлении баковой смеси при проправлении сначала добавляют необходимые пестициды согласно инструкции производителя и очередности смешивания препартивных форм, затем добавляют необходимое количество Контур. Канистру необходимо взболтать. Бак доливают водой до полного объема при постоянном пере-

мешивании. Рабочий раствор необходимо использовать в течение 6 часов с момента приготовления.

Рекомендации по применению в течение вегетации

Вносить препарат следует в утренние и вечерние часы при скорости ветра до 3 м/с и при отсутствии ожидаемых осадков в течение 2-3 часов после проведения опрыскивания.

Рабочий раствор готовят непосредственно перед опрыскиванием в соответствии с инструкцией производителя и очередностью смешивания препартивных форм. Пестициды заливают в бак опрыскивателя, заполненного на 1/3 водой с включенной мешалкой. Далее при включенном перемешивающем устройстве добавляют необходимое количество Контур. Канистру необходимо взболтать. Затем бак доливают водой до полного объема при постоянном перемешивании. Рабочий раствор необходимо использовать в течение 6 часов с момента приготовления.

Совместимость

Препарат может применяться без ограничений в баковых смесях любой степени сложности (с фунгицидами, проправителями, гербицидами, фунгицидами, инсектицидами). Легко образует стабильный рабочий раствор, не выпадает в осадок, не вступает в реакции с компонентами баковой смеси.

В каждом конкретном случае перед совместным применением необходима предварительная проверка на физико-химическую совместимость компонентов баковой смеси.

Условия хранения

При хранении избегать попадания прямых солнечных лучей и соблюдать рекомендуемые температурные интервалы. По истечении гарантийного срока хранения, препарат должен быть проверен на соответствие требованиям технических условий. При установлении соответствия, может быть использован по прямому назначению.

Регламенты применения

Культура	Норма расхода препарата, л/т/га	Норма расхода рабочей жидкости, л/т/га	Способ, время обработки
Пшеница, ячмень яровые и озимые, овес, рожь	0,1-0,2	10	Предпосевная обработка семян (самостоятельно или совместно с фунгицидами / инсектицидами проправителями)
Зернобобовые, технические, кормовые культуры		10-20	
Пшеница, ячмень яровые и озимые, овес, рожь	0,1-0,2	150-300	Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза (самостоятельно или совместно с гербицидами, фунгицидами, инсектицидами)
Зернобобовые, технические, кормовые культуры		150-400	
Плодово-ягодные культуры, виноград	0,1-0,2	800-1000	

КОНТУР:
содержит **ВЫСОКОЕ**
КОЛИЧЕСТВО
ФУЛЬВОВЫХ
КИСЛОТ, ПОВЫШАЕТ
УРОЖАЙНОСТЬ
ЛЮБЫХ КУЛЬТУР



Инновационное комплексное органо-минеральное удобрение, содержащее арахидоновую кислоту, комплекс активных растительных L-аминокислот, тритерпеновые кислоты, комплекс микроэлементов, а также гуминовые и фульвовые кислоты

Компоненты и концентрация:

Комплекс активных растительных L-аминокислот - 45,0 г/л

Арахидоновая кислота - $3,28 \times 10^{-5}$ моль/л

Тритерпеновые кислоты - $1,31 \times 10^{-2}$ моль/л

Комплекс микроэлементов (в хелатной форме - железо, цинк, магний, медь, марганец, молибден) - 10,0 г/л

Гуминовые кислоты - 70,0 г/л

Фульвовые кислоты - 30,0 г/л

Препартивная форма:

водный раствор, ВР

Упаковка: канистра, 10 л

Гарантийный срок хранения: 3 года

Температура хранения:

от 0°C до +25°C

Класс опасности:

4 (малоопасное вещество)

КОНТУР АНТИСТРЕСС: СНИМАЕТ СТРЕСС ОТ ГЕРБИЦИДНЫХ ОБРАБОТОК, УСИЛИВАЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ к повреждениям вредителями и болезнями

КОНТУР АНТИСТРЕСС

Преимущества:

- Минимизирует риски возникновения фитотоксичности у культурных растений после применения гербицидов.
- Увеличивает общую неспецифическую устойчивость растений к различным неблагоприятным абиотическим и биотическим повреждающим факторам - грибковым, бактериальным и вирусным патогенам, водному и температурному стрессу.
- Проявляет выраженное ростостимулирующее действие, индуцирует синтез фитоалексинов, способствующих повышению локальной устойчивости растений к повреждениям и фитопатогенным организмам.
- Повышает ростовую активность, улучшает качественные показатели, усиливает устойчивость к повреждениям вредителями и болезнями.

Механизм действия

Активные растительные L-аминокислоты (глутаминовая кислота, глицин, пролин, лизин и другие) улучшают транспирацию и регулируют водообмен в растениях, способствуют лучшему усвоению микроэлементов, улучшают эффективность фотосинтеза и увеличивают содержание хлорофилла, способствуют повышению иммунитета растений в стрессовых ситуациях.

Арахидоновая кислота формирует неспецифическую устойчивость к грибам, бактериям, вирусам, активирует активность генов, осуществляющих контроль за интенсивностью ростовых процессов и выработкой фитогормонов, вызывает у растений защитные реакции с выделением стрессовых метаболитов, повышающих общий уровень иммунитета.

Тритерпеновые кислоты обеспечивают гарантированное снятие стресса от гербицидных обработок, участвуют в фотохимических реакциях, повышают активность работы хлоропластов и увеличивают интенсивность фотосинтеза, усиливают образование антистрессовых белков и других компонентов специфического и неспецифического фитоиммунитета - сахаров, аскорбиновой кислоты, витаминов D, E, K, абсцизовой кислоты, гормонов эндистерона и гибберелина, антиоксиданты.

Гуминовые кислоты увеличивают активность природных регуляторов роста растений - ауксинов, цитокининов и гиббереллинов и повышают проницаемость мембран живых клеток растений, что усиливает интенсивность фотосинтеза и процессов обмена веществ.

Фульвокислоты усиливают обменные процессы, восстанавливают электрический потенциал клеток, повышают проницаемость клеточных мембран.

Период действия

Оказывает продолжительное росторегулирующее действие, период максимально выраженного действия на растения – в течение 10-14 дней после обработки.

Действие на культуру

Обработка семян

Наиболее эффективен при применении в период вегетации, однако, возможна обработка семян. При обработке семян наблюдается повышение полевой всхожести и энергии прорастания семян и клубней, стимулируется рост и развитие корневой системы, что обеспечивает появление сильных здоровых всходов. Тритерпеновые кислоты и L- аминокислоты входящие в состав препарата позволяют растениям экономить энергию и не останавливать рост и развитие в условиях стресса.

Обработка в течение вегетации

При внесении препарата во время вегетации культуры у растений увеличивается их ростовая активность, улучшаются качественные показатели, происходит повышение иммунного статуса, все процессы детоксикации попавших в растение извне химических веществ (гербицидов) происходят быстрее. В

результате чего усиливается устойчивость к болезням, которая сохраняется не менее 14 дней после обработки.

Увеличивается интенсивность энергетических процессов происходящих в клетке, что приводит к повышению интенсивности дыхания и фотосинтеза. Улучшается качество продукции (содержание клейковины, сахара, масла), повышает урожайность, обеспечивает достоверное увеличение урожайности.

Особенности применения

Рекомендуется к применению в первую очередь на ослабленных вредными факторами (засуха, заморозки, повреждения вредителями и др.) культурах. Превосходно снимает стресс, возникающий после химических обработок определенными гербицидами, помогает избежать «эффекта гербицидной ямы».

В первую очередь эффективно применение на посевах следующих культур:

- Рапс – совместно с гербицидами на основе клопирадида и пиклорамида
- Горох – совместно с гербицидами на основе МЦПА кислоты, имазамокса и имазетапира
- Кукуруза – совместно с гербицидами на основе 2,4-Д кислоты
- Соя - совместно с гербицидами на основе имазамокса и имазетапира
- Свекла - совместно с гербицидами на основе десмедифама и фенмедифама
- Зерновые культуры - при обработках в поздние фазы развития (второе междуузлие, флаговый лист)

Факторы, влияющие на эффективность

Для проправливания рекомендуется использовать очищенные от пыли и примесей семена и клубни, что гарантирует хорошую прилипаемость и, следовательно, лучшее качество проправливания.

Обработки посевов в период вегетации следует проводить при благоприятных погодных условиях: в ясную, теплую, безветренную погоду.

Рекомендации по применению в неблагоприятных условиях

Не рекомендуется применять препарат при скорости ветра более 5 м/с во избежание его неравномерного внесения. Осадки, выпавшие на протяжении 2-3 часов после обработки препаратом, могут снизить эффективность его действия. В условиях засухи рекомендуется использовать максимальные нормы расхода препарата для лучшего проявления антидепресантных свойств.

Рекомендации по применению при проправливании

Обработку семян можно проводить как заблаговремен-

но, так и непосредственно в день посева. При заблаговременном проправлении семян зерновых их влажность может слегка повышаться, поэтому обработанные семена нужно хранить в сухом помещении. Беречь обработанные семена от прямых солнечных лучей.

При приготовлении баковой смеси при проправлении сначала добавляют необходимые пестициды согласно инструкции производителя и очередности смешивания препартивных форм, затем добавляют необходимое количество Контур Антистресс. Канистру необходимо взболтать. Бак доливают водой до полного объема при постоянном перемешивании. Рабочий раствор необходимо использовать в течение 6 часов с момента приготовления.

Рекомендации по применению в течение вегетации

Вносить препарат следует в утренние и вечерние часы при скорости ветра до 3 м/с и при отсутствии ожидаемых осадков в течение 2-3 часов после проведения опрыскивания.

Рабочий раствор готовят непосредственно перед опрыскиванием в соответствии с инструкцией производителя и очередностью смешивания препартивных форм. Пестициды заливают в бак опрыскивателя, заполненного на 1/3 водой с включенной мешалкой. Далее при включенном перемешивающем устройстве добавляют необходимое количество Контур Антистресс. Канистру необходимо взболтать. Затем бак доливают водой до полного объема при постоянном перемешивании. Рабочий раствор необходимо использовать в течение 6 часов с момента приготовления.

Совместимость

Препарат может применяться без ограничений в баковых смесях любой степени сложности (с фунгицидными проправителями, гербицидами, фунгицидами, инсектицидами). Легко образует стабильный рабочий раствор, не выпадает в осадок, не вступает в реакции с компонентами баковой смеси.

В каждом конкретном случае перед совместным применением необходима предварительная проверка на физико-химическую совместимость компонентов баковой смеси.

Условия хранения

При хранении избегать попадания прямых солнечных лучей и соблюдать рекомендуемые температурные интервалы. По истечении гарантийного срока хранения, препарат должен быть проверен на соответствие требованиям технических условий. При установлении соответствия, может быть использован по прямому назначению.

Культура	Норма расхода препарата, л/т/га	Норма расхода рабочей жидкости, л/т/га	Способ, время обработки
Зерновые, зернобобовые, технические, кормовые культуры	0,1-0,2	10-20	Предпосевная обработка семян (самостоятельно или совместно с фунгицидными / инсектицидными проправителями)
Зерновые, зернобобовые, технические, кормовые, овощные культуры	0,1-0,2	150-400	Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза (самостоятельно или совместно с гербицидами, фунгицидами, инсектицидами)
Плодово-ягодные культуры, виноград	0,1-0,2	800-1000	



Инновационное комплексное органо-минеральное удобрение, содержащее наночастицы серебра в коллоидной форме, комплекс активных растительных L-аминокислот, комплекс микроэлементов, а также гуминовые и фульвовые кислоты

Компоненты и концентрация:

Комплекс активных растительных L-аминокислот - 40,0 г/л

Ионы серебра - 2,943x10⁻³ моль/л

Комплекс микроэлементов (в хелатной форме - железо, цинк, магний, медь, марганец, молибден) - 10,0 г/л

Гуминовые кислоты - 70,0 г/л

Фульвовые кислоты - 30,0 г/л

Препартивная форма: водный раствор, ВР

Упаковка: канистра, 10 л

Гарантийный срок хранения: 3 года

Температура хранения: от 0°C до +25°C

Класс опасности: 4 (малоопасное вещество)

КОНТУР АРГЕНТ:
ОБЛАДАЕТ
ВЫРАЖЕННЫМ
ФУНГИЦИДНЫМ
ДЕЙСТВИЕМ,
ПОВЫШАЕТ
ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ИММУНИТЕТ

КОНТУР АРГЕНТ

Преимущества:

- Выраженное фунгицидное действие - ионы серебра стимулируют образование фитохелатинов и активных форм кислорода в клетках, которые подавляют жизнедеятельность патогенов и повышают естественный иммунитет.
- Способствует повышению проницаемости клеточных мембран, что делает процессы обмена веществ более интенсивными.
- Снижает образование внутри растений супероксидов кислорода, что продлевает вегетацию фотосинтезирующих органов растений, позволяя наиболее реализовать потенциал растений.
- Усиливает действие химических фунгицидов, позволяет использовать минимальные нормы расхода без потерь эффективности.

Механизм действия

Серебро – один из сильнейших известных антибиотиков. В Контур Аргент оно содержится в коллоидной форме в виде наночастиц размером до 25 нм. Они имеют чрезвычайно большую удельную площадь поверхности, что увеличивает область контакта серебра с патогенами, значительно улучшая фунгицидные свойства. Это позволяет в сотни раз снизить концентрацию серебра с сохранением всех полезных свойств.

Наночастицы серебра защищают растения от грибных и вирусных заболеваний, в связи с тем, что его ионы реагируют с клеточной мембраной патогенов, которая представляет собой структуру из особых белков (пептидогликанов), соединенных аминокислотами для обеспечения механической прочности и стабильности. Серебро взаимодействует с внешними пептидогликанами, блокируя их способность передавать кислород внутрь клетки патогена, что приводит к гибели.

Кроме того, серебро ингибирует ферменты дыхательной цепи, а также разобщает процессы окисления и окислительного фосфорилирования в клетках грибов, в результате чего клетка гибнет. На растительные клетки ионы серебра фитотоксически не действуют, напротив усиливают процессы выработки активных форм кислорода в тканях и природных фитоалексинов, которые являются основными факторами неспецифического иммунитета.

Активные растительные L-аминокислоты (глутаминовая кислота, глицин, пролин, лизин и другие) улучшают транспирацию и регулируют водообмен в растениях, способствуют лучшему усвоению микроэлементов, улучшают эффективность фотосинтеза и увеличивают содержание хлорофилла, способствуют повышению иммунитета растений в стрессовых ситуациях.

Гуминовые кислоты увеличивают активность природных регуляторов роста растений - ауксинов, цитокининов и гиббереллинов и повышают проницаемость мембран живых клеток растений, что усиливает интенсивность фотосинтеза и процессов обмена веществ.

Фульвокислоты усиливают обменные процессы, восстанавливают электрический потенциал клеток, повышают проницаемость клеточных мембран.

Период действия

Оказывает продолжительное росторегулирующее и фунгицидное действие, период максимально выраженного действия на растения – в течение 10-14 дней после обработки.

Действие на культуру

Обработка семян

Наиболее эффективен при применении в период вегетации, однако возможна обработка семян. При обработке семян наблюдается повышение посевной всхожести и энергии прорастания семян и клубней, стимулируется рост и развитие корневой системы, что обеспечивает появление сильных здоровых всходов, которые способны усваивать труднодоступные элементы питания из почвы. Значительно улучшается внутренний иммунитет и устойчивость к почвенным патогенам (особенно возбудителям корневых гнилей).

Обработка в течение вегетации

При внесении препарата во время вегетации культуры у растений на-

блюдается выраженный фунгицидный эффект, снижается интенсивность развития различных патогенов, стимулируется обмен веществ и интенсивность фотосинтеза, в результате чего улучшается качество продукции (содержание клейковины, сахара, масла), обеспечивает продление времени жизни фотосинтезирующих органов. Значительно усиливается действие химических фунгицидов при совместном применении, допускается снижение норм расхода до минимальных рекомендованных.

Особенности применения

Рекомендуется к применению в первую очередь для профилактики аэробных инфекций на предрасположенных к заболеваниям культурах – озимой пшенице, рапсе, бобовым. Первую обработку на озимой пшенице рекомендуется проводить весной, после возобновления вегетации.

При одновременном применении с химическими фунгицидами допускается снижение их норм расхода до минимально рекомендованных, при этом биологическая эффективность останется на уровне максимальной нормы расхода (при самостоятельном применении).

Факторы, влияющие на эффективность

Для проправливания рекомендуется использовать очищенные от пыли и примесей семена и клубни, что гарантирует хорошую прилипаемость и, следовательно, лучшее качество проправливания.

Обработки посевов в период вегетации следует проводить при благоприятных погодных условиях: в ясную, теплую, безветренную погоду.

Рекомендации по применению в неблагоприятных условиях

Не рекомендуется применять препарат при скорости ветра более 5 м/с во избежание его неравномерного внесения. Осадки, выпавшие на протяжении 2-3 часов после обработки препаратом, могут снизить эффективность его действия. В условиях засухи рекомендуется использовать максимальные нормы расхода препарата для лучшего проявления антидепрессантных свойств.

Рекомендации по применению при проправливании

Обработку семян можно проводить как заблаговременно, так и непосредственно в день посева. При заблаговременном проправливании семян зерновых их влажность может слегка повышаться, поэтому обработанные семена

нужно хранить в сухом помещении. Беречь обработанные семена от прямых солнечных лучей.

При приготовлении баковой смеси при проправлении сначала добавляют необходимые пестициды согласно инструкции производителя и очередностью смешивания препартивных форм, затем добавляют необходимое количество Контур Аргент. Канистру необходимо взболтать. Бак доливают водой до полного объема при постоянном перемешивании. Рабочий раствор необходимо использовать в течение 6 часов с момента приготовления.

Рекомендации по применению в течение вегетации

Вносить препарат следует в утренние и вечерние часы при скорости ветра до 3 м/с и при отсутствии ожидаемых осадков в течение 2-3 часов после проведения опрыскивания.

Рабочий раствор готовят непосредственно перед опрыскиванием в соответствии с инструкцией производителя и очередностью смешивания препартивных форм. Пестициды заливают в бак опрыскивателя, заполненного на 1/3 водой с включенной мешалкой. Далее при включенном перемешивающем устройстве добавляют необходимое количество Контур Аргент. Канистру необходимо взболтать. Затем бак доливают водой до полного объема при постоянном перемешивании. Рабочий раствор необходимо использовать в течение 6 часов с момента приготовления.

Совместимость

Препарат может применяться без ограничений в баковых смесях любой степени сложности (с фунгицидными проправителями, гербицидами, фунгицидами, инсектицидами). Легко образует стабильный рабочий раствор, не выпадает в осадок, не вступает в реакции с компонентами баковой смеси.

В каждом конкретном случае перед совместным применением необходима предварительная проверка на физико-химическую совместимость компонентов баковой смеси.

Условия хранения

При хранении избегать попадания прямых солнечных лучей и соблюдать рекомендуемые температурные интервалы. По истечении гарантийного срока хранения, препарат должен быть проверен на соответствие требованиям технических условий. При установлении соответствия, может быть использован по прямому назначению.

Регламенты применения

Культура	Норма расхода препарата, л/т/га	Норма расхода рабочей жидкости, л/т/га	Способ, время обработки
Зерновые, зернобобовые, технические, кормовые культуры	0,1-0,2	10-20	Предпосевная обработка семян (самостоятельно или совместно с фунгицидами / инсектицидами проправителями)
Пшеница и ячмень озимые	0,2	150-300	
Пшеница яровая, ячмень яровой, овес, рожь	0,1-0,2	150-300	
Зернобобовые, технические, кормовые, овощные культуры		150-400	
Плодово-ягодные культуры, виноград	0,1-0,2	800-1000	



◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Инновационное комплексное органо-минеральное удобрение, содержащее азот и фосфор, янтарную кислоту, комплекс микроэлементов, а также гуминовые и фульвовые кислоты.

Компоненты и концентрация:

Азот (в амидной форме)
- 80,0 г/л

Фосфор - 30,0 г/л

Янтарная кислота - $2,54 \times 10^{-1}$ моль/л

Комплекс микроэлементов (в хелатной форме - железо, цинк, магний, медь, марганец, молибден) - 10,0 г/л

Гуминовые кислоты - 70,0 г/л
Фульвовые кислоты - 30,0 г/л

Препартивная форма:
водный раствор, ВР

Упаковка: канистра, 10 л

Гарантийный срок хранения:
3 года

Температура хранения:
от 0°C до +25°C

Класс опасности:
4 (малоопасное вещество)

**КОНТУР ПРОФИ:
ВОСПОЛНЯЕТ
НЕДОСТАТОК
АЗОТА И ФОСФОРА**
в процессе вегетации,
способствует
**АКТИВНОМУ
РОСТУ** растений

КОНТУР ПРОФИ

Преимущества:

- Содержит уникальный сбалансированный комплекс макроэлементов (азот и фосфор), янтарную кислоту, гуминовые и фульвовые кислоты, а также 6 основных микроэлементов, что делает его универсальным средством, решающим множество задач в период вегетации.
- Эффективный способ восполнения дефицита азота и фосфора в середине вегетации.
- Способствует активному росту растений даже в стрессовых условиях, улучшает водный баланс растений.
- Активизирует биологические процессы (синтез белка, интенсивность фотосинтеза, выработка гормонов).
- Повышает биологическую активность гербицидов при совместном применении.

Механизм действия

Азот в амидной форме активирует процессы синтеза белков, значительно ускоряет рост растений, повышает и продлевает фотосинтетическую активность листьев, увеличивает содержание хлорофилла. Усиливает клеточную проницаемость и токсическое действие гербицидов на сорняки.

Фосфор положительно влияет на развитие корневой системы, ее сопротивляемость болезням и вредителям, а также неблагоприятным абиотическим условиям. Задерживает старение листьев и повышает урожайность зерна зерновых культур в условиях жаркого и сухого лета. Повышает устойчивость растений к стрессовым факторам. Является эффективным способом корректировки дефицита фосфора в середине вегетации.

Янтарная кислота активизирует ростовые процессы в растениях, даже при неблагоприятных условиях. Усиливает процессы образования органического вещества в растениях. Значительно увеличивает проницаемость клеточных мембранных, растения начинают более активно потреблять питательные вещества из почвы. Повышает коэффициенты усвоения азота, фосфора и калия. Способна в рабочем растворе хелатировать макро- и микроэлементы.

Гуминовые кислоты увеличивают активность природных регуляторов роста растений - ауксинов, цитокининов и гиббереллинов и повышают проницаемость мембран живых клеток растений, что усиливает интенсивность фотосинтеза и процессов обмена веществ.

Фульвокислоты усиливают обменные процессы, восстанавливают электрический потенциал клеток, повышают проницаемость клеточных мембранных.

Период действия

Оказывает продолжительное росторегулирующее действие, период максимально выраженного действия на растения – в течение 10-14 дней после обработки.

Действие на культуру

Обработка семян

Наиболее эффективен при применении в период вегетации, однако возможна обработка семян. При обработке семян наблюдается повышение полевой всхожести и энергии прорастания семян и клубней, стимулируется рост и развитие корневой системы. Азот в амидной форме обеспечивает появление сильных здоровых всходов, которые способны усваивать труднодоступные элементы питания из почвы. Фосфор стимулирует процессы корнеобразования.

Обработка в течение вегетации

При внесении препарата во время вегетации стимулирует ростовые процессы растений, способствует улучшению водного баланса растений, при совместном применении гербициды лучше усваиваются сорными растениями и глубже проникают в корневую систему. Азот в амидной форме, содержащийся в составе препарата, является наиболее усвояемой формой азотного удобрения для некорневой подкормки. Из всех азотных удобрений он наи-

более легко проникает в растения и не обжигает их при применении.

Особенности применения

Рекомендуется к применению в первую очередь на культурах со слаборазвитой корневой системой - пшеница, ячмень, овес.

Наибольший эффект достигается при двукратном применении. Для зерновых - в фазу кущения и фазу флагового листа. Культуры наиболее отзывчивы при неблагоприятных погодных условиях, когда поглощение макроэлементов корневой системой усложнено (низкие температуры, засуха, плохая освещенность, гербицидные стрессы).

Факторы, влияющие на эффективность

Для проправления рекомендуется использовать очищенные от пыли и примесей семена и клубни, что гарантирует хорошую прилипаемость и, следовательно, лучшее качество проправления.

Обработки посевов в период вегетации следует проводить при благоприятных погодных условиях: в ясную, теплую, безветренную погоду.

Рекомендации по применению в неблагоприятных условиях

Не рекомендуется применять препарат при скорости ветра более 5 м/с во избежание его неравномерного внесения. Осадки, выпавшие на протяжении 2-3 часов после обработки препаратом, могут снизить эффективность его действия. В условиях засухи рекомендуется использовать максимальные нормы расхода препарата для лучшего проявления ростостимулирующих свойств.

Рекомендации по применению при проправлении

Обработку семян можно проводить как заблаговременно, так и непосредственно в день посева. При заблаговременном проправлении семян зерновых их влажность может слегка повышаться, поэтому обработанные семена нужно хранить в сухом помещении. Беречь обработанные семена от прямых солнечных лучей.

При приготовлении баковой смеси при проправлении сначала добавляют необходимые пестициды согласно инструкции производителя и очередность смешивания

Регламенты применения

Культура	Норма расхода препарата, л/т/га	Норма расхода рабочей жидкости, л/т/га	Способ, время обработки
Зерновые, зернобобовые, технические, кормовые культуры	0,1-0,2	10-20	Предпосевная обработка семян (самостоятельно или совместно с фунгицидами / инсектицидными протравителями)
Пшеница и ячмень, яровые и озимые, овес, рожь	0,1-0,2	150-300	
Зернобобовые, технические, кормовые, овощные культуры		150-400	Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза (самостоятельно или совместно с гербицидами, фунгицидами, инсектицидами)
Плодово-ягодные культуры, виноград	0,1-0,2	800-1000	

препартивных форм, затем добавляют необходимое количество Контур Профи. Канистру необходимо взболтать. Бак доливают водой до полного объема при постоянном перемешивании. Рабочий раствор необходимо использовать в течение 6 часов с момента приготовления.

Рекомендации по применению в течение вегетации

Вносить препарат следует в утренние и вечерние часы при скорости ветра до 3 м/с и при отсутствии ожидаемых осадков в течение 2-3 часов после проведения опрыскивания.

Рабочий раствор готовят непосредственно перед опрыскиванием в соответствии с инструкцией производителя и очередностью смешивания препартивных форм. Пестициды заливают в бак опрыскивателя, заполненного на 1/3 водой с включенной мешалкой. Далее при включенном перемешивающем устройстве добавляют необходимое количество Контур Профи. Канистру необходимо взболтать. Затем бак доливают водой до полного объема при постоянном перемешивании. Рабочий раствор необходимо использовать в течение 6 часов с момента приготовления.

Совместимость

Препарат может применяться без ограничений в баковых смесях любой степени сложности (с фунгицидными протравителями, гербицидами, фунгицидами, инсектицидами). Легко образует стабильный рабочий раствор, не выпадает в осадок, не вступает в реакции с компонентами баковой смеси.

В каждом конкретном случае перед совместным применением необходима предварительная проверка на физико-химическую совместимость компонентов баковой смеси.

Условия хранения

При хранении избегать попадания прямых солнечных лучей и соблюдать рекомендуемые температурные интервалы. По истечении гарантийного срока хранения, препарат должен быть проверен на соответствие требованиям технических условий. При установлении соответствия, может быть использован по прямому назначению.



Инновационное комплексное органо-минеральное удобрение, содержащее арахидоновую кислоту, янтарную кислоту, комплекс микроэлементов, а также гуминовые и фульвовые кислоты

Компоненты и концентрация:

Янтарная кислота - $1,91 \times 10^{-1}$ моль/л

Арахидоновая кислота - $3,28 \times 10^{-5}$ моль/л

Комплекс микроэлементов (в хелатной форме - железо, цинк, магний, медь, марганец, молибден) - 10,0 г/л

Гуминовые кислоты - 70,0 г/л
Фульвовые кислоты - 30,0 г/л

Препартивная форма:
водный раствор, ВР

Упаковка: канистра, 10 л

Гарантийный срок хранения:
3 года

Температура хранения:
от 0°C до +25°C

Класс опасности:
4 (малоопасное вещество)

**КОНТУР СТАРТ:
ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ИНТЕНСИВНЫЙ
РОСТ КОРНЕВОЙ
СИСТЕМЫ,** дает
мощный толчок для
развития растений,
повышает устойчивость
к болезням.

КОНТУР СТАРТ

Преимущества:

- Стимулирует развитие корневой системы у молодых растений, повышает энергию прорастания и увеличивается всхожесть семян
- Улучшает корневое питание на первоначальных этапах развития культуры
- Снимает редардантный эффект, возникающий в результате обработки семян некоторыми фунгицидами (особенно из класса триазолов)
- Увеличивает устойчивость растений к неблагоприятным климатическим факторам (жара, холод, засуха)
- Значительно повышает устойчивость растений к разного рода семенным и почвенным инфекциям
- Повышает биологическую эффективность фунгицидных проправителей

Механизм действия

Арахидоновая кислота активирует системы организма, осуществляющие контроль за интенсивностью ростовых процессов. Значительно повышает энергию прорастания и всхожесть семян (в среднем на 5-8%), стимулирует процессы корнеобразования.

Кроме того, попав в растение, имитирует ранние этапы атаки фитопатогенов, что стимулирует длительную выработку эффективных защитных веществ, которые формируют неспецифическую устойчивость к грибам, бактериям, вирусам. Семена меньше поражаются корневыми гнилями.

Янтарная кислота входит в состав всех важнейших ферментативных систем растений. Увеличивает проницаемость клеточных мембран, растения начинают более активно потреблять питательные вещества из почвы. Особенно сильный эффект заметен на растениях со слабоизраженной корневой системой (зерновые, гречиха, картофель и другие).

Под влиянием янтарной кислоты образуется более мощная корневая система, проникающая в нижние горизонты почвы, интенсивнее поглощается влага и питательные вещества, усиливается фотосинтез, что дает опосредованный эффект на внутренний иммунитет растения.

Кроме того, янтарная кислота создает оптимальную слабокислую реакцию рабочего раствора, в которой любые химические проправители проявляют максимальную активность.

Гуминовые кислоты увеличивают активность природных регуляторов роста растений - ауксинов, цитокининов и гиббереллинов и повышают проницаемость мембран живых клеток растений, что усиливает интенсивность фотосинтеза и процессов обмена веществ.

Фульвокислоты усиливают обменные процессы, восстанавливают электрический потенциал клеток, повышают проницаемость клеточных мембран.

Период действия

Оказывает продолжительное росторегулирующее действие, период максимально выраженного действия на растения – в течение 10-14 дней после обработки.

Действие на культуру

Обработка семян

Наиболее эффективен при внесении на семена, однако возможна обработка в период вегетации. Увеличивает полевую всхожесть семян, повышает энергию прорастания, обеспечивает стимуляцию процессов корнеобразования.

Повышает устойчивость растений к неблагоприятным почвенно-климатическим факторам и почвенным патогенам. Под действием арахидоновой кислоты происходит индукция локальной и системной устойчивости, обусловленная образованием фитоалексинов.

Растительная ткань начинает быстрее и интенсивнее реагировать на внедрение патогенов - активизируется метаболизм фенолов и липидов, возрас-

тает активность ферментов пероксидазы и липоксидазы, обработанные препаратом семена меньше поражаются корневыми гнилями.

Обработка в течение вегетации

При внесении препарата во время вегетации культуры у растений увеличивается проницаемость клеточных мембран. Использование оптимальных норм янтарной кислоты в комплексе с гуминовыми и фульвовыми кислотами переводит энергетический обмен в растениях в новое стационарное состояние, в котором метаболические процессы протекают интенсивнее. Поэтому обработка растений «включает» сигнальные системы, что приводит к образованию защитных белков и повышению устойчивости к стрессовым факторам. Это стимулирует пластическую функцию: в результате биохимических превращений, происходящих в растительных клетках, синтезируются такие соединения, как аминокислоты, углеводы, жирные кислоты и др.

Особенности применения

Рекомендуется к применению в первую очередь на семенах с низкой всхожестью и энергией прорастания, в сложных погодных условиях (засуха), в условиях большой распространенности почвенных патогенов. На посевах, где были внесены фосфорно-калийные удобрения.

Превосходно снимает стресс, возникающий после химических обработок определенными химическими проправителями, помогает избежать редардантного эффекта.

Активно стимулирует начальные ростовые процессы у растений со слабоизраженной корневой системой (зерновые, гречиха, картофель и другие).

Факторы, влияющие на эффективность

Для проправления рекомендуется использовать очищенные от пыли и примесей семена и клубни, что гарантирует хорошую прилипаемость и, следовательно, лучшее качество проправления.

Обработки посевов в период вегетации следует проводить при благоприятных погодных условиях: в ясную, теплую, безветренную погоду.

Рекомендации по применению в неблагоприятных условиях

Не рекомендуется применять препарат при скорости ветра более 5 м/с во избежание его неравномерного внесения. Осадки, выпавшие на протяжении 2-3 часов после обработки препаратом, могут снизить эффективность его действия. В условиях засухи рекомендуется использовать максимальные нормы расхода препарата для лучшего проявления росторегулирующих свойств.

Регламенты применения

Культура	Норма расхода препарата, л/т/га	Норма расхода рабочей жидкости, л/т/га	Способ, время обработки
Пшеница, ячмень яровые и озимые, овес, рожь	10		Предпосевная обработка семян (самостоятельно или совместно с фунгицидами / инсектицидными проправителями)
Зернобобовые, технические, кормовые культуры	10-20		
Зерновые, зернобобовые, технические, кормовые, овощные культуры	0,1-0,2	150-400	
Плодово-ягодные культуры, виноград	800-1000		Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-3 раза (самостоятельно или совместно с гербицидами, фунгицидами, инсектицидами)

Рекомендации по применению при проправлении

Обработку семян можно проводить как заблаговременно, так и непосредственно в день посева. При заблаговременном проправлении семян зерновых их влажность может слегка повышаться, поэтому обработанные семена нужно хранить в сухом помещении. Беречь обработанные семена от прямых солнечных лучей.

При приготовлении баковой смеси при проправлении сначала добавляют необходимые пестициды согласно инструкции производителя и очередности смешивания препартивных форм, затем добавляют необходимое количество Контур Старт. Канистру необходимо взболтать. Бак доливают водой до полного объема при постоянном перемешивании. Рабочий раствор необходимо использовать в течение 6 часов с момента приготовления.

Рекомендации по применению в течение вегетации

Вносить препарат следует в утренние и вечерние часы при скорости ветра до 3 м/с и при отсутствии ожидающих осадков в течение 2-3 часов после проведения опрыскивания.

Рабочий раствор готовят непосредственно перед опрыскиванием в соответствии с инструкцией производителя и очередностью смешивания препартивных форм. Пестициды заливают в бак опрыскивателя, заполненного на 1/3 водой с включенной мешалкой. Далее при включенном перемешивающем устройстве добавляют необходимое количество Контур Старт. Канистру необходимо взболтать. Затем бак доливают водой до полного объема при постоянном перемешивании. Рабочий раствор необходимо использовать в течение 6 часов с момента приготовления.

Совместимость

Препарат может применяться без ограничений в баковых смесях любой степени сложности (с фунгицидными проправителями, гербицидами, фунгицидами, инсектицидами). Легко образует стабильный рабочий раствор, не выпадает в осадок, не вступает в реакции с компонентами баковой смеси.

В каждом конкретном случае перед совместным применением необходима предварительная проверка на физико-химическую совместимость компонентов баковой смеси.

Условия хранения

При хранении избегать попадания прямых солнечных лучей и соблюдать рекомендуемые температурные интервалы. По истечении гарантированного срока хранения, препарат должен быть проверен на соответствие требованиям технических условий. При установлении соответствия, может быть использован по прямому назначению.

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА

РАП
РАП 600

Тиматерр

Кардон
Турион
Витацит

Контур
Старт

Контур Антистресс, Контур Профи
Контур Рост, Контур, Контур Аргент

Тиматерр
Цунами, Имидок

Зенон Аэро
Кардон

Тайпан
Фабрис

Биатлон
Эластер Плюс
Эластер
Триатлон Экстра
Эламет
Клопэфир Микс


Сталмет

Флагман

Элант Экстра

Сталкер

Элант
Клопэфир
Клопиралид
Элант Премиум
Метурон



Код ВВСН	0-7	11-13	21	24	29	30	31	32		37	39	49	51-59	61-69	75	85	89	
До посева	Посев	1, 2, 3 лист	Начало Кущение	Середина	Конец	Выход	1-е	2-е	Междоузлие	Флаговый лист	Язычок	Открытие листовой пазухи	Колошение	Цветение	Молочная	Восковая	Полная	После уборки

Фунгицидные протравители

Инсектицидные протравители

Селективные противоврудольные гербициды

Заводская бинарная упаковка гербицидов

ЗАЩИТЫ ЗЕРНОВЫХ

РАП
РАП 600

Граминициды


Гербициды сплошного действия

Инсектициды


Фунгициды по вегетации

Комплексные органо-минеральные удобрения


КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ КУКУРУЗЫ




КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ КАРТОФЕЛЯ



КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ РАПСА



КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ЛЬНА





РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИЯМ ПРИМЕНЕНИЯ

При внесении пестицидов для подавления различных групп вредящих организмов необходимо, чтобы все объекты воздействия находились в наиболее уязвимом состоянии.

Так, применение гербицидов наиболее эффективно по активно вегетирующему сорнякам в интервале температур: от +15°C до +25°C. Большинство однолетних сорняков наиболее уязвимы к действию гербицидов при обработке в фазе от 2 до 8 листьев или розетки. Высота многолетних корнеотпрысковых в момент обработки не должна превышать 10-15 см (для осотов фаза розетки - начала стеблевания), для выонка - фаза до начала бутонизации, при длине плетей 25-45 см.

Опрыскивание инсектицидами проводят в ясную, теплую погоду (при температуре воздуха не ниже +15°C и скорости ветра 1-2 м/с), в утренние или вечерние часы. Обязательным условием является полное и равномерное покрытие рабочим раствором всей поверхности растений. Максимальная эффективность проведения обработок наблюдается при достижении численности вредителей экономического порога вредоносности.

Обработку фунгицидами рекомендуется проводить в утренние или вечерние часы при температуре: от +15°C до +25°C и скорости ветра до 3 м/с. Обычно опрыскивание проводят при первых признаках проявления болезни. Норма расхода рабочей жидкости должна составлять не менее 200 л/га.

Порядок добавления компонентов смеси выглядит так: ВРП-ВДГ-СП-КС-КЭ-ЭМВ-ПАВ-ВР-Удобрения.

Самым первым компонентом являются водорастворимые пакеты (ВРП), так как полимер, из которого эти пакеты сделаны, должен растворяться в чистой воде. Если же в баке будет присутствовать масляная эмульсия, то она будет обволакивать полимер пакета и сделает его растворение затруднительным.

Далее в баковую смесь можно добавлять сухие препаративные смеси (водно-диспергируемые гранулы, ВДГ). В их составе содержатся водорастворимые вещества, которые соединяют порошковидные частицы в гранулах. Эти вещества должны раствориться, чтобы освободить частицы действующего вещества. Если бак опрыскивателя не оборудован механической или гидравлической мешалкой, необходимо сначала приготовить маточный раствор в отдельной емкости.

Следующими идут препаративные формы на водной основе (концентраты суспензий, КС). Они состоят из концентрированных взвесей (суспензий) действующего вещества в воде. Канистры перед применением рекомендуется энергично взболтать. Затем можно добавлять препаративные формы на масляной основе (концентраты эмульсий, КЭ и эмульсии масляно-водные, ЭМВ).

После всех этих манипуляций в бак можно добавлять поверхностно-активные вещества. ПАВы необходимы при самостоятельном использовании ВДГ (в связи с низкой смачивающей способностью последних).

В последнюю очередь добавляют водные растворы препаратов (ВР), состоящие из водорастворимых действующих веществ и водорастворимых жидкостей.

Предпосевное внесение глифосатсодержащих препаратов

При использовании минимальных и нулевых технологий все более актуальным становится предпосевное применение препаратов на основе солей глифосата кислоты (Рап/Рап 600), которые вносятся в дозе 1,0-2,0/0,6-1,2 л/га, часто в смеси с другими компонентами - к примеру, эфирами 2,4-Д. Этот эффективный прием борьбы с сорняками все более распространяется в засушливых условиях и в регионах с недостаточным увлажнением, где традиционные предпосевные культивации могут иссушить почву и снизить урожай яровых культур.

Единственное ограничивающее условие – после внесения данных препаратов нельзя приводить культивации и посев стрелчатыми лапами, чтобы не подрезать корневую систему сорняком и дать возможность действующему веществу глубоко проникнуть в корневую систему. Оптимально использование долотообразных сошников, минимально подрезающих сорняки.

Нормы Рап/Рап 600 в 1,0-2,0/0,6-1,2 л/га вполне достаточно для уничтожения однолетних двудольных и злаковых сорняков. Даже многолетние сорняки после внесения препарата приостанавливаются в росте, в результате чего легко уничтожаются основной гербицидной обработкой.

При наличии большого количества многолетних сорняков, для их уничтожения можно добавить к Рап/Рап 600 небольшое количество эфиров 2,4-Д (ЭЛАНТ) - 0,2-0,3 л/га. Положительный эффект достигается за счет того, что эфиры 2,4-Д растворяют восковой налет, образующийся на листьях сорных растений, позволяя глифосату проникать в растения в большем количестве и эффективно уничтожать чувствительные сорняки (падалица подсолнечника и т.д.)

Применение будет эффективным, если наперед известна степень засоренности и видовой состав сорняков. Максимальный эффект от применения достигается на фоне быстрого повышения температуры воздуха и почвы, что способствует активному росту сорняков. Применение Рап/Рап 600 при среднесуточной температуре ниже +12°C малоэффективно. Сорняки не должны быть выше 3-5 см, в этой фазе у них наименее выражена физическая устойчивость к гербицидам.

Так как глифосат и его соли не обладают почвенным действием (не могут проникать в растения через корни), а поступают в растения только через зеленые их части, то предпосевное внесение Рап/Рап 600 не может повлиять на всходы культурных растений. В почве глифосат очень быстро (в течение нескольких недель) разлагается живущими там бактериями на углекислый газ, воду и прочие безвредные компоненты.



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ПЕСТИЦИДАМИ

Ответственность по охране труда и технике безопасности при работе с пестицидами возлагается на руководителей сельхозпредприятий. Все химические обработки посевов, насаждений и сельскохозяйственных угодий регистрируются в «Журнале учета применения пестицидов».

Ежегодно перед началом сезона все лица, занятые на работах по химической защите растений, должны пройти обязательное медицинское освидетельствование и инструктаж о мерах безопасности. К работам с пестицидами не допускаются дети и подростки до 18 лет, беременные женщины, кормящие матери.

Работающие с химическими препаратами обеспечиваются средствами индивидуальной защиты: комбинезонами, халатами, резиновыми сапогами, ботинками, галошами, резиновыми перчатками, фартуками, респираторами, противогазами, защитными очками и т. д. Защитная одежда должна быть совершенно целой, хорошо подогнанной, плотно прилегающей к телу, тщательно завязываемой и застегиваемой, и в то же время не стесняющей движений. Средства индивидуальной защиты подбирают по размеру и каждый комплект закрепляют за работающим на весь период работ. Всю защитную одежду хранят по месту работы, отдельно от домашней. Стирают и обезвреживают спецодежду только централизованно, один раз в 6-7 дней.

При работе с пестицидами необходимо строго соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу, курить, пить, снимать средства индивидуальной защиты допускается только во время отдыха, на специально оборудованной площадке, после тщательного мытья рук, полостей рта и носа. Продолжительность рабочего дня при работе с пестицидами 3-го и 4-го классов опасности – не более 6 ч в день, с препаратами 1-го и 2-го класса опасности и фосфорорганическими соединениями - 4 часа (с обязательной отработкой в течение 2 часов на других работах).

ПОКАЗАТЕЛЬ	1 класс	2 класс	3 класс	4 класс
Классификация	Вещества чрезвычайно опасные	Вещества высокопасные	Вещества умеренно опасные	Вещества малоопасные
Средняя смертельная доза LD 50 при введении в желудок, мг/кг	<15	15...150	151...5000	>5000
Средняя смертельная доза LD 50 при нанесении на кожу, мг/кг	<100	100...500	501...2500	>2500

Первая помощь при отравлении

При первых признаках отравления (тошнота, рвота, общее недомогание, слабость) следует немедленно вывести пострадавшего на свежий воздух.

При попадании препарата на кожу осторожно, не втирая, удалить препарат ватой или куском материи, смыть струей воды с мылом.

При попадании препарата в глаза промывать их в течение 15 минут под струей воды, стараясь держать открытыми. Если осталось раздражение слизистой оболочки, немедленно обратитесь к врачу.

При случайном проглатывании необходимо немедленно вызвать врача, предъявить ему тарную этикетку. Если пострадавший в сознании – дать ему выпить взвесь активированного угля в большом количестве теплой воды (из расчета 3-5 столовых ложек на 1 стакан), затем раздражением задней стенки глотки вызвать рвоту; если пострадавший без сознания – нельзя пытаться вызывать рвоту или вводить что-то через рот.

Телефон и адрес для экстренного обращения в случае отравления ГУ «Казахская республиканская санитарно-эпидемиологическая станция», 050008, г. Алматы, ул. Ауэзова, 84. Телефон (727) 243-26-55, (727) 277-92-98; факс (727) 277-65-88.

В целях охраны пчел от воздействия пестицидов, обработки следует проводить наземной аппаратурой в вечерние часы, после захода солнца, когда лет пчел заканчивается. В зависимости от класса опасности вводятся ограничения по скорости ветра при обработке, погранично-защитной зоне и лету пчел.

ПОКАЗАТЕЛЬ	1 класс	2 класс	3 класс
Классификация	Вещества высокоопасные	Вещества среднеопасные	Вещества малоопасные
Скорость ветра, м/сек	1...2	2...3	4...5
Погранично-защитная зона, км	4...5	3...4	2...3
Ограничение лета, сутки	4...6	2...3	3...24 часа

Во всех случаях применение пестицидов требует соблюдения основных положений «Инструкции по профилактике отравления пчел пестицидами» (Москва, ГАП СССР 1989 г.), в частности - обязательно предварительное (за 4-5 суток) оповещение пчеловодов общественных и индивидуальных пасек (средствами печати, радио) о характере запланированного к использованию средства защиты растений, сроках и зонах его применения.



ОСОБЕННОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ БАКОВЫХ СМЕСЕЙ ПЕСТИЦИДОВ

Использование пестицидов в баковых смесях является чрезвычайно ценным приемом, так как смеси имеют целый ряд преимуществ перед одиночным применением препаратов:

- расширяют спектр действия препаратов, позволяя одновременно вести борьбу с разными видами вредных объектов, к примеру, со злаковыми и двудольными сорняками;
- обладают эффектом синергизма, повышающим эффективность обработки против определенных вредных объектов, тормозят развитие резистентности;
- снижают на 10-30% пестицидную нагрузку на единицу обрабатываемой площади.

Приготовление баковых смесей не должно сводиться только к механическому смешиванию выбранных компонентов. В первую очередь, нужно проводить проверку препаратов на их совместимость и оценку фитотоксичности полученной баковой смеси для культуры.

Основой для приготовления баковых смесей являются химическая и физико-химическая совместимость их компонентов. Химические реакции, свидетельствующие о несовместимости составляющих в баковой смеси, как правило, сопровождаются помутнением рабочего раствора, выпадением осадка, существенным повышением или понижением температуры раствора, выделением газов.

Физико-химическая несовместимость компонентов состоит в невозможности достижения однородности при смешивании рабочих растворов разных препаративных форм – появляются осадок, пена, расслоение и другие признаки неоднородности. Возможность объединения пестицидов зависит не только от совместимости действующих веществ, но и от набора и свойств входящих в их состав вспомогательных веществ (растворителей, стабилизаторов, пеногасителей, прилипателей и т. д.). Особенно это касается поверхностно-активных веществ, в частности, при смешивании ионогенных и неионогенных ПАВ может произойти выпадение осадка у эмульсий и суспензий.

Для проверки химической и физико-химической совместимости готовят рабочие растворы компонентов необходимой концентрации, затем их объединяют и хорошо перемешивают. Нельзя смешивать концентрированные препараты, а только рабочие растворы компонентов; добавление следующего компонента следует проводить только после полного перемешивания (растворения) предыдущего. Визуальную оценку смеси на однородность проводят непосредственно после смешения, а также после отстаивания в течение 30 минут.

Вода для приготовления рабочих растворов должна быть чистой, без примесей, с нейтральной или слабокислой реакцией, желательно с температурой +22°C - +25°C.

При использовании пестицидов в баковых смесях может происходить изменение скорости процессов проникновения и перемещения действующих веществ по растению или в организме вредителя.

Различают несколько типов взаимодействия:

- синергетический эффект - повышение эффективности смеси по сравнению с эффективностью одиночного применения препаратов, входящих в ее состав;
- аддитивный эффект - суммирование воздействий компонентов смеси по отношению к определенному вредоносному объекту;
- эффект разбавления - усиление токсичного действия одного из препаратов с помощью другого нетоксично го компонента;
- антагонистический эффект - снижение эффективности средств защиты растений по отношению к вредоносным объектам при их совместном применении.

Всегда возможен риск того, что баковая смесь может иметь токсичное воздействие на культурные растения. Поэтому перед масштабным применением каждой новой комбинации препаратов с различными нормами расхода на различных культурах необходимо провести их апробацию. Комбинировать можно только те препараты, фазы внесения которых совпадают со сроками обработки культуры.

Порядок смешивания разных препаративных форм пестицидов.

Рекомендуется следующая последовательность добавления препаратов в бак опрыскивателя: ВДГ-СП-КС-КЭ-ВРК-ВР.

Примеры эффективных баковых смесей

Примером баковых смесей гербицидов с ярко выраженным эффектом синергизма, могут служить смеси препаратов на основе эфиров 2,4-Д и сульфонилмочевин:

ЭЛАНТ (0,5 л/га) + МЕТУРОН (5 г/га)	ЭЛАНТ (0,3 л/га) + СТАЛКЕР* (12...15 г/га)
--	---

В данных смесях компоненты различаются по механизму действия, следовательно, блокируют различные системы и процессы жизнедеятельности сорного растения. Препараты на основе 2,4-Д перенасыщают сорные растения синтетическими гормонами, что приводит к нарушениям процесса фотосинтеза и деления клеток в меристеме. Сульфонилмочевинные препараты блокируют в растениях синтез фермента ацетолактатсинтазы, участвующей в синтезе незаменимых аминокислот валина, лейцина и изолейцина, что приводит к быстрой остановке роста сорняков.

Баковые смеси на основе эфиров 2,4-Д и дикамбы кислоты не только обладают меньшим фитотоксическим дей-

ствием на культурные растения, так как в них количество 2,4-Д снижено на 40-60% по сравнению с самостоятельным применением, но и имеют более широкий спектр действия, эффективно подавляя до 100 видов сорняков.

Не менее эффективны трехкомпонентные смеси, получаемые с помощью препарата ЭЛАНТ-ПРЕМИУМ:

ЭЛАНТ ПРЕМИУМ (0,4 л/га)+ МЕТУРОН (5 г/га)	ЭЛАНТ ПРЕМИУМ (0,4 л/га)+ + СТАЛКЕР* (5-10 г/га)
---	---

Важным преимуществом баковых смесей с Метуроном и Сталкером перед самостоятельным применением данных препаратов является снижение риска последействия для последующих чувствительных широколистных культур, так как их количество (в пересчете на единицу обрабатываемой площади) при составлении смесей уменьшается на 40-60%.

Для одновременного уничтожения двудольных и злаковых сорняков в посевах пшеницы и ячменя рекомендуется комбинировать в баковой смеси противодвудольные гербициды с граминицидом Фабрис 0,9-1,0 л/га. Снижать нормы расхода компонентов баковой смеси в этом случае нельзя, так как их действие направлено на разные целевые объекты.

Не менее эффективны баковые смеси препаратов на основе глифосата кислоты с гербицидами класса производных арилоксиалкилкарбоновых кислот, сульфонилмочевин, производных бензойной и николиновой кислот, использующиеся для подавления сорной растительности в паровых полях и при вводе залежных земель в оборот, например:

РАП (2-4 л/га) + ЭЛАНТ (0,3-0,5 л/га) РАП (2-4 л/га) + МЕТУРОН (10 л/га) РАП (2-4 л/га) + КЛОПЭФИР (0,3-0,4 л/га)	РАП 600 (1,25-2,2 л/га) + ЭЛАНТ (0,3-0,4 л/га) РАП 600 (1,25-2,2 л/га) + ЭЛАНТ ПРЕМИУМ (0,3-0,5 л/га)
---	--

Такие смеси с меньшими затратами позволяют достичнуть высокой эффективности в борьбе против всего комплекса двудольных и злаковых сорных растений, так как для аналогичного эффекта против злостных многолетних двудольных сорняков потребовалось бы в 1,5-2 раза больше глифосата содержащего препарата при его самостоятельном применении. При преобладании пырея ползучего норму расхода Рап/Рап 600 не следует снижать менее 3,0/1,7 л/га.

Не следует добавлять в вышеупомянутые смеси большое количество 2,4-Д (ЭЛАНТ) и прочих подобных препаратов в связи с тем, что они обладают разными механизмами и скоростью действия. ЭЛАНТ начинает действовать уже через несколько часов после применения, уничтожая за 3-5 дней проводящую систему растения, в то время, как только для полного проникновения Рапа в растение необходимо 3-5 часов, а полностью растения погибают через 10-20 дней.

В таких смесях он не успевает глубоко проникнуть в корневую систему сорняков и проявить весь свой эффект.

Баковые смеси инсектицидов с различными механизмами действия применяют для усиления токсического действия, расширения спектра поражаемых вредителей и снижения риска возникновения резистентности у насекомых.

Широко известны баковые смеси проправителей семян химической природы, гуматов и ростостимуляторов. Применение таких смесей при проправливании семян зерновых культур позволяет снизить проявления ретардантного эффекта, свойственного некоторым препаратам.

*препарат находится на стадии государственной регистрации или ее расширения

Наиболее уязвимые для гербицидов фазы развития сорняков

Однолетние сорняки

Наиболее полно уничтожаются, начиная с фазы семядолей до фазы 2-6 листьев (высота 5...10 см), поэтому не следует допускать их сильного укоренения (например, подмаренник цепкий эффективно уничтожается гербицидом СТАЛКЕР* в фазу до образования 4-х мутовок, затем его устойчивость резко возрастает и становится почти 100% к фазе образования семян).

Однолетние злаковые (овсюг, виды щетинников и пр.) наиболее уязвимы при высоте более 5 см до выхода в трубку.

Многолетние сорняки

В их развитии можно выделить 4 основные фазы (рис. 1-4).

■ Фаза всходов

В фазу всходов борьба с многолетними сорняками не эффективна, так как в этот момент в растении преобладает восходящий ток питательных веществ из подземных органов к активно нарастающей вегетативной массе. При работе гербицидами в данную фазу происходит отмирание только надземной массы, так как в корневую систему гербицид глубоко не проникнет. Спустя некоторое время будет наблюдаться вторичное отрастание!

■ Фаза розетки (кущения)

В фазу розетки растение уже сформировывает достаточное количество надземной биомассы, и питательные вещества начинают активно поступать из листьев в корневую систему, стимулируя ее нарастание вглубь и вширь. В эту фазу применение избирательных гербицидов в посевах большинства культур наиболее целесообразно.

■ Фаза бутонизации и цветения

Начинается закладка будущих плодов и семян. Питательные вещества из подземных органов активно поступают в формирующиеся генеративные органы. В данную фазу сорные растения наиболее устойчивы к действию гербицидов. Кроме того, на листьях к этому моменту уже образуются механизмы защиты – восковой налет, опушение и др., препятствующие проникновению гербицидов.

■ Фаза созревания

После формирования и созревания семян у растений начинается подготовка к зимнему сезону – накопление питательных веществ в корневой системе. Питательные вещества из надземных органов передвигаются в корневую систему и откладываются там. При работе в данную фазу гербициды достаточно глубоко проникают в корневую систему, но растения уже успевают образовать семена, что усиливает их дальнейшее распространение.



Рисунок 1



Рисунок 2




Рисунок 3




Рисунок 4



– преобладающее (восходящее, нисходящее) направление тока питательных веществ в растении

*препарат находится на стадии государственной регистрации или ее расширения



По вопросам приобретения в Республике Казахстан
обращаться только к официальному дистрибутору:

- г. Астана Тел.: +7 701 360 77 58
- г. Кокшетау, ул. м-н Центральный, 61 «б», оф.38,39,40
Тел.: +7 705 745 45 78
- г. Костанай, ул. Орджоникидзе, 56, оф.24,
Тел.:+7 771 430 68 81
- г. Петропавловск, Проезд Имени Ярослава Гашека,
дом 1А, Тел.: +7 771 174 09 94